

**ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
พิมิเทสปิบ (Pimiteispib)
40 มิลลิกรัม
ยาเม็ดเจสลี (JESELHY) 40 มิลลิกรัม**

1. ยานี้คือยาอะไร?

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า พิมิเทสปิบ มีตัวยาพิมิเทสปิบ 40 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มที่ใช้รักษาเนื้องอก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร?

- เจสลีใช้เพื่อรักษาเนื้องอกในกระเพาะอาหาร และลำไส้ (gastrointestinal stromal tumor) ที่เป็นมากขึ้นหลังจากได้ยาเคมีบำบัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อิมาทินิบ ซูนิตินิบ และ เรโกราเฟนิบ)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้เจสลี หากแพ้พิมิเทสปิบ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้:
 - กำลังตั้งท้องหรือวางแผนจะมีลูก
 - กำลังให้นมลูกหรือวางแผนให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินเจสลีอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร

3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร

- ห้ามกินยาเพิ่ม เพื่อแทนมื้อที่ลืมหากิน
- ถ้าลืมหากินยา ให้ถามหมอหรือเภสัชกร

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ท่านและคู่ของท่านคุมกำเนิดตลอดเวลาที่รักษา จนกระทั่งหลังรักษาเสร็จแล้วซักระยะ
- ห้ามตั้งท้องระหว่างกินยานี้ เพราะอาจเป็นอันตรายกับลูกในท้อง
- ถ้าท่านหรือคู่ของท่านท้องระหว่างกินยานี้ ให้บอกหมอหรือเภสัชกร
- สังเกตการมองเห็นอย่างใกล้ชิด เพราะยานี้อาจทำให้การมองเห็นผิดปกติ
- หากต้องกินยานี้พร้อมกับยาอื่น ต้องบอกหมอหรือเภสัชกรก่อน เพื่อป้องกันการรักษาไม่ได้ผล

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนงหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องเสียอย่างรุนแรง
- การมองเห็นผิดปกติ
- เลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ท้องเสีย
- ปวดมวนท้อง
- เหนื่อยล้า
- คำโต หรือ ไตผิดปกติ
- ไม่ย่อยอาหาร
- ลิ้นรับรสผิดไป

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามกินยานี้หลังจากวันหมดอายุบนฉลาก
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะและสีของยา:** ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีขาวถึงออกขาว มีรอยพิมพ์อักษร “40” ด้านหนึ่ง และ “P116” อีกด้านหนึ่ง
- ตัวยาสำคัญ:** พิมิเทสปิบ
- ส่วนประกอบอื่น ๆ:** แล็กโทสไฮเดรต แป้งข้าวโพด ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส ไมโครคริสทัลไลน์ เซลลูโลส แมกนีเซียมสเตียเรต แมโครกอล 6000 ไทเทเนียมไดออกไซด์

ผู้ผลิต: บริษัท บุญ พาร์มาซูติคอล จำกัด โรงงานสาขาเมืองคาวาโงเอะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้นำเข้า: บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: กันยายน 2567
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

• <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

• <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**