

# ลาสิวาน

AB-124/2024\_04

- ส่วนประกอบ** : ใน 2 มล. ประกอบด้วยตัวยา  
Furosemide 20 mg
- ข้อบ่งใช้** : อาการบวม (edema)  
ปอดบวมน้ำเฉียบพลัน (acute pulmonary edema)  
หัวใจล้มเหลวเนื่องจากมีเลือดคั่ง (CHF) และไตวายเรื้อรัง  
(chronic renal failure)
- ขนาดและวิธีใช้** : **อาการบวม** : ขนาดเริ่มต้นที่ใช้ คือ 20-40 มก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ถ้าจำเป็นอาจให้เพิ่มได้อีกจนถึง 20 มก. โดยเว้นระยะเวลาฉีดห่างจากที่ให้ครั้งแรก 2 ชั่วโมง จนกระทั่งได้ผลการรักษาที่ต้องการโดยให้วันละ 1-2 ครั้ง  
**ปอดบวมน้ำเฉียบพลัน** : ขนาดเริ่มต้นที่ใช้ คือ 40 มก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำเป็นเวลา 1-2 นาที ถ้าผลการรักษาไม่เป็นที่น่าพอใจภายใน 1 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดได้ถึง 80 มก.  
**หัวใจล้มเหลวเนื่องจากมีเลือดคั่ง (CHF) และไตวายเรื้อรัง (chronic renal failure)** : ขนาดที่ใช้คือ 2-2.5 กรัม ต่อวันหรือมากกว่า กรณีฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพียงครั้งเดียว ขนาดที่ใช้ไม่ควรเกิน 1 กรัม ต่อวัน ใช้เวลาฉีดอย่างน้อย 30 นาที
- อาการข้างเคียง** : การไม่สมดุลของของเหลวและอิเล็กโทรไลต์รวมทั้งโซเดียมในเลือดต่ำ โปแตสเซียมในเลือดต่ำ สภาวะเป็นด่างเนื่องจากมีคลอไรด์ในเลือดต่ำ โดยเฉพาะหลังจากให้ยาในขนาดสูง หรือการให้ยาเป็นเวลานาน
- ข้อห้ามใช้** : ผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเรื้อรัง และไม่มีปัสสาวะ ผู้ที่มีโซเดียมในเลือดต่ำ โปแตสเซียมในเลือดต่ำ และผู้ที่มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่อง
- ผู้ผลิต** : บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด  
111 หมู่ 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม  
44160 ประเทศไทย