

มิโรกาบาลิน

2.5, 5, 10, 15 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

ชื่อการค้า: TARLIGE® (ทาร์ลิจ®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า มิโรกาบาลิน มีตัวยามีโรกาบาลิน เมซีเลด เทียบเท่ากับ 2.5, 5, 10, 15 มิลลิกรัมของ มิโรกาบาลิน ซึ่งเป็นยาในกลุ่มระงับปวด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของท่านทราบก่อนใช้ยานี้

- ยาทาร์ลิจอาจทำให้เกิด:
 - มึนงง ง่วงนอน หมดสติ
 - การทำงานของตับผิดปกติ
 - น้ำหนักเพิ่ม
 - อาการถอนยา เช่น คลื่นไส้ นอนไม่หลับ ท้องเสีย ออยากอาหารลดลง
 - สายตามัว เห็นภาพซ้อน การมองเห็นเปลี่ยนไป
 - กล้ามเนื้อกระดูกกร้าว
- ประชากรวัยเด็ก
 - ไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยในเด็ก ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยาทาร์ลิจในกลุ่มประชากรวัยเด็ก
- สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร
 - ระวังระวังในการใช้ยาทาร์ลิจ เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- ผู้สูงอายุ
 - ระวังระวังในการใช้ยาทาร์ลิจ เนื่องจากผลข้างเคียงของยา ได้แก่ มึนงง ง่วงซึม หมดสติ เป็นเหตุให้เกิดการหกล้มและทำให้กระดูกหักได้

- ผู้ป่วยโรคไต
 - แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ แพทย์อาจปรับขนาดยาทาร์ลิจให้เหมาะสม
- ใช้ยาอื่นๆ ร่วมกับยาทาร์ลิจ
 - แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากท่านกำลังใช้ยาอื่นๆ หรือ ยาต่อไปนี้เป็น ยาโพรเบนเซดิด ยาไซเมทิดีน ยาลอราซีแพม หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยาเม็ดทาร์ลิจ ใช้สำหรับรับประทานเท่านั้น
- สามารถทานยานี้พร้อมมื้ออาหาร หรือ ห่างจากมื้ออาหารได้
- ห้ามหักแบ่งเม็ดยา รอยบากมีไว้สำหรับหักเม็ดยา เพื่อให้ง่ายต่อการกลืนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อแบ่งขนาดยา

3.2 หากลืมหักยา ควรทำอย่างไร

- หากลืมหักยา ให้กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของครั้งต่อไป ให้รอกินยาของครั้งต่อไปแทน และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด เช่น อ่อนเพลีย ปวดหัว อารมณ์ร่าเริงผิดปกติ ลึนแข็ง พูดไม่ชัด กลืนลำบาก ปวดหัว ปวดข้อ ข้อต่อบวม หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามหยุดยาทาร์ลิจเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- ห้ามขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการของปฏิกิริยาการแพ้:

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกาย
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง คัน ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือ เลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีอาการผิดปกติทางตับ เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น
- มึนงง ง่วงนอน หมดสติ สูญเสียการทรงตัว นอนไม่หลับ ปวดหัว ลึน ความจำแฉ่ง/เสื่อมลง พูดไม่ชัด ไรต่ออาการสัมผัสลดลง รับประทานผิดปกติ ไม่สบายศีรษะ อาการเวียนศีรษะ ไม่อยู่นิ่ง ใจสั่น เห็นภาพหลอน เพ้อฝัน
- ปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น เอนไซม์ Creatinine Kinase เพิ่มขึ้น
- หน้ามืดขณะลุกนั่งจากความดันโลหิตลดลงฉับพลัน ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตลดลง ร้อนวูบวาบ
- ท้องผูก ท้องอืด ปากแห้ง กระเพาะอาหารอักเสบ อาเจียน ออยากอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลง ปวดท้องส่วนบน กรดไหลย้อน ท้องเสีย ไม่สบายท้อง
- บวม น้ำหนักเพิ่ม การเดินผิดปกติ รู้สึกไม่สบายตัว อาการบ้านหมุน หิวน้ำบ่อย หน้าบวม ลัม เบาหวานอ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลืนπίสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะขัด ปัสสาวะไม่ออก
- สายตามัว

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้มีทั้งสิ้น 4 ความแรง
 - ทาร์ลิจ® 2.5 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีส้ม ออกชมพู รูปกลม (ขนาด 6.7 มิลลิเมตร) มีตัวอักษร "DSC151" และ "2.5" บนเม็ดยาทั้งสองด้าน
 - ทาร์ลิจ® 5 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีส้ม ออกน้ำตาล รูปรี (ขนาด 10.8 x 5.7 มิลลิเมตร) ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "DSC152" ทางซ้ายและมี

ตัวเลข "5" ทางขวาของรอยบากบนเม็ดยา อีกด้านหนึ่ง มีตัวอักษร "DSC152" ทางซ้ายและมีตัวเลข "5" ทางขวา

- ทาร์ลิจ® 10 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีส้ม ออกซมพู รูปรี (ขนาด 12.2 x 6.5 มิลลิเมตร) ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "DSC154" ทางซ้ายและมีตัวเลข "10" ทางขวาของรอยบากบนเม็ดยา อีกด้านหนึ่ง มีตัวอักษร "DSC154" ทางซ้ายและมีตัวเลข "10" ทางขวา
- ทาร์ลิจ® 15 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สีส้ม ออกน้ำตาล รูปรี (ขนาด 12.2 x 6.5 มิลลิเมตร) ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "DSC155" ทางซ้ายและมีตัวเลข "15" ทางขวาของรอยบากบนเม็ดยา อีกด้านหนึ่ง มีตัวอักษร "DSC155" ทางซ้ายและมีตัวเลข "15" ทางขวา
- ส่วนประกอบตัวยาสำคัญ
 - มิโรกาบาลิน เบซีเลต เทียบเท่ากับ 2.5, 5, 10, 15 มิลลิกรัมของมิโรกาบาลิน
- ส่วนประกอบอื่นๆ
 - ดีแมนนิทอล
 - ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส
 - คาร์เมลโลสแคลเซียม
 - โทโคฟีรอล
 - แมกนีเซียมอะลูมิเนียมเมตาซิลิเกต
 - ซิตริกแอซิดไฮเดรต
 - แมกนีเซียม สเตียเรท
 - สารเคลือบฟิล์ม: ไฮโพรเมลโรส ไทเทเนียมออกไซด์ ทัลคัม เพอริคออกไซด์สีเหลือง เพอริคออกไซด์สีแดง

ผู้ผลิต

บริษัท ไทย ฟาร์มาเทค จำกัด, โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บรรจุ

บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว ยุโรป จำกัด ประเทศเยอรมัน

ผู้นำเข้า

บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 24

เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มกราคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**