

เซลิเน็กซ์
ความแรง 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า XPOVIO
(เอ็กซ์โพวีโอ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เซลิเน็กซ์ (selinexor)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิล มัยอิโลมาในผู้ใหญ่ร่วมกับยาชนิดอื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เคยหรือกำลังติดเชื้อ
 - เคยหรือกำลังมีความเสี่ยงที่จะเลือดออก เช่น ฟกช้ำตามผิวหนังได้ง่าย
 - ตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะมีลูก เพราะอาจก่ออันตรายแก่ลูกในท้อง
 - ผู้หญิงให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรถึง ยา วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรทุกตัวที่ใช้
- ผู้ป่วยเพศหญิงควรได้รับการตรวจการตั้งท้องก่อนเริ่มใช้ยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิด และความรุนแรงของโรค
- แพทย์ของท่านอาจให้ยาชนิดอื่นร่วมการรักษา ควรใช้ยาดังกล่าวตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- กินยาทั้งเม็ด ไม่หัก แบ่ง บด หรือเคี้ยวเม็ดยา
- หากอาเจียนหลังจากกินยา ห้ามกินยาเพิ่ม และให้กินยาในขนาดปกติในเวลากินยารอบถัดไป

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา ให้กินยาในขนาดปกติในเวลากินยารอบถัดไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็นสองเท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร หรือไปโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- แพทย์หรือเภสัชกรอาจเปลี่ยนแปลงขนาดยาหรือหยุดให้ยาหากท่านได้รับผลข้างเคียงบางชนิดเมื่อใช้ยานี้
- กินน้ำ และอาหารให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ และไม่ให้น้ำหนักตัวลดลง
- ผู้ป่วยเพศหญิงควรใช้ยาคุมกำเนิดขณะกินยานี้ และหลังจากกินยาหมดแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรหาพบว่าตัวท่านตั้งท้องหรือสงสัยว่าจะตั้งท้องขณะกินยานี้
- ผู้ป่วยเพศชายควรคุมกำเนิด เช่น ใช้ถุงยางอนามัยขณะกินยานี้ และหลังจากกินยาหมดแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- ห้ามให้นมลูกขณะกินยานี้ และหลังจากกินยาหมดแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- หากพบว่ามีอาการมึนหัวหรือวงเวียนศีรษะ ควรงดการขับชี่ ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานบนที่สูง
- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้อื่น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ติดเชื้อ ได้แก่ มีอาการไอ ไข้ หนาวสั่น
- มึนหัว สับสน ง่วงซึม การรับรู้อลดลง เพื่อ เห็นเสียง และภาพหลอน
- อาการที่เกี่ยวข้องกับต่อกระจะก ได้แก่ เห็นภาพซ้อน เห็นภาพไม่ชัด ตาไม่สู้แสง

"ให้ไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน
- ท้องเสีย ท้องผูก
- ไม่อยากอาหาร น้ำหนักตัวลดลง
- เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยาเม็ดกลมสีน้ำตาลเคลือบฟิล์มระบุค่าว่า "K20"
- ตัวยาสำคัญ** เซลิเน็กซ์ 20 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ คอลลอยด์ซิลิกอนไดออกไซด์ (colloidal silicon dioxide) ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม (croscarmellose sodium) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate) ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส (microcrystalline cellulose) โอปาดราย 200เคลียร์ (opadry 200 clear) โอปาดรายทูบลู (opadry II blue) โปวีโดเนเค30 (povidone K30) โซเดียมลอริลซัลเฟต (sodium lauryl sulfate)

ผู้ผลิต Catalent CTS LLC, 10245 Hickman Mills Drive, Kansas City, Missouri 64137 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้า บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงและควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**