

เอกสารกำกับยา

คลินด้าไมซิน

ส่วนประกอบ	คลินด้าไมซิน ชนิดฉีด 150 มก./มล. แต่ละมิลลิลิตรประกอบด้วย Clindamycin Phosphate eq. to Clindamycin 150 mg
ข้อบ่งใช้	การใช้ Clindamycin จะเสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องเสียและลำไส้อักเสบที่รุนแรงอาจถึงแก่ชีวิต เนื่องจากเชื้อ <i>Clostridium difficile</i> ซึ่งเสี่ยงสูงกว่าการใช้ยาต้านจุลชีพอื่นๆ ซึ่งควรจำกัดการใช้ยานี้เฉพาะในรายที่มีการติดเชื้อที่รุนแรง ซึ่งยาที่เป็นอันตรายน้อยกว่าใช้ไม่ได้ผล Clindamycin เป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์จาก Lincomycin ออกฤทธิ์ทั้งฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยขึ้นอยู่กับความไวของจุลชีพและความเข้มข้นของยา ซึ่ง Clindamycin สามารถใช้รักษาการติดเชื้อต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none">- การติดเชื้อที่กระดูกและข้อ เช่น acute hematogenous osteomyelitis, septic arthritis- การติดเชื้อที่อวัยวะสืบพันธุ์สตรี เช่น endometritis, pelvic cellulitis, nongonococcal tubo - ovarian abscess และ postsurgical vaginal cuff infections caused by anaerobes- การติดเชื้อในช่องท้อง เช่น Peritonitis, abdominal abscess- การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น empyema, pneumonitis และ lung abscess- การติดเชื้อผิวหนังและเนื้อเยื่อ เช่น สิว- การติดเชื้อในกระแสโลหิต เช่น endocarditis
ขนาดและวิธีการใช้	ขนาดการใช้ในผู้ใหญ่ <ul style="list-style-type: none">- การใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) ฉีด ครั้งละ 150 - 300 mg ทุก 6 ชั่วโมง- การใช้รักษาโรคปอดบวม (Pneumonia) ฉีด 1,200 - 1,800 mg ต่อวัน โดยให้ร่วมกับ Primaquine 15 - 30 mg ต่อวัน
คำเตือน	<ol style="list-style-type: none">ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือผู้ป่วยที่มีความไวเกินต่อยา Lincomycinควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โดยเฉพาะโรค ลำไส้อักเสบ ท้องเดินเรื้อรังระวังการใช้ในหญิงมีครรภ์ หรือให้นมบุตรเพราะยาสามารถผ่านทางรก และขับออกทางน้ำนมได้ แต่ยังไม่เคยพบปัญหาในคนห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
ปฏิกิริยาระหว่างยา	- ยา Clindamycin ไม่เข้ากันกับยาต่อไปนี้ คือ Ampicillin, Phenytoin Sodium, Barbiturates, Aminophylline, Calcium gluconate, Magnesium sulfate - ยา Clindamycin จะออกฤทธิ์ต้านกับยา Erythromycin
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา	<ol style="list-style-type: none">ผลต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดินผลต่อระบบผิวหนัง เช่น เกิดอาการแพ้ชนิด Maculopapular, ลมพิษ ผื่นผิวหนังคล้าย Morbilliform, Erythema Multiforme อาการที่คล้ายกับ Steven - Johnson syndrome และเกิดอาการคันอาจทำให้เกิดคีซัน และการทำงานของตับผิดปกติ เม็ดเลือดขาวต่ำและเกล็ดเลือดต่ำได้
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
ผู้ผลิต	บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด 111 หมู่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 ประเทศไทย