

**พาลิวิซูแมบ**  
**ความแรง 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร**  
**หรือความแรง 50 มิลลิกรัมต่อ 0.5**  
**มิลลิลิตร**  
**ชนิดสารละลายสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า SYNAGIS (ซินาจิส)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พาลิวิซูแมบ (Palivizumab) มีตัวยา 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หรือ 50 มิลลิกรัมต่อ 0.5 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสอาร์เอสวี

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวีในระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็ก

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ได้แก่ Histidine (ฮิสทีดีน) Glycine (ไกลซีน)

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - มีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ในวันที่มารับยา
  - มีภาวะเลือดออกผิดปกติ มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด
  - มียาตัวอื่นที่รับประทานอยู่เป็นประจำ

“หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเริ่มใช้ยา”

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

### 3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้รีบติดต่อแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด เพื่อนัดหมายการฉีดยาครั้งใหม่

### 3.3 หากฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์และพยาบาลทันที ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

ห้ามหยุดยาเองและให้ฉีดยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ หรือแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำม่วงคล้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เกิดผื่น มีอาการคันที่ผิวหนัง
- เป็นไข้ มีอาการปวด บวมแดงบริเวณที่ฉีด.

“หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ในสถานพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา เพื่อป้องกันแสง
- เก็บยาในตู้เย็นช่วงอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง ห้ามเขย่าขวดยา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้ยาหากพบว่ายาชุน สีเปลี่ยนไป หรือมีฝุ่นผง

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา สารละลายใสถึงขุ่นเล็กน้อย
- ตัวยาสำคัญ พาลิวิซูแมบ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ Histidine (ฮิสทีดีน) Glycine (ไกลซีน) Water for injection (น้ำสำหรับยาฉีด)

ผู้ผลิต: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany

ผู้แบ่งบรรจุและตรวจผ่าน: AbbVie S.r.l, Italy

ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2566

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร