

ไฮโดรคอร์ทีโซนโซเดียมซัคซิเนต ความแรง 100 มิลลิกรัม ชนิดผงละลายสำหรับฉีด ชื่อการค้า Hydracort (ไฮดราคอร์ท)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไฮโดรคอร์ทีโซนโซเดียมซัคซิเนต (hydrocortisone sodium succinate) เป็นยาในกลุ่มคอร์ทีโคสเตอรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาการแพ้ หรือลดการอักเสบที่รุนแรง และใช้รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- [x] เคยแพ้ยานี้หรือยาในกลุ่มสเตอรอยด์ชนิดอื่น
- [x] กำลังติดเชื้อรา เช่น โรคเชื้อราในปาก เพราะจะทำให้โรคติดเชื้อรุนแรงขึ้น
- [x] เคยได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
 - เป็นผู้ป่วยที่สมองได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 - โรคหัด โรคอีสุกอีใส โรคงูสวัด หรือโรคเริม
 - เป็นโรคทางจิตขั้นรุนแรง หรือคนในครอบครัวเคยเป็นโรคทางจิต
 - โรคเบาหวานหรือคนในครอบครัวเคยเป็นโรคเบาหวาน

- โรคลมชัก
- โรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ
- โรคมะเร็ง
- โรคต่อหิน ต้อกระจก
- โรคตับ โรคไต
- โรคไทรอยด์บางชนิด
- โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเคยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากใช้ยาสเตอรอยด์
- โรคกระดูกพรุน
- เป็นฝีที่ผิวหนัง
- โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
- กำลังเป็นหรือเคยเป็นโรควัณโรค
- กำลังตั้งท้อง หรืออยู่ในระยะให้นมลูก
- กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ อยู่

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีการใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่านโดยหยดเข้าหลอดเลือด ฉีดเข้าทางหลอดเลือด ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าข้อ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- รีบติดต่อโรงพยาบาลและแจ้งแพทย์ทันทีที่นึกได้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หน้าบวม ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- อย่าอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและไวรัส เช่น หัด อีสุกอีใส เพราะยานี้ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและมีอาการติดเชื้อรุนแรง หากมีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ มีผื่น ให้รีบพบแพทย์
- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทุกครั้งว่ากำลังใช้ยานี้ หากต้องตรวจแล็บ ผ่าตัดหรือทำฟัน
- ระวังการขับรถ ขับยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูงเพราะยานี้อาจทำให้เป็นลม เวียนหัว หรือชักร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่หน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดท้อง ปวดหลัง ร่วมกับอาเจียนและหมดสติ
- ถ่ายดำ ถ่ายเป็นเลือด หรืออาเจียนเป็นเลือด
- มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ
- เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ไอเป็นเลือด
- ปวดหัว ร่วมกับอาเจียน ไม่มีแรง และง่วงซึม
- คันผิวหนัง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ คัดจมูก ตาแฉะ มีขี้ตามาก เหงื่อออก และน้ำหนักลด
- อาการแปรปรวน นอนไม่หลับ ประสาทหลอน ซึมเศร้า อายุก้าวต้วตาย อาการชัก
- หลอดเลือดดำที่ขา บวม แดง และรู้สึกเจ็บ

**“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล

- ใจเต้นเร็วหรือช้าผิดปกติ
 - แขนขาชาวม ชาวม
 - เป็นตะคริว เกร็งกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย
 - ปวดมวนท้อง อาหารไม่ย่อย มีแผลในปาก สะอึก
 - ปวดตา การมองเห็นผิดปกติ
 - ประจำเดือนผิดปกติ
 - ขนขึ้นเยอะ ผิวหนังบางลง ผิวหนังแตก
 - หน้ากลม เป็นสิว
 - ออยากอาหาร น้ำหนักขึ้น
 - เป็นแผลหายยาก
 - อักเสบบริเวณที่ฉีดยา มีรอยช้ำ สีผิวเปลี่ยนไป
- “ให้รอดดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ในกรณีที่ได้รับยากลับบ้าน ให้ปฏิบัติตามดังนี้
 - เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
 - ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงยาปราศจากเชื้อ สีขาวถึงออกขาว
 - บรรจุในขวดแก้วใส ปิดฝาด้วยจุกยาง
- **ตัวยาสําคัญ** ไฮโดรคอร์ติโซนไฮดรอกซิดีเมซัคซิเนด
 - เทียบเท่า ไฮโดรคอร์ติโซน 100 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ไม่มี

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด
ที่อยู่ 111 หมู่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 มีนาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ห้ามใช้ในผู้ที่ติดเชื้อราแบบแพร่กระจาย
เว้นแต่ในกรณีจำเป็น
3. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลใน
กระเพาะอาหารหรือลำไส้ โรคเบาหวาน
วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัส