

ยาเม็ดนอร์วาสค์™ (NORVASC™) 5, 10 มิลลิกรัม แอมโลดิพิน (Amlodipine)

โปรดอ่านเอกสารนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ยา

- เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนี้รวบรวมข้อมูลสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยานี้ ไม่ได้มีข้อมูลยาครบถ้วนหรือทดแทนการดูแลโดยแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม หรือเกิดอาการข้างเคียง รวมถึงอาการข้างเคียงนอกเหนือจากเอกสารนี้ หรือมีอาการรุนแรงหรือร้ายแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ให้ใช้สำหรับคุณเท่านั้น ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่นเพราะอาจเป็นอันตรายได้

This leaflet answers some common questions about this medicine. It does not contain complete drug information and cannot substitute for professional care. If you have any questions or suspect that you have adverse drug reactions, please contact your pharmacist or physician. This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others because it may harm them.

1. ยานอร์วาสค์ คือยาอะไร และใช้รักษาในกรณีใด

ยานอร์วาสค์ เป็นยาเม็ดสำหรับรับประทาน มีตัวยาสำคัญคือ แอมโลดิพิน บีไซเลท (amlodipine besylate) เทียบเท่ากับ แอมโลดิพิน 5 มก. หรือ 10 มก. จัดอยู่ในกลุ่มยาด้านแคลเซียม (calcium antagonists) ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง ลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี และการทำ coronary revascularization หรืออาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอเรื้อรังแบบคงที่

ยานอร์วาสค์จะออกฤทธิ์โดยขยายหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ทำให้เลือดไหลผ่านได้สะดวกขึ้น และจะออกฤทธิ์โดยเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ ทำให้ได้รับออกซิเจนมากขึ้นซึ่งจะป้องกันอาการเจ็บหน้าอกได้ ยานี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีในการบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ

2. ก่อนรับประทานยานออร์วาสค์

ห้ามรับประทานยานออร์วาสค์ในกรณีต่อไปนี้

หากคุณมีประวัติแพ้ยานออร์วาสค์ หรือส่วนประกอบอื่นในเม็ดยา ได้แก่ microcrystalline cellulose, dibasic calcium phosphate anhydrous, sodium starch glycolate, magnesium stearate หรือยาในกลุ่มต้านแคลเซียมชนิดอื่น ซึ่งอาจเกิดอาการคัน ผื่นหนังร้อนแดง และหายใจลำบาก

ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ยานออร์วาสค์

ก่อนรับประทานยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต่อไปนี้:

- หัวใจล้มเหลว
- โรคตับ

การรับประทานยานออร์วาสค์ร่วมกับยาอื่น

ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งหากคุณเพิ่งใช้หรือกำลังใช้ยาอื่น ๆ ร่วมด้วย แม้จะไม่ใช่ยาที่ได้สั่งโดยแพทย์ก็ตาม เนื่องจากยาอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้ ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยานออร์วาสค์ ได้แก่

- simvastatin ซึ่งเป็นยาลดระดับไขมันในเลือด
- ยากลุ่มยับยั้ง CYP3A4 เช่น erythromycin, diltiazem, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, clarithromycin
- ยากลุ่มเหนี่ยวนำ CYP3A4 เช่น rifampicin, hypericum perforatum
- Tacrolimus
- ยากลุ่ม Mechanistic Target of Rapamycin inhibitor เช่น sirolimus, temsirolimus และ everolimus

การรับประทานยานออร์วาสค์ร่วมกับอาหารและเครื่องดื่ม

รับประทานยานออร์วาสค์ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

ไม่แนะนำให้รับประทานยานออร์วาสค์ร่วมกับ grapefruit หรือน้ำ grapefruit

หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาความปลอดภัยในหญิงมีครรภ์และระหว่างการให้นมบุตร แนะนำให้ใช้ระหว่างมีครรภ์เฉพาะเมื่อไม่มียาอื่นที่ปลอดภัยกว่าเท่านั้น และเมื่อสภาวะของโรคเอง (หากไม่ใช้ยา) ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อแม่และทารกในครรภ์สูงกว่า

จากประสบการณ์ในมนุษย์พบว่ายาผ่านสู่น้ำนมมนุษย์ได้

ความสามารถในการขับชี่ยานพาหนะและความคุมเครื่องจักรกล

ยานออร์วาสค์ไม่น่าจะมีผลต่อความสามารถในการขับชี่ยานพาหนะหรือความคุมเครื่องจักรกล

3. วิธีการรับประทานยานออร์วาสค์

ขนาดยาปกติของยานออร์วาสค์ คือ 5 มก. วันละครั้ง ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดสูงสุดคือ 10 มก. ตามการตอบสนองของผู้ป่วยเป็นราย ๆ ไป โดยรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน และรับประทานอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่ง ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา

ในเด็กอายุ 6 ถึง 17 ปี แนะนำให้ใช้ยานออร์วาสค์ขนาด 2.5 มก. ถึง 5 มก. วันละครั้ง

หากคุณรับประทานยานออร์วาสค์มากกว่าที่แพทย์สั่ง

การได้รับประทานยาเกินขนาดจำนวนมาก มีรายงานพบการเกิดความดันโลหิตต่ำอย่างมาก และเป็นอยู่นานจนกระทั่งเกิดภาวะช็อคตามมา ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

หากคุณลืมรับประทานยานออร์วาสค์

ให้รับประทานยาตามเวลาต่อไปเลย ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเพื่อชดเชยยาเม็ดที่ลืมรับประทาน

หากคุณหยุดรับประทานยานออร์วาสค์

ปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดรับประทานยา

4. อาการข้างเคียงที่อาจเกิดได้

เช่นเดียวกับยาทุกชนิด ยานออร์วาสค์ทำให้เกิดอาการข้างเคียงในบางคนได้

อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยได้แก่ ปวดศีรษะ มีนงง ง่วงนอน ใจสั่น หน้าแดง คลื่นไส้ ปวดท้อง บวม อ่อนล้า

อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก (อายุ 6 ถึง 17 ปี) ได้แก่ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีนงง ปวดท้อง หลอดเลือดขยายตัว และเลือดกำเดาไหล

แต่หากมีอาการต่อไปนี้อย่างไรก็ตามหลังจากรับประทานยา ถึงแม้ว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยมาก แต่อาจมีความรุนแรง ให้หยุดรับประทานยานออร์วาสค์และแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

PIL Title: Amlodipine besylate

PIL rev no.: 6.4

PIL Date: February 28, 2022

Country: Thailand

Reference: LPD rev. no. 15.4; CDS version 11.0 date March 10, 2017

- ผู้ที่ใบหน้า หน้าตา ริมฝีปาก บวม และหายใจลำบาก

5. คำแนะนำในการเก็บยานอร์วาสค์

เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

ห้ามใช้ยานอร์วาสค์หลังวันสิ้นอายุของยาที่แสดงไว้บนฉลาก หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น “วันสิ้นอายุของยา” หมายถึง วันสุดท้ายของเดือนที่แสดงบนฉลาก

6. ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด

PIL revision no.: 6.4

PIL date: February 28, 2022

Country: Thailand