

**แคปไซทาบิน**  
**ความแรง 500 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า INCITABINE (อินไซทาบิน)**

**1. ยานี้คืออะไร**

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า แคปไซทาบิน (Capecitabine) มีตัวยา 500 มิลลิกรัม
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือมะเร็งเต้านม และใช้ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซ้ำ หลังจากตัดก้อนมะเร็งออกแล้ว

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
  - ห้ามใช้ยานี้หาก
    - เคยแพ้ยากลุ่มฟลูโอโรไพริมิดีนอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่รักษามะเร็ง เช่น ฟลูโอโรยูราซิล (fluorouracil)
    - มีปัญหาโรคตับ หรือโรคไตอย่างรุนแรง
    - มีภาวะขาดเอนไซม์ ดีพีดี
    - กำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในเด็กทารก
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**
- มีปัญหาตับ หรือ ไต
  - มีหรือเคยมีปัญหาหัวใจ
  - มีโรคทางสมอง ทางระบบประสาท หรือทางตา
  - เป็นโรคเบาหวาน
  - มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง
  - กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาโรคเก๊าท์ (เช่น อัลโลพูรินอล) ยาละลายลิ่มเลือด (เช่น วอร์ฟาริน) ยาแก้น้ำขี้ (เช่น เฟนิโทอิน) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรบางชนิด

**3. วิธีใช้ยา**

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
  - กินยานี้หลังอาหารไม่เกิน 30 นาที
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้ติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุดก่อนกินยาเม็ดต่อไป โดยท่านอาจมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องร่วง แผลในปาก ปวดท้อง

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- คุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ เพราะยาอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยาอาจทำให้ง่วง และอ่อนเพลีย

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
  - ท้องร่วงมากกว่า 4 ครั้ง หรือท้องร่วงตอนกลางคืน
  - อาเจียนมากกว่า 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง
  - เบื่ออาหารจนกินได้น้อยกว่าปกติ ตัวเหลืองตาเหลือง
  - มีแผลที่ปาก หรือ เจ็บ บวม แดง
  - ใช้สูง หนาวสั่น รู้สึกเหนื่อย
  - ปวด บวม แดง รู้สึกชา ที่มือหรือเท้า
  - เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดปกติ
  - เดินเซ

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ปวดท้อง
- อ่อนเพลีย
- คัน ผื่นที่ผิวหนัง

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น แดด โดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- หากเก็บยานี้ที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส จะเก็บยาไว้ได้ไม่เกิน 3 เดือน

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- ลักษณะยา ยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพู ลักษณะวงรี มีเลข “500” อยู่ด้านหนึ่งของเม็ด
  - ตัวยาสำคัญ แคปไซทาบิน 500 มิลลิกรัม
  - ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Croscarmellose Sodium (ครอสคาร์เมลโลส โซเดียม), Microcrystalline Cellulose (ไมโครคริสตอล เซลลูโลส), Hypromellose (ไฮโปรมลโลส), Silica colloidal anhydrous (ซิลิกา คอลลอยด์แอนไฮไดรอส), Magnesium Stearate (แมกนีเซียม สเตียเรต), Titanium Dioxide (ไททาเนียม ไดออกไซด์), Talc (ทัลค), Macrogol 400 (แมคโครกอล 400), Red Iron Oxide (เรด ไอรอน ออกไซด์), Yellow Iron Oxide (เยลโล ไอรอน ออกไซด์), น้ำผู้ผลิต Remedica Ltd., Limassol, Cyprus ผู้นำเข้า บริษัทอินเทกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2565**
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**
- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
  - <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**