

โซเลโดรอนิกแอซิด
ความแรง 4 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร
สารละลายเข้มข้นสำหรับ
หยดเข้าหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า ZODONIC (โซโดนิก)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าโซเลโดรอนิกแอซิด (zoledronic acid) มีตัวยา 4 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่ม บิสฟอสโฟเนต

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ร่วมกับยารักษามะเร็งมาตรฐาน ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปกระดูกและผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูกมัยอีโลมาที่กระดูกถูกทำลาย
- ลดการเสื่อมสลายของกระดูกในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่มีมะเร็งกระจายไปที่กระดูก
- ใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมสูง เนื่องจากเนื้องอก

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มบิสฟอสโฟเนต
- กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากไม่มีข้อมูล
- เป็นโรคตับ โรคไต
- สุขภาพเหงือกและช่องปากไม่ดี
- เคยปวด บวม ชา บริเวณขากรรไกร หรือฟันโยก
- เคยมีภาวะกระดูกขากรรไกรตาย
- เคยเป็นตะคริว หัวใจเต้นเสียวจิ้งหะ ชัก ผิวหนังแห้ง หรือรู้สึกแสบร้อน

- กำลังใช้ยาต่อไปนี้ เช่น ยาต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ยาขับปัสสาวะ ยาที่เป็นอันตรายต่อไต ยาทาลิโดไมด์ แคลซิโทนิน เพราะอาจเกิดอันตรายมากขึ้น **“หากมีภาวะดังกล่าวให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ที่ฉีดยานี้ให้กับท่าน

3.2 หากลืมไปฉีดยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมไปฉีดยา

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้ง่วงซึม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดก
- แขนขาบวม ปัสสาวะน้อย ปัสสาวะไม่ออก
- มีอาการหัวใจเต้นเสียวจิ้งหะ ชัก
- ความไวต่อการสัมผัสลดลง
- ปวดในปากหรือกราม ฟันจะหลุด
- เจ็บที่กระดูกต้นขา สะโพก ขาหนีบ ข้อต่อ

**“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว ปวดตัว ปวดกล้ามเนื้อ ไข้ ไอ เจ็บคอ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
- ท้องผูก ท้องเสีย ปวดท้อง
- เจ็บบวมแดงบริเวณที่ฉีดยา
- ปากแห้ง มีแผลในปาก
- เยื่อบุตาอักเสบ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะของยา** ยาน้ำปราศจากเชื้อ สี ใส ไม่มีสี สำหรับฉีด
- ตัวยาสำคัญ** โซเลโดรอนิกแอซิด
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แมนนิทอล (mannitol), ไตรโซเดียมซิเตรตไดไฮเดรต (trisodium citrate dihydrate), น้ำสำหรับฉีด (water for injection)

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท มิลลิเมต บีเอฟเอส จำกัด, จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**