

เอกสารกำกับยาภาษาไทย

CLEARAZOLE

ส่วนประกอบ : ใน 100 มล. ประกอบด้วย Metronidazole 500 mg

ข้อบ่งใช้ : **CLEARAZOLE** ใช้รักษาอาการติดเชื้อรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobe ได้แก่ *Bacteroides* sp., *Clostridium* sp., *Eubacterium* sp., *Peptostreptococcus* sp. และ *Peptococcus* sp.

- โรคบิดอะมีบา
- โรคติดเชื้อทริโคโมแนส
- โรคติดเชื้อในช่องท้อง : เยื่อช่องท้องอักเสบ ฝีในช่องท้องและฝีในตับ (Abscess)
- การติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง
- โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์สตรี : เยื่อบุมดลูกอักเสบ เยื่อบุกล้ามเนื้อมดลูกอักเสบ ฝีที่ท่อนำไข่ และ รังไข่ และการติดเชื้อหลังการผ่าตัดปากช่องคลอด
- โลหิตเป็นพิษ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
- การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ
- การติดเชื้อที่ระบบประสาทส่วนกลาง : เยื่อหุ้มสมองอักเสบและฝีในสมอง
- โรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง : ปอดบวม หนองในช่องอก และฝีในปอด
- เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
- การป้องกันการติดเชื้อก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดลำไส้

ขนาดและวิธีใช้ : บริหารยาทางหลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ โดยการหยดอย่างต่อเนื่องหรือหยดเป็นระยะ สลับกันไป ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เป็นอลูมิเนียม เช่น เข็ม หรือข้อต่อ

โรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิด anaerobe :-

- ขนาดยาเริ่มต้น : 15 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ค่อย ๆ หยดเข้าหลอดเลือดดำโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง (ประมาณ 1 กรัม สำหรับผู้ใหญ่ น้ำหนัก 70 กิโลกรัม)
- ขนาดยาต่อเนื่อง : 7.5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ค่อย ๆ หยดเข้าหลอดเลือดดำโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ทุก 6 ชั่วโมง (ประมาณ 500 มิลลิกรัม สำหรับผู้ใหญ่ น้ำหนัก 70 กิโลกรัม)

การให้ยาขนาดต่อเนื่องครั้งแรกให้เริ่มให้ยาหลังจากให้ยาในขนาดเริ่มต้น 6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดที่ให้ไม่เกิน 4 กรัม ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ระยะเวลาการรักษาโดยทั่วไป 7-10 วัน อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และเยื่อหุ้มหัวใจ อาจต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการรักษา

การป้องกัน : เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัดลำไส้

- ขนาดที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ : 15 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ค่อย ๆ หยดเข้าหลอดเลือดดำโดยใช้เวลามากกว่า 30 - 60 นาที ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
- จากนั้นตามด้วยขนาดยา : 7.5 มิลลิกรัม / กิโลกรัม ค่อย ๆ หยดเข้าหลอดเลือดดำใช้เวลา 30-60 นาที ทุก 6 และ 12 ชั่วโมง หลังการให้ยาครั้งแรก

อาการข้างเคียง :-

- ระบบประสาทส่วนกลาง : เวียนศีรษะ มึนงง เสียการทรงตัว ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ และเป็นลม
- ระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส้ บางครั้งมีอาการ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร และอาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง
- ปฏิกิริยาเฉพาะที่ : หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่หยดยา ซึ่งอาจแก้ไขโดยหลีกเลี่ยงการให้ยาเป็นเวลานาน

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้

ผลิตโดย : บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด
111 หมู่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม 44160 ประเทศไทย