

ยาแคปซูลดีทรูซิทอล เอส อาร์ (DETRUSITOL® SR) 2 และ 4 มิลลิกรัม โทลเทอโรดีน ทาร์เทรต (Tolterodine tartrate)

โปรดอ่านเอกสารนี้ให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนเริ่มรับประทานยา

- เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยนี้รวบรวมข้อมูลสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยานี้ ไม่ได้มีข้อมูลยาครบถ้วนหรือทดแทนการดูแลโดยแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม หรือเกิดอาการข้างเคียง รวมถึงอาการข้างเคียงนอกเหนือจากเอกสารนี้ หรือมีอาการรุนแรงหรือร้ายแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ให้ใช้สำหรับคุณเท่านั้น ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่นเพราะอาจเป็นอันตรายได้

This leaflet answers some common questions about this medicine. It does not neither contain all of the available information nor substitute for professional care. If you have any questions or suspect that you have adverse drug reactions, please contact your pharmacist or physician.

This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others because it may harm them.

1. ยาดีทรูซิทอล เอสอาร์คือยาอะไร และใช้ในกรณีใด

ยาดีทรูซิทอล เอสอาร์เป็นยาแคปซูลสำหรับรับประทานที่ออกฤทธิ์นาน มีตัวยาสำคัญคือ โทลเทอโรดีน ทาร์เทรต (tolterodine tartrate) 2 หรือ 4 มิลลิกรัม จัดอยู่ในกลุ่มยา antimuscarinic ใช้สำหรับรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน ซึ่งมีอาการปัสสาวะเร่งรีบ ปัสสาวะบ่อยครั้ง และ/หรือมีอาการปัสสาวะเร่งรีบที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้

2. 2. ก่อนรับประทานยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ ห้ามรับประทานยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ในกรณีต่อไปนี้

- แพ้ยาโทลเทอโรดีนหรือส่วนประกอบอื่นของยานี้
- มีอาการปัสสาวะคั่ง
- โรคต่อหินชนิดมุมแคบที่ยังควบคุมอาการไม่ได้

ควรระวังเป็นพิเศษระหว่างใช้ยาดีทรูซิทอล เอสอาร์

ยาโทลเทอโรดีนอาจไม่เหมาะสมกับท่าน กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัสสาวะคั่ง
 - มีความเสี่ยงต่อภาวะของการบีบตัวของกระเพาะและลำไส้ลดลง
 - การทำงานของไตหรือตับบกพร่อง
 - โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis)
 - หากกำลังรับประทานยารักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ดูหัวข้อ “การรับประทานร่วมกับยาอื่น”)
- กรุณาสอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเริ่มรับประทานยานี้

การรับประทานร่วมกับยาอื่น

กรุณาแจ้งให้แพทย์ หรือเภสัชกรทราบหากกำลังได้รับยาชนิดอื่น ถึงแม้ว่ายาดังกล่าวไม่ได้ส่งจ่ายตามใบสั่งแพทย์

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังรับประทานยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งอย่างแรงต่อเอนไซม์ชนิด CYP2D6 หรือ CYP3A4 เช่น คีโตโคนาโซล ไอตราโคนาโซลหรือไมโครนาโซล (รักษาโรคติดเชื้อรา) และอีริโทรมัยซินหรือแคลริโทรมัยซิน (รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย) เพราะอาจทำให้ระดับยาโทลเทอโรดีนในเลือดเพิ่มขึ้น หรือยาที่ใช้ต้านอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น เอมีโอดาโรน โซทาลอล ควินิดีน โพรเคนนาไมด์ เนื่องจากอาจมีผลต่อการเต้นของหัวใจ

การรับประทานยาดีทรูซิทอลร่วมกับอาหารและเครื่องดื่ม

สามารถรับประทานยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ พร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างก็ได้

หญิงมีครรภ์

ไม่ควรรับประทานยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ในระหว่างมีครรภ์ เนื่องจากยังไม่ทราบผลของยานี้ต่อการมีครรภ์ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบถ้ากำลังมีครรภ์ หรือวางแผนจะมีครรภ์

หญิงให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลว่ายาโทลเทอโรดีนขับออกทางน้ำนมหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ควรให้นมบุตรระหว่างรับประทานยาดีทรูซิทอล เอสอาร์

โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนรับประทานยาใดๆ

ความสามารถในการขับขี้นานพาทนะและความคุมเครื่องจักรกล

ควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี้นานพาทนะและความคุมเครื่องจักรกลใดๆ เพราะยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ อาจมีผลต่อความสามารถเหล่านี้

3. วิธีการใช้ยาดีทรูซิทอล เอสอาร์

รับประทานยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ควรสอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกรจนแน่ใจ

ขนาดยาทั้งหมดต่อวันที่แนะนำ คือ 4 มิลลิกรัม วันละหนึ่งเม็ด ขนาดยาทั้งหมดต่อวันอาจลดลงเหลือ 2 มก.ขึ้นอยู่กับความทนต่อยาของแต่ละบุคคล

ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่อง แพทย์อาจลดขนาดยาเป็นวันละ 2 มิลลิกรัม ไม่แนะนำให้ใช้ยา ดีทรูซิทอล เอสอาร์ ในเด็ก

ยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ เป็นยาแคปซูลชนิดแข็ง แบบออกฤทธิ์นาน ใช้สำหรับรับประทาน และควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยวเม็ดยา

แพทย์จะเป็นผู้บอกว่าคุณควรรับประทานยา ดีทรูซิทอล เอสอาร์ เป็นเวลานานเท่าใด ห้ามหยุดรับประทานยาก่อนหากไม่เห็นผลของยาในทันที ต้องใช้เวลาในการปรับตัวของกระเพาะปัสสาวะ แพทย์จะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาในการรักษาโดยใช้ยานี้ หากยังไม่เห็นผลการรักษา กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบ ควรมีการประเมินผลดีของการรักษาด้วยยาหลังจากใช้ยาไปแล้ว 2-3 เดือน ควรปรึกษาแพทย์หากต้องการหยุดการรักษาด้วยยา

หากรับประทานยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ มากกว่าที่แพทย์สั่ง

หากรับประทานยาเกินขนาด ควรรีบแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

หากลืมนับรับประทานยาดีทรูซิทอล เอสอาร์

หากลืมนับรับประทานยา ให้รับประทานทันทีเมื่อนึกได้ แต่ห้ามรับประทานยาเกินกว่าวันละหนึ่งเม็ด ห้ามรับประทานยาเพิ่มเพื่อชดเชยยาเม็ดที่ลืมนับรับประทาน

4. อาการข้างเคียงที่อาจเกิดได้

เช่นเดียวกับยาทั่วไปยาดีทรูซิทอล เอสอาร์ อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงในบางคนที่รับประทานยา

อาการข้างเคียงที่พบในการศึกษาทางคลินิก ได้แก่ ไซนัสอักเสบ แพ้ยา สับสน มึนงง ปวดศีรษะ ง่วง

นอน การมองเห็นผิดปกติ (รวมถึงการปรับตาเพื่อดูใกล้ไกลผิดปกติด้วย) ตาแห้ง รู้สึกหมუნ ผิวหนังแดง ปากแห้ง ปวดท้อง ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ท้องอืด กรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารสู่หลอดอาหาร ปัสสาวะขัด ปัสสาวะคั่ง อ่อนล้า

อาการข้างเคียงที่มีรายงานหลังยาร่างจำหน่าย ได้แก่ ปฏิกริยาการแพ้ยา (ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นและคอบวม หายใจลำบาก คัน)

ภาวะมีหนังสับสนต่อเวลา สถานที่ บุคคล ประสาทหลอน ความจำบกพร่อง หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น ท้องเสีย มีอาการแพ้รุนแรง (angioedema) บวมปลายมือปลายเท้า

หากพบอาการข้างเคียงเหล่านี้รุนแรง หรือมีอาการข้างเคียงที่นอกเหนือไปจากที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้ กรุณาแจ้งให้แพทย์ หรือเภสัชกรทราบ

5. คำแนะนำในการเก็บยา

ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ห้ามใช้ยาดีทรูซิทอล เอสอาร์หลังวันสิ้นอายุของยาที่แสดงไว้บนฉลาก หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น “วันสิ้นอายุของยา” หมายถึง วันสุดท้ายของเดือนที่แสดงบนฉลาก

ห้ามเก็บยาไว้ในที่อุณหภูมิสูงกว่า 25°C

6. ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

บริษัท เวียร์ทริค (ประเทศไทย) จำกัด