

คู่มือ

ความแรง 300 มิลลิกรัม ต่อ 2 มิลลิตร และ
ความแรง 200 มิลลิกรัม ต่อ 1.14 มิลลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า DUPIXENT (คูพิเซนต)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คูพิลูแมบ (dupilumab) มีตัวยา 300 มิลลิกรัม ต่อ 2 มิลลิตร และตัวยา 200 มิลลิกรัม ต่อ 1.14 มิลลิตร

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงรุนแรง ในผู้ป่วยอายุ 6 เดือนขึ้นไป
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคหอบหืด ในผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไปเป็นการรักษาเสริมแบบควบคุมอาการสำหรับโรคหอบหืดปานกลางถึงรุนแรง
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังที่มีริดสีดวงจมูก ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ เป็นการรักษาเสริมแบบควบคุมอาการ
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคตุ่มแข็งคันเรื้อรังในผู้ป่วยผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา ในกรณีต่อไปนี้
- มีปัญหาเกี่ยวกับตา เช่น เยื่อตาอักเสบหรือกระจกตาอักเสบ
- ติดเชื้อพยาธิ หรือปรสิต
- มีอาการหลอดลมหดเกร็งเฉียบพลัน หรือโรคหอบหืดกำเริบรุนแรง
- กำลังจะฉีดวัคซีนชนิดเชื้อเป็น **เพราะยังไม่มีข้อมูลเพียงพอถึงปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาและวัคซีน**
- กำลังให้นมลูก
- กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนจะตั้งท้อง **เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย**

“ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดยาและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น **เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้นี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค**
- ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง บริเวณต้นขา หรือหน้าท้อง ตามขนาดที่แพทย์สั่ง **ไม่ให้ฉีดซ้ำจุดเดิม** ให้เลื่อนตำแหน่งฉีดเล็กน้อย

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากลืมฉีดยาไม่เกิน 7 วัน ให้ฉีดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ส่วนการฉีดยาเข็มถัดไปให้ฉีดตามกำหนดเดิม
- หากลืมฉีดยาเกิน 7 วัน ให้รอฉีดตามกำหนดการฉีดครั้งถัดไป โดยไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที และให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามปรับขนาดยา หรือหยุดใช้ยาและให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ให้เฝ้าระวังการเกิดภาวะเยื่อตาอักเสบหรือกระจกตาอักเสบ หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับตา ให้รายงานให้แพทย์ที่ทำการรักษาทราบ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หากใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตาอักเสบ เช่น ตาแดง ตาบวม คัน การมองเห็นเปลี่ยนไป
- เป็นไข้ เจ็บข้อ ต่อมทอนซิลอักเสบ

- โรคเรื้อรังที่ปาก หรือริมฝีปาก
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือขึ้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง **เพราะจะส่งผลต่อความคงตัวของยาและประสิทธิภาพในการรักษา**
- ห้ามเขย่ายา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นสารละลายใสถึงขุ่นเล็กน้อย ไม่มีสีถึงมีสีเหลืองอ่อน
- ตัวยาลำคัญ คูพิลูแมบ
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ L-Arginine Hydrochloride (แอล-อาร์จินีนไฮโดรคลอไรด์), L-Histidine (แอล-ฮิสทีดีน), Polysorbate 80 (พอลิซอร์เบท 80), Sodium Acetate (โซเดียมอะซิเตต), Sucrose (ซูโครส)

ผู้ผลิต บริษัท Sanofi Winthrop Industrie, ประเทศฝรั่งเศส

ผู้นำเข้า บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 3 มกราคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx
- http://ndi.fda.moph.go.th/

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

Dupixent 300 mg solution for injection in a pre-filled syringe with needle shield


Dupilumab

Instructions for use

Read the Instructions for Use before using the Dupixent Pre filled Syringe. This device is a Single dose [single-use] Pre filled Syringe (called “Syringe” in these instructions). It contains 300 mg of Dupilumab for injection under the skin (subcutaneous injection). Do not inject yourself or someone else until you have been shown how to inject Dupixent. Your healthcare provider can show you or your caregiver how to prepare and inject a dose of Dupixent before you try to do it yourself for the first time. In adolescents 12 years of age and older, it is recommended that Dupixent be administered by or under supervision of an adult. In children less than 12 years of age, Dupixent should be given by a caregiver.

Keep these instructions for future use. Any further questions? Ask your healthcare provider.

The parts of the Dupixent pre-filled syringe with needle shield are shown in this picture.



Important information

It is important that you do not try to give yourself or someone else the injection unless you have received training from your healthcare provider.

- Read all of the instructions carefully before using the syringe.
- Check with your healthcare professional how often you will need to inject the medicine.
- Ask your healthcare professional to show you the right way to use the syringe before you inject for the first time.
- Rotate the injection site each time you inject
- **Do not** use the syringe if it has been dropped on a hard surface or damaged.
- **Do not** use the syringe if the needle cap is missing or not securely attached.
- **Do not** touch the plunger rod until you are ready to inject.
- **Do not** inject through clothes.
- **Do not** get rid of any air bubbles in the syringe.
- To reduce the risk of accidental needle sticks, each pre-filled syringe has a needle shield that is automatically activated to cover the needle after you have given your injection.
- **Never** pull back on the plunger rod.
- **Do not** re-use the syringe.

How to Store Dupixent

- Keep the syringe(s) out of the reach of children.
- Keep unused syringes in the original carton and store in the refrigerator between 2°C and 8°C.
- Remove the Syringe from the refrigerator at least 45 minutes before your injection so that it reaches room temperature.


- **Do not** keep Dupixent at room temperature for more than 14 days.
- **Do not** shake the syringe at any time.
- **Do not** heat the syringe.
- **Do not** freeze the syringe.
- **Do not** place the syringe into direct sunlight.

Step 1: Remove

Remove the syringe from the carton by holding the middle of the syringe body.

⚠ Do not pull off the needle cap until you are ready to inject.

⚠ Do not use the syringe if it has been damaged.



Step 2: Prepare

Ensure you have the following:


- the Dupixent pre-filled syringe
- 1 alcohol wipe*
- 1 cotton ball or gauze*
- a puncture-resistant container* (See Step 12)

**Items not included in the carton*

Look at the label:

- Check the expiry date.
- Check that you have the correct product and dose.

⚠ Do not use the syringe if the expiry date has passed.




Step 3: Inspect

Look at the medicine through the viewing window on the syringe:

Check if the liquid is clear and colourless to pale yellow.




Note: You may see an air bubble; this is normal.


⚠ Do not use the syringe if the liquid is discoloured or cloudy, or if it contains flakes or particles.



Step 4: Wait 45 minutes

Lay the syringe on a flat surface for at least 45 minutes and let it get to room temperature naturally.

-  **Do not heat the syringe.**
-  **Do not place the syringe in direct sunlight.**
-  **Do not keep Dupixent at room temperature for more than 14 days.**






Step 5: Choose

Select the injection site.

- You can inject into your thigh or belly (stomach), except for the 5 cm around your navel.
- If somebody else gives you the injection, they can also use your upper arm.
- Change the injection site for each injection.

-  **Do not inject into skin that is tender, damaged or has bruises or scars.**



-  = Self-injection or by caregiver
-  = Injection by caregiver only

Step 6: Clean

Wash your hands.

Clean the injection site with an alcohol wipe.

Let your skin dry before injecting.

⚠ Do not touch the injection site again or blow on it before the injection.




Step 7: Pull

Hold the syringe in the middle of the syringe body with the needle pointing away from you and pull off the needle cap.

⚠ Do not put the needle cap back on.


⚠ Do not touch the needle.

Inject your medicine immediately after removing the needle cap.




Step 8: Pinch

Pinch a fold of skin at the injection site, as shown in the picture.



Step 9: Insert

Insert the Needle completely into the fold of skin at roughly a 45° angle.



Step 10: Push

Relax the pinch.

Push the plunger rod down slowly and steadily as far as it will go until the syringe is empty.

Note: You will feel some resistance. This is normal.



Step 11: Release and Remove

Lift your thumb to release the Plunger Rod until the Needle is covered by the Needle Shield and then remove the Syringe from the injection site.

Lightly press a cotton ball or gauze on the injection site if you see any blood



Do not put the needle cap back on.

⚠ Do not rub your skin after the injection.




Step 12: Dispose

Dispose of the syringe and the needle cap in a puncture-resistant container.

⚠ Do not put the needle cap back on.

Always keep the container out of the reach of children.



DATE OF REVISION OF THE TEXT : CCDM V6 (21 Nov 2019)

ดูพิเซนต์ 300 มก. ชนิดฉีดบรรจุอยู่ในกระบอกฉีดยาบรรจุเสร็จพร้อมฉีดยามีปลอกหุ้มเข็มฉีดยา


ดูพิลูแมบ

คำแนะนำวิธีการใช้

อ่านคำแนะนำวิธีการใช้ก่อนที่จะฉีดยาดูพิเซนต์ 300 มก. ที่บรรจุอยู่ในกระบอกฉีดยาบรรจุเสร็จ อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นกระบอกฉีดยาบรรจุเสร็จพร้อมฉีดยาสำหรับใช้ครั้งเดียว ซึ่งประกอบด้วยยาดูพิเซนต์ ความแรง 300 มก. สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ยาฉีดเข้าใต้ผิวหนัง) ท่านต้องไม่พยายามที่จะฉีดยาให้ตัวเองหรือฉีดยาให้แก่คนอื่น เว้นแต่ท่านจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการฉีดยาดูพิเซนต์แล้ว โดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถสอนวิธีการฉีดยาดูพิเซนต์ให้แก่ท่านหรือผู้ที่ให้การดูแลท่าน ก่อนที่ท่านจะฉีดยาดูพิเซนต์ให้ตัวเองครั้งแรก แนะนำว่าการฉีดยาดูพิเซนต์ในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ สำหรับการฉีดยาดูพิเซนต์ในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ควรดำเนินการโดยผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยเด็ก

ให้เก็บคำแนะนำวิธีการใช้ไว้สำหรับการใช้ยาต่อไปในอนาคต หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามบุคลากรทางการแพทย์ของท่านได้

ส่วนต่างๆ ของกระบอกฉีดยาบรรจุเสร็จพร้อมฉีดยามีปลอกหุ้มเข็มฉีดยาจะแสดงอยู่ในรูปภาพด้านล่างนี้



ข้อมูลสำคัญ

สิ่งสำคัญคือ ท่านต้องไม่พยายามที่จะฉีดยาให้ตนเองหรือฉีดยาให้แก่คนอื่นเว้นแต่ท่านจะได้รับการฝึกอบรมจากบุคลากรทางการแพทย์แล้ว

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนการใช้ยา
- สอบถามแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรว่าจำเป็นต้องฉีดยาบ่อยแค่ไหน
- ก่อนฉีดยาครั้งแรก ให้แพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรสอนวิธีการฉีดยาที่ถูกต้อง
- เปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดยาใหม่ทุกครั้ง ไม่ควรฉีดที่จุดเดิม
- ห้ามใช้ยานี้ถ้ากระบอกฉีดยาเคยหล่นบนพื้นแข็งหรือชำรุด
- ห้ามใช้ยานี้หากฝาครอบเข็มฉีดยาหายไปหรือปิดไม่สนิท
- ห้ามสัมผัสก้านสูบจนกว่าจะถึงเวลาที่จะฉีดยา

- ห้ามฉีดยาทะลุผ่านเสื้อผ้า
- ห้ามใส่ฟองอากาศออกจากกระบอกฉีดยา
- เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากเข็มฉีดยาโดยไม่ได้ตั้งใจ กระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีดแต่ละอันจะมีปลอกหุ้มเข็มฉีดยาซึ่งจะครอบปิดเข็มฉีดยาอัตโนมัติหลังจากฉีดยาเสร็จ
- ห้ามดื่อกันสูบขึ้น
- ห้ามนำกระบอกฉีดยามาใช้ซ้ำ

วิธีการเก็บรักษายาตูพิเซนต์


- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- เก็บรักษากระบอกฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ในกล่องบรรจุเดิมตามที่ได้รับมาและเก็บรักษายาไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
- นำเข็มฉีดยาออกจากตู้เย็นอย่างน้อย 45 นาทีก่อนการฉีดเพื่อให้กระบอกฉีดยาอยู่ที่อุณหภูมิห้อง
- ห้ามเก็บยานี้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง นานเกิน 14 วัน
- ห้ามเขย่ากระบอกฉีดยา
- ห้ามให้ความร้อนแก่กระบอกฉีดยา
- ห้ามนำกระบอกฉีดยาไปแช่แข็ง
- ห้ามวางกระบอกฉีดยาไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง

ขั้นตอนที่ 1: นำยาออกมาจากกล่อง

นำกระบอกฉีดยาออกมาจากกล่องโดยจับที่ตรงกลางของกระบอกฉีดยา

⚠ ห้ามดึงฝาครอบเข็มฉีดยาออกจนกว่าจะถึงเวลาจะฉีดยา

⚠ ห้ามใช้กระบอกฉีดยาหากตกบนพื้นแข็งหรือชำรุด



ขั้นตอนที่ 2: การเตรียมตัวก่อนฉีดยา

ตรวจสอบว่าท่านมีอุปกรณ์ต่อไปนี้:


- กระบอกฉีดยาที่บรรจุยาพร้อมฉีด (ตูพิเซนต์)
- สำลีสวบแอลกอฮอล์ 1 แผ่น*
- สำลีสหรือผ้าก๊อชจำนวน 1 ชิ้น*
- ภาชนะสำหรับทิ้งของมีคม* (ดูขั้นตอนที่ 12)

*อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่มีอยู่ในกล่องบรรจุยา

ตรวจสอบปลาก:

- ตรวจสอบวันหมดอายุ
- ตรวจสอบชนิดผลิตภัณฑ์และความแรงของยาที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่

⚠ ห้ามใช้ยานี้หากเลยวันหมดอายุไปแล้ว




ขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบกระบอกฉีดยา

ดูน้ำยาผ่านทางช่องดูน้ำยาบนกระบอกฉีดยา: (ดังรูป)

ตรวจสอบว่า สารละลายใสถึงขั้นเล็กน้อย ไม่มีสีถึงมีสีเหลืองอ่อน

หมายเหตุ: ท่านอาจจะมองเห็นฟองอากาศซึ่งถือว่าปกติ

⚠ ห้ามใช้ยานี้หากสารละลายเปลี่ยนสีหรือมีความขุ่นผิดปกติ หรือมีสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่




ขั้นตอนที่ 4: รอ 45 นาที

วางกระบอกฉีดยาไว้บนพื้นที่เรียบ ปล่อยให้ยามีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง เป็นเวลาอย่างน้อย 45 นาที

⚠ ห้ามให้ความร้อนแก่กระบอกฉีดยา

⚠ ห้ามวางกระบอกฉีดยาไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง

⚠ ห้ามเก็บยานี้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส) นานเกิน 14 วัน






ขั้นตอนที่ 5: เลือกตำแหน่งที่จะฉีดยา

ตำแหน่งที่ฉีดยา

- สามารถฉีดยาที่ต้นขาหรือหน้าท้อง (ท้อง) โดยห่างจากรอบสะดือ 5 เซนติเมตร
- หากมีคนอื่นฉีดยาให้ สามารถฉีดยานี้ที่ตำแหน่งต้นแขนได้
- เปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดยาทุกครั้ง ไม่ควรฉีดที่จุดเดิม

⚠ ห้ามฉีดยาบริเวณผิวหนังที่กดเจ็บ มีแผลหรือผิตกติ มีรอยฟกช้ำ หรือมีรอยแผลเป็น



-  - ฉีดด้วยตนเองหรือคนอื่น
-  - ผู้อื่นเป็นผู้ฉีดยาให้เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6: ทำความสะอาดบริเวณที่จะฉีดยา

ล้างมือให้สะอาด

เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ฉีดยาด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์

ปล่อยให้ผิวหนังแห้งก่อนฉีดยา

⚠ ห้ามสัมผัสหรือเป่าผิวหนังที่จะฉีดยาหลังทำความสะอาดแล้ว




ขั้นตอนที่ 7: ดึงฝาครอบเข็มฉีดยา

จับตรงกลางของกระบอกฉีดยาโดยให้ปลายเข็มชี้ออกจากตัวและดึงฝาครอบเข็มฉีดยาออก

⚠ ห้ามใส่ฝาครอบเข็มฉีดยากลับเข้าไปใหม่


⚠ ห้ามสัมผัสเข็มฉีดยา

ฉีดยาของท่านทันทีหลังดึงฝาครอบเข็มฉีดยาออก




ขั้นตอนที่ 8: จับผิวหนังที่จะฉีดยา ยกขึ้น

จับผิวหนังในตำแหน่งที่ฉีดยาขึ้นมาตามภาพ



ขั้นตอนที่ 9: แทะเข็มฉีดยา

ทะเข็มฉีดยาเข้าไปในผิวหนังที่ยกขึ้นมาให้มิดโดยทำมุมประมาณ 45 องศา



ขั้นตอนที่ 10: ดันก้านสูบลง

คลายมือที่จับผิวหนังยกขึ้นมา

ดันก้านสูบลงช้าๆ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอจนกว่าจะรู้สึกว่าระบบฉีดยาจะไม่มีน้ำยาเหลืออยู่


หมายเหตุ: ท่านจะรู้สึกถึงแรงต้านทานในระหว่างดันก้านสูบลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ




ขั้นตอนที่ 11: ปลดออก้านสูบและถอนเข็มฉีดยา

ปลดนิ้วหัวแม่มือออกจากก้านสูบซึ่งเข็มฉีดยากลับเข้าไปอยู่ในปลอกหุ้มเข็มฉีดยาและค่อยๆ ถอนเข็มฉีดยาออกจากผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา

หากมีเลือดออกตรงตำแหน่งที่ฉีดยา ใช้สำลีหรือผ้าก๊อชกดเบาๆ

 ห้ามใส่ฝาครอบเข็มฉีดยากลับเข้าไปใหม่

 ห้ามถูผิวหนังบริเวณนั้นหลังฉีดยาเสร็จ



ขั้นตอนที่ 12: ทิ้งกระบอกล้างยาและฝาครอบเข็ม

นำกระบอกล้างยาและฝาครอบเข็มฉีดยาไปทิ้งในภาชนะสำหรับทิ้งของมีคม

⚠️ ห้ามใส่ฝาครอบเข็มฉีดยากลับเข้าไปใหม่

เก็บภาชนะสำหรับทิ้งของมีคมให้พ้นจากมือเด็ก



เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : CCDM v6 (21 พ.ย. 2562)