

พรีกาบาลิน
ความแรง 25, 50 และ 75 มิลลิกรัม
ชนิด แคปซูล
ชื่อการค้า Brillior™ (บริลลิออ์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าพรีกาบาลิน (pregabalin) มีตัวยาพรีกาบาลิน 25, 50 และ 75 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มที่มีโครงสร้างคล้ายสารสื่อประสาทในสมอง

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท โรคลมชัก โรควิดกกังวลทั่วไป กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านเป็นโรคหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติเป็นโรคหัวใจ
- ไม่ควรกินยานี้ระหว่างตั้งท้อง ปรึกษาแพทย์ ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก
- ยานี้อาจเสริมฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ และยาลอแรซีแพม ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกัน
- ไม่ควรกินยานี้ร่วมกับยาออกซีโคโดน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้
- ไม่ควรกินยานี้หากมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่ทนต่อน้ำตาลบางชนิด ซาเดนอไซม์ย่อยน้ำตาลแลคโตส หรือการดูดซึมน้ำตาลแลคโตสได้ไม่ดี
- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี
- หากท่านเคยมีประวัติใช้ยาในทางที่ผิด หรือเคยติดยาเสพติด ให้แจ้งแพทย์ก่อนกินยานี้ เพราะท่านอาจมีความเสี่ยงในการติดยาพรีกาบาลินได้

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์อาจให้กินยานี้วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง และควรกินยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน
- กินยานี้ก่อนอาหารหรือกินหลังอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม มึนงง กระสับกระส่าย และกระวนกระวาย เป็นต้น ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และนำกล่องยาดัดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากที่สูงเพราะยานี้อาจทำให้มึนงงหรือง่วงนอนได้
- ผู้ช่วยบางรายที่เป็นเบาหวาน อาจมีน้ำหนักขึ้นระหว่างใช้ยานี้ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อปรับขนาดยาเบาหวาน
- ผู้สูงอายุต้องระวังอุบัติเหตุเพราะยานี้อาจทำให้มึนงงหรือง่วงนอนได้
- อย่าหยุดยาเอง เพราะการเลิกกินยากะทันหัน อาจทำให้มีอาการชักได้ ควรค่อย ๆ ลดขนาดยาโดยใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- ผู้หญิงที่สามารถมีลูกได้ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผื่นปกติ
 - สายตามัวชั่วคราว เห็นภาพซ้อน
 - มีความคิดฆ่าตัวตาย
 - เจ็บคอ มีไข้ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 - หัวใจเต้นผิดปกติ
 - เลือดออกง่าย มีจ้ำเลือด เลือดไหลแล้วหยุดยาก
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว มึนงง ง่วงนอนผิดปกติ
- เดินเซ พูดไม่ชัด หลง ๆ ลืม ๆ
- ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องผูก
- บวมตามแขนขา
- อยากอาหาร และน้ำหนักเพิ่ม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแพ่งก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา**
25 มิลลิกรัม: แคปซูลสีขาว มีตัวอักษรสีดำ “Pfizer” บนปลอกแคปซูล และ “PGN 25” บนตัวแคปซูล

50 มิลลิกรัม: แคปซูลสีขาว มีแถบสีดำบนตัวแคปซูล มีตัวอักษรสีดำ "Pfizer" บนปลอกแคปซูล และ "PGN 50" บนตัวแคปซูล

75 มิลลิกรัม: แคปซูลสีขาว-ส้ม มีตัวอักษรสีดำ "Pfizer" บนปลอกแคปซูล และ "PGN 75" บนตัวแคปซูล

- **ตัวยาสำคัญ** 프리กาบาลิน (pregabalin)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** lactose monohydrate, maize starch, talc, gelatin, titanium dioxide (E171), sodium laurilsulfate, anhydrous colloidal silica, purified water, shellac, black iron oxide (E172), propylene glycol, potassium hydroxide

ผู้ผลิต Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า บ. เวียร์ทริศ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 26 ตุลาคม 2566 ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก URL <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำเตือน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

1. ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด
3. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้
4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต