

## กรดเออร์โซไดออกซีโคลิก

250 มิลลิกรัม

แคปซูลเจลาตินแข็ง

ชื่อการค้า Ursofalk (เออร์โซฟอล์ค)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า กรดเออร์-โซ-ดี-ออก-ซี-โค-ลิก (Ursodeoxycholic acid)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ละลายนิ่วในถุงน้ำดีที่ขนาดก้อนเล็กกว่า 15 มม. และเกิดจากคอเลสเทอรอลส่วนเกินในถุงน้ำดี ซึ่งมองไม่เห็นจากภาพ x-ray และถุงน้ำดียังคงทำงานได้ถึงแม้ว่าจะมีนิ่วอยู่
- รักษาอาการอักเสบของเยื่อกระเพาะอาหารที่เกิดจากกรดน้ำดีไหลย้อน (โรคกระเพาะอักเสบจากกรดน้ำดีไหลย้อน)
- รักษาโรคตับแข็งจากท่อน้ำดีชนิดปฐมภูมิที่ตับยังคงทำงานได้ปกติ
- โรคตับที่เกี่ยวข้องกับซิสติกไฟโบรซิสในตับอ่อนในเด็กอายุ 6-18 ปี

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X ถุงน้ำดีทำงานผิดปกติ หรือทางเดินน้ำดีอุดตัน
- X นิ่วในถุงน้ำดี ชนิดที่มองเห็นได้จากภาพ x-ray
- X ถุงน้ำดี หรือทางเดินน้ำดีอักเสบชนิดเฉียบพลัน
- X การอุดตันในท่อหรือถุงน้ำดี (ทางเดินน้ำดีอุดตัน)
- X มีอาการปวดคล้ายตะคริวที่ช่องท้องบน
- X สำหรับเด็กที่เคยมีปัญหาท่อน้ำดีตีบ หรือผิดปกติ แม้จะผ่านการผ่าตัดแล้ว

#### 2.2 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- แจ้งให้แพทย์ทราบ ถ้าท่านกำลังใช้
  - ยาลดระดับคอเลสเทอรอล เช่น คลอไฟเบรต
  - ยาลดไขมัน
  - ยาลดกรด
  - ยาปฏิชีวนะ
  - ยาลดความดันเลือด
  - ยาคุมกำเนิดที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเอสโตรเจน
  - ยาแก้อาการคลื่นไส้

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาทั้งแคปซูล พร้อมดื่มน้ำตามมากๆ
- แจ้งให้แพทย์ทราบ ถ้ามีอาการแย่กว่าเดิม เช่น คันมากขึ้น เพื่อให้แพทย์พิจารณาปรับลดขนาดยา

#### 3.2. ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามมื้อยาที่ลืม ไปกินยาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสียแบบต่อเนื่อง ให้รีบแจ้งแพทย์ทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่เกิดขึ้นแล้วต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นหรือหลอดลม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำเลือดตามผิวน้ำ
- ท้องเสียแบบต่อเนื่อง

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้

- อาการถ่ายเหลว หรือท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาของเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะของยา : แคปซูลเจลาตินแข็ง สีขาวทึบ บรรจุผงหรือแกรนูลสีขาว
- ตัวยาสำคัญ : เออร์โซไดออกซีโคลิก
- ส่วนประกอบอื่นๆ : ไตแก๊ ซิลิกา คอลลอยด์ ลอเรนโซล, แมกนีเซียมสเตียเรต, เมซสตาร์ช, เจลาติน, ไททาเนียมไดออกไซด์ (อี171), โซเดียมลอริลซัลเฟต

ผู้ผลิต : Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg im Breisgau, Germany

ผู้นำเข้า : บริษัท เอ.เมนาเรอ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : มกราคม 2567

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

[https://porta.fda.moph.go.th/fda\\_search\\_all/main/search\\_center\\_main.aspx](https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.aspx)