

ไทเก้ไซคลิน
ความแรง 50 มิลลิกรัม
ชนิดผงละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Tygin (ไทกัน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไท-กี้-ไซ-คลิน (Tigecycline) มีตัวยา 50 มิลลิกรัม เป็นยาปฏิชีวนะ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่
 - การติดเชื้อของผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนัง
 - การติดเชื้อในช่องท้อง
 - โรคปอดบวมที่เกิดในชุมชน

โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

[x] เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่น เช่น เตตราไซคลิน • มิโนไซคลิน • ดอกซีไซคลิน

[x] ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - โรคตับ โรคตับอ่อนอักเสบ
 - โรคหลอดเลือดอุดตัน
 - ท้องเสีย
 - หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูก
 - แจ้งแพทย์ถ้ากำลังใช้ยาเหล่านี้ ได้แก่ วาฟาริน • ยาคุมกำเนิด • ทาโคลิมัส • ไฮโคสปอริน เป็นต้น เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- “หากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยา หรือมีอาการใดที่มีผลต่อการรักษา โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดให้กับท่านโดยหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

3.3 หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่มีข้อมูล

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนัง
- ติดเชื้อราในช่องปากเห็นรอยปื้นขาว หรือตกขาว
- ปวดท้องรุนแรง
- ฟันเปลี่ยนสี

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ หรือ พยาบาล

- คลื่นไส้ วิงเวียน อาเจียน ปวดหัว
- ปวดบริเวณที่ฉีด

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่สามารถกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา ผงยาปราศจากเชื้อ สีส้ม
- ตัวยาสําคัญ ไท-กี้-ไซ-คลิน 50 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ แลค-โตส และ ไฮ-โดร-คลอ-ริก-แอ-ซิด

ผู้รับอนุญาตและผู้ผลิต

บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร