

อินซูลิน ไอโคเดค ความแรง 700 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ชนิดสารละลายสำหรับฉีด บรรจุในปากกาฉีดยา ชื่อการค้า Awiqli (อะวิคลี)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อิน-ซุ-ลิน-ไอ-โค-เดค (insulin icodec)

- เป็นยาในกลุ่ม อินซูลิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคเบาหวานในผู้ใหญ่

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- เคยใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดอื่นมาก่อน
- มีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา
- เคยมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือน้ำตาลในเลือดสูง
- ต้มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาไฟโอกลิตาโซน
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ฉีดยานี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันเดียวกันของทุกสัปดาห์ โดยฉีดยาในเวลาใดก็ได้ของวัน
- ถ้าไม่สามารถฉีดยาในวันเดิมได้ สามารถเลือกฉีดวันอื่นได้ แต่การฉีดยาแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 4 วัน หลังจากที่ได้เลือกวันฉีดยาใหม่แล้ว ให้ฉีดยาครั้งต่อไปในวันนั้นของสัปดาห์
- ท่านอาจต้องใช้ขนาดยาอะวิคลี เพิ่มขึ้นในการฉีดยาครั้งแรก แต่ท่านไม่ควรใช้ขนาดยานั้นในการฉีดยาครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านว่าควรใช้ขนาดยาอะวิคลี เท่าไรในการฉีดยาครั้งแรกและครั้งที่สอง
- แนะนำให้ตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างใกล้ชิดในระหว่างที่มีการเปลี่ยนยาและในสัปดาห์ต่อไป
- ยานี้เป็นรูปแบบปากกาฉีดยา ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดบริเวณต้นขาด้านหน้า ต้นแขน หรือหน้าท้อง
- ห้ามฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ
- เปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดยาในทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดก้อนนูนหรือเป็นหลุมบริเวณที่ฉีดยา
- เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้งที่ใช้ยา เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ดัดเข็ม และเข็มอดตัน
- ห้ามใช้กระบอกฉีดยาดูดสารละลายออกจากปากกาฉีดยา
- ห้ามใช้ยานี้หากพบว่าปากกามีความเสียหาย หรือสารละลายในหลอดยาขุ่นหรือเปลี่ยนสี

- ตรวจสอบฉลากของปากกาทุกครั้งก่อนฉีดยา เพื่อป้องกันการใช้น้ำนี้สลับกับยาดูอื่น
- วิธีฉีดยา ศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อ “คำแนะนำการใช้”

3.2 ถ้าลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้ฉีดยาทันทีที่นึกขึ้นได้และต้องแน่ใจว่าการฉีดยาแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 วัน
- จากนั้นให้ฉีดยาครั้งต่อไปสัปดาห์ละครั้ง

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการและตรวจวัดระดับน้ำตาลอย่างใกล้ชิด หากมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ ให้กินลูกอม ขนมหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้ หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง โดยเฉพาะอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ต้องใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการวิงเวียนจะเป็นลม ให้รีบปรึกษาแพทย์
- ห้ามหยุดหรือปรับขนาดยาเอง ใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- ถ้าท่านได้รับขนาดยาที่เพิ่มขึ้นในการฉีดยาครั้งแรก ท่านไม่ควรใช้ขนาดยานั้นในการฉีดยาครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านว่าขนาดยาอะวิคลี สำหรับการฉีดยาครั้งที่สองของท่านคือขนาดเท่าไร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออาการอันตรายที่อาจจะเกิดจากยา

- ให้หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หากมีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือน้ำตาลในเลือดสูง
- พกลูกอมหรือขนมที่มีน้ำตาลสูงติดตัวเสมอ เพื่อกินในกรณีที่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
- บอกคนใกล้ชิดว่าท่านเป็นเบาหวานและกำลังใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ และให้นำท่านส่งโรงพยาบาลทันทีหากท่านเป็นลมหรือหมดสติ
- หากท่านดื่มแอลกอฮอล์ มีไข้ ได้รับความร้อนเกินไป ลืมฉีดยา กินอาหารมากขึ้นหรือออกกำลังกายน้อยลงกว่าปกติ อาจเกิดอาการน้ำตาลในเลือดสูง ได้แก่ หิวน้ำ ผิวแดงหรือแห้ง ปากแห้ง ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ ความอยากอาหารลดลง รู้สึกง่วง เหนื่อย ปัสสาวะบ่อย รู้สึกไม่สบาย คลื่นไส้ อาเจียน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- น้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งอาจจะมีอาการได้แก่ เหงื่อออกมาก หน้าซีด ปวดหัว ใจสั่น หิว อ่อนเพลีย มึนงง ตัวสั่น มองเห็นผิดปกติ สับสน เป็นลม
- บริเวณที่ฉีดยามีอาการฟกช้ำ มีเลือดออก ปวด บวม แดง หรือคัน
- บวมบริเวณ แขน ขา ข้อเท้า และข้อต่ออื่น ๆ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. เก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยาที่เปิดใช้แล้ว สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสง โดยตรง หรือในที่ชื้น
- ยาจะมีอายุ 12 สัปดาห์ หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- สวมปลอกปากกาไว้กับตามเสมอ เพื่อป้องกันยาจากแสง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เป็นสารละลายใส ไม่มีสี บรรจุในปากกาฉีดขนาด 1, 1.5 หรือ 3 มิลลิลิตร
- **ตัวยาสำคัญ** คือ อินซูลิน ไอโคเดค
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ กลีเซอรอล (glycerol) เมตาครีซอล (metacresol) ฟีนอล (phenol) ซิงค์อะซีเตท (zinc acetate) โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) และน้ำ

ผู้ผลิต Novo Nordisk A/S, Hillerød, Denmark
ผู้นำเข้า บริษัท โนวา นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 เมษายน 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

คำแนะนำการใช้

ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้เข็มและปากกาฉีดยาอะวิคลี โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนเสมอ และพูดคุยกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีการฉีดอะวิคลีอย่างถูกต้อง

ปากกาฉีดยาอะวิคลี เป็นปากกาฉีดยาชนิดพร้อมใช้สำหรับใช้แล้วทิ้งที่บรรจุอินซูลิน ไอโคเต็ค 700 ยูนิต/มล. ท่านสามารถฉีดได้ตั้งแต่ 10 ถึง 700 ยูนิตในการฉีดยาสัปดาห์ละครั้ง

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบฉลากของปากกาฉีดยาของท่านทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุอะวิคลี

ปากกาฉีดยาของท่านได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับเข็มแบบใช้แล้วทิ้งโนโวพายน์ พลัส, โนวोพายน์ หรือโนโวทวิสท์ ที่มีความยาวสูงสุด 8 มม.

ฉีดยาสัปดาห์ละครั้ง

ปากกาฉีดยาอะวิคลี (ตัวอย่าง)


โปรดทราบ: ปากกาฉีดยาของท่านอาจมีขนาดแตกต่างจากปากกาฉีดยาที่แสดงในรูป คำแนะนำเหล่านี้ใช้กับปากกาฉีดยาอะวิคลี ทั้งหมด



เข็มฉีดยาโนโวพายน์ พลัส (ตัวอย่าง)






เกี่ยวกับเข็ม




ใช้เข็มฉีดยาใหม่ในการฉีดยาทุกครั้ง ตรวจสอบการไหลตามที่อธิบายไว้ใน 'ขั้นตอนที่ 2' และใช้เข็มใหม่ในการฉีดยาทุกครั้ง ถอดเข็มออกทุกครั้งหลังการใช้งาน








ขั้นตอนที่ 1 เตรียมปากกาฉีดยาด้วยการใส่เข็มใหม่




- ตรวจสอบชื่อและความเข้มข้นบนฉลากปากกาฉีดยาเพื่อให้แน่ใจว่าปากกาฉีดยาของท่านมีอินซูลิน ไอโคเต็ค 700 ยูนิต/มล.




<ul style="list-style-type: none"> • ถอดปลอกปากกาฉีดยาออก รูป A 	
<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบทุกครั้งว่าอะไหล่ใส่และไม่มีสี • มองผ่านช่องแสดงปริมาณยาบนปากกาฉีดยา ห้ามใช้ปากกาฉีดยาหากอะไหล่สีขุ่นหรือมีอนุภาค รูป B 	
<ul style="list-style-type: none"> • ใช้เข็มฉีดยาใหม่ในการฉีดทุกครั้ง • ตรวจสอบกระดาดปิดโคนเข็มและปลอกเข็มชั้นนอกกว่ามีความเสียหายหรือไม่ หากท่านเห็นความเสียหายใดก็ตาม ความเสียหายนั้นอาจส่งผลต่อความปราศจากเชื้อได้ ให้ทิ้งเข็มนั้นไปแล้วใช้เข็มใหม่ • นำเข็มใหม่มาและฉีกกระดาดปิดโคนเข็มออก • ห้ามติดเข็มใหม่เข้ากับปากกาฉีดยาจนกว่าท่านจะพร้อมที่จะฉีดยา รูป C 	
<ul style="list-style-type: none"> • สวมเข็มตรง ๆ ลงบนปากกาฉีดยา หมุนจนแน่น รูป D • เข็มมีปลอกสองอันปิดอยู่ ท่านต้องถอดปลอกทั้งสองอันออก หากท่านลืมถอดปลอกทั้งสองอันออก ท่านจะไม่สามารถฉีดอะไหล่ได้ 	
<ul style="list-style-type: none"> • ดึงปลอกเข็มชั้นนอกออกแล้วเก็บไว้ใช้ภายหลัง ท่านจะต้องใช้ปลอกเข็มชั้นนอกเพื่อถอดเข็มออกจากปากกาฉีดยาอย่างปลอดภัยหลังการฉีด รูป E • ดึงปลอกเข็มชั้นในออก แล้วทิ้งไป รูป F • ท่านอาจเห็นหยดอะไหล่ที่ปลายเข็ม ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ท่านยังต้องตรวจสอบการไหลของอะไหล่ก่อนการฉีดทุกครั้ง ดู 'ขั้นตอนที่ 2' • ห้ามใช้เข็มทิ้งหรือชำรุด 	

	
<p>ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการไหลก่อนการฉีดทุกครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบการไหลก่อนการฉีดทุกครั้งเสมอ วิธีการนี้ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับอะคริลีเต็มขนาดยา • หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาตามเข็มนาฬิกาจนกว่าท่านจะเห็นเครื่องหมายแรก (10 ยูนิต) บนตัวเลขแสดงขนาดยา ดูรูป G • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายอยู่ในแนวเดียวกับขีดบอกขนาดยา ดูรูป H 	 
<ul style="list-style-type: none"> • จับปากกาฉีดยาโดยให้เข็มชี้ขึ้น • กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขแสดงขนาดยาแสดง -0- โดย -0- ต้องตรงกับขีดบอกขนาดยา • ควรเห็นหยดยาอะคริลีที่ปลายเข็ม หยดนี้บ่งบอกว่าปากกาฉีดยาของท่านพร้อมใช้งานแล้ว ดูรูป I • หากไม่เห็นหยดยาที่ปลายเข็ม ให้ตรวจสอบการไหลอีกครั้ง ควรตรวจสอบแบบนี้ทั้งหมดทุกครั้งเท่านั้น • หากยังไม่มีหยดยาที่ปลายเข็ม แสดงว่าเข็มอาจอุดตัน เปลี่ยนเข็มตามที่อธิบายไว้ใน 'ขั้นตอนที่ 5' และ 'ขั้นตอนที่ 1' • จากนั้นตรวจสอบการไหลอีกครั้ง • ห้ามใช้ปากกาฉีดยาหากยังคงไม่เห็นหยดยาอะคริลีที่ปลายเข็ม 	

	
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดขนาดยา	
<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าขีดบอกขนาดยาดังไว้ที่ -0- รูป J • หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาเพื่อเลือกจำนวนยูนิตที่ท่านต้องการฉีด • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเลือกขนาดยาที่ต้องการ รูป K 	
<ul style="list-style-type: none"> • ยูนิตที่แสดงบนตัวเลขแสดงขนาดยาจะบอกขนาดยา สามารถเพิ่มขนาดยาได้ครั้งละ 10 ยูนิต • ท่านจะได้ยินเสียง 'คลิก' ทุกครั้งที่หมุนวงแหวนตั้งขนาดยา ห้ามกำหนดขนาดยาโดยการนับจำนวนเสียงคลิกที่ท่านได้ยิน • หากท่านเลือกขนาดยาผิด ท่านสามารถหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อให้ได้ขนาดยาที่ถูกต้อง 	

	<p>K</p> 
<ul style="list-style-type: none"> เมื่อขนาดยาตรงกับขีดบอกขนาดยา แสดงว่าท่านได้เลือกขนาดยาเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเลือกขนาดยาที่ท่านต้องการ รูปแสดงตัวอย่างวิธีการเลือกขนาดยาอย่างถูกต้อง ดูรูป L หากตัวเลขแสดงขนาดยาหยุดก่อนที่ท่านจะถึงขนาดยาที่กำหนดไว้ โปรดดูหัวข้อ 'ท่านมีอะริคส์เพียงพอหรือไม่' ด้านล่างคำแนะนำเหล่านี้ 	<p>L</p> 
<p>เลือกบริเวณที่ฉีดยา</p> <ul style="list-style-type: none"> เลือกบริเวณที่ฉีดบนหน้าท้อง (รักษาระยะห่างจากสะดือ 5 ซม.) ขาด้านบน หรือแขนด้านบน ท่านอาจฉีดในบริเวณเดิมของร่างกายในแต่ละสัปดาห์ แต่ต้องแน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกับที่ใช้ในการฉีดครั้งล่าสุด 	
<p>ขั้นตอนที่ 4 ฉีดยา</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • แทงเข็มเข้าไปในผิวหนังจนสุด รูป M • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเห็นตัวเลขแสดงขนาดยาได้ ห้ามปิดตัวเลขแสดงขนาดยาหรือใช้นิ้วมือสัมผัส เพราะอาจทำให้การฉีดหยุดได้ 	<p>M</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขแสดงขนาดยาปรากฏ -0- • กดปุ่มฉีดยาต่อไปโดยให้เข็มอยู่ในผิวหนัง แล้วค่อย ๆ นับถึง 6 -0- ต้องตรงกับขีดบอกขนาดยา รูป N ท่านอาจได้ยินหรือรู้สึกถึงเสียงคลิกเมื่อตัวเลขแสดงขนาดยากลับมาที่ -0- 	<p>N</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • ดึงเข็มออกจากผิวหนัง จากนั้นจึงปล่อยปุ่มฉีดยา รูป O • หากถอนเข็มออกก่อน อะไหล่สีอาจไหลเป็นสายออกมาจากปลายเข็มและจะได้รับการยาไม่ครบตามขนาดยาทั้งหมด • หากมีเลือดปรากฏบริเวณที่ฉีด ให้กดเบา ๆ บริเวณที่ฉีดเพื่อหยุดเลือด • ท่านอาจเห็นหยดของอะไหล่สีที่ปลายเข็มหลังจากฉีด ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ส่งผลต่อขนาดยาของท่าน 	<p>O</p> 

<p>ขั้นตอนที่ 5 หลังจากฉีดยา</p> <ul style="list-style-type: none"> • ค่อย ๆ สอดปลายเข็มเข้าไปในปลอกเข็มชั้นนอกบนพื้นผิวเรียบ โดยไม่สัมผัสเข็มหรือปลอกเข็มชั้นนอก ดูรูป P • เมื่อใส่ปลอกเข็มแล้ว ให้ค่อย ๆ ดันปลอกเข็มชั้นนอกเข้าจนสุด 	
<ul style="list-style-type: none"> • คลายเกลียวเข็มแล้วทิ้งอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือหน่วยงานท้องถิ่น ดูรูป Q • อย่าพยายามใส่ปลอกเข็มชั้นในกลับเข้าที่เข็ม ท่านอาจโดนเข็มที่มิดได้ • ควรถอดเข็มและทิ้งทันทีหลังการฉีดยาทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน การติดเชื้อ เข็มอุดตัน และการให้ขนาดยาไม่ถูกต้อง • ห้ามเก็บปากกาฉีดยาโดยที่มีเข็มติดอยู่ 	
<ul style="list-style-type: none"> • ใส่ปลอกปากกานบนปากกาฉีดยาของท่านหลังการใช้งานแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันอะริคส์จากแสง ดูรูป R • เมื่อปากกาฉีดยาไม่มียาเหลือแล้ว ให้ทิ้งปากกาโดยที่ไม่มีเข็มติดอยู่ด้วยตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือหน่วยงานท้องถิ่น • สามารถทิ้งเอกสารกำกับยาและกล่องเปล่าพร้อมกับขยะในครัวเรือนของท่านได้ 	

ท่านมีอะวิคัลเพียงพอหรือไม่

- หากตัวเลขแสดงขนาดยาหยุดก่อนที่จะถึงขนาดยาที่ต้องการ แสดงว่ามีอะวิคัลเหลือไม่เพียงพอสำหรับขนาดยาทั้งหมดที่ท่านต้องใช้ ตัวเลขที่แสดงบนตัวเลขแสดงขนาดยา คือจำนวนยูนิตที่เหลืออยู่ในปากกาฉีดยา
- หากท่านต้องการใช้อะวิคัลมากกว่าปริมาณที่เหลืออยู่ในปากกาฉีดยา ท่านสามารถแบ่งขนาดยาโดยใช้ปากกาสองด้ามได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านคำนวณอย่างถูกต้องหากท่านจะแบ่งขนาดยา หากท่านไม่มั่นใจ ให้ทิ้งปากกาฉีดยาที่ใช้แล้ว และฉีดขนาดยาทั้งหมดที่ต้องการด้วยปากกาฉีดยาด้ามใหม่
- หากท่านแบ่งขนาดยาไม่ถูกต้อง ท่านจะฉีดอะวิคัลน้อยเกินไปหรือมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้



⚠ ข้อมูลสำคัญ

- **เข็มสำหรับการใช้ครั้งเดียวเท่านั้น** อย่านำเข็มกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน การติดเชื้อ การรั่วไหลของอินซูลิน เข็มอุดตัน และการให้ขนาดยาที่ไม่ถูกต้อง
- **ดูแลปากกาอย่างระมัดระวัง** การใช้ปากกาฉีดยาอย่างไม่ใส่ใจหรือใช้ปากกาฉีดยาผิดวิธี อาจทำให้ได้รับขนาดยาไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไป
- **ผู้ดูแลต้องใส่ใจความระมัดระวังอย่างมากในการใช้เข็ม** เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการติดเชื้อจากเข็มทิ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ
- **หากท่านมีสายตาไม่ดีและไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ได้ ห้ามใช้ปากกาฉีดยานี้โดยไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ** ขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีสายตาดีซึ่งได้รับการฝึกฝนการใช้ปากกาฉีดยาอะวิคัล
- **เก็บปากกาฉีดยาและเข็มให้พ้นสายตาและการเอื้อมถึงของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก**
- **ฉีดอะวิคัลสัปดาห์ละครั้ง** หากท่านไม่ฉีดอะวิคัลตามที่กำหนด อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไป
- **หากท่านใช้ยาฉีดมากกว่าหนึ่งประเภท เป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องทำการตรวจสอบชื่อและความเข้มข้นของยาบนฉลากปากกาฉีดยาก่อนใช้**
- **ห้ามใช้ปากกาฉีดยาหรือเข็มร่วมกับผู้อื่น**

การดูแลปากกาฉีดยา

- ห้ามแช่แข็งอะวิคัล ห้ามใช้อะวิคัลหากยานี้ถูกแช่แข็ง ให้ทิ้งปากกาฉีดยานี้ไป
- ห้ามทำปากกาฉีดยาหล่นหรือกระทบกับพื้นผิวแข็ง
- หลีกเลี่ยงไม่ให้อะวิคัลโดนแสงแดดโดยตรง
- เก็บอะวิคัลให้ห่างจากความร้อน ไมโครเวฟ และเก็บให้พ้นแสง
- ห้ามพยายามซ่อมปากกาฉีดยาหรือดึงออกจากกัน
- ห้ามให้ปากกาฉีดยาสัมผัสกับฝุ่น สิ่งสกปรก หรือของเหลว
- ห้ามล้าง แช่ หรือทำการหล่อลื่นปากกาฉีดยาของท่าน อาจทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกสูตรอ่อนบนผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
- ดูด้านหลังของเอกสารกำกับยานี้เพื่ออ่านภาวะในการเก็บรักษาปากกาฉีดยาของท่าน

Signature Page for VV-LAB-116653 v1.0

การอนุมัติ	PPHM (Patarin Phanthumitr) Regulatory 30-Jun-2024 14:52:19 GMT+0000
------------	---

Signature Page for VV-LAB-116653 v1.0