

เซมากลูไทด์ ความแรง 0.68, 1.34, 2.27, 3.2 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิตร ชนิดสารละลายสำหรับฉีด บรรจุในปากกาฉีดยา ชื่อการค้า Wegovy® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 mg FlexTouch® (วิโกวี® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 มิลลิกรัมเฟลิกซ์ทัช®)
--

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
- ยานี้ชื่อว่า เซ-มา-กลู-ไทด์ (semaglutide)
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
- ยานี้ใช้ร่วมกับการคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อ
 - ลดน้ำหนัก ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 30 ขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 27 ขึ้นไปและมีปัญหาสุขภาพ
 - ควบคุมน้ำหนัก ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีโรคอ้วน และน้ำหนักตัวมากกว่า 60 กิโลกรัม
 - ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองแตกในผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

- 2.1 ยานี้ห้ามใช้เมื่อไร
- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- 2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้
- มีโรคเบาหวาน
 - มีโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน
 - มีโรคตับหรือโรคไตอย่างรุนแรง
 - มีโรคหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง
 - อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
 - ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาลดระดับน้ำตาลในเลือด และผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอื่น
- “สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
 - เพราะขนาดยาขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ฉีดยานี้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยฉีดวันเดียวกันของทุกสัปดาห์
 - ฉีดยาในเวลาใดของวันก็ได้
 - ถ้าไม่สามารถฉีดยาในวันเดิมได้ทุกสัปดาห์ สามารถเลือกฉีดวันอื่นได้ แต่การฉีดยาแต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย 3 วัน
 - ยานี้มาในรูปแบบปากกาใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดบริเวณต้นขา ต้นแขน หรือหน้าท้อง
 - ห้ามฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ
 - เปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้งที่ฉีดยา เพื่อป้องกันเข็มอุดตัน
 - ห้ามใช้ยานี้หาพบว่ามีปากกามีความเสียหายหรือสารละลายในหลอดยาขุ่นหรือเปลี่ยนสี
 - ตรวจสอบฉลากของปากกาทุกครั้งก่อนฉีดยา เพื่อป้องกันการใช้น้ำยาสลับกับยาตัวอื่น
 - วิธีฉีดยา ศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อ “คำแนะนำการใช้วิโกวี”

- 3.2 ถ้าลืมฉีดยาคควรทำอย่างไร
- ถ้าฉีดได้ภายใน 5 วัน ให้ฉีดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แล้วฉีดยาครั้งต่อไปตามตารางการฉีดยา
 - ถ้าฉีดได้หลังจาก 5 วัน ให้ข้ามไปฉีดยาในครั้งถัดไปตามตารางการฉีดยา
 - ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า เพื่อชดเชยยาที่ลืม

- 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมกับยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ของยานี้ หากมีอาการผิดปกติ โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ อาเจียน

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดหรือปรับขนาดยาเอง ใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอาการอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ระหว่างใช้ยานี้ อาจจะทำให้มีอาการมึนงงได้ ให้หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หากมีอาการมึนงง
- ดื่มน้ำมากๆ เมื่อมีอาการอาเจียน หรือท้องเสีย เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ
- คุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์
- หากท่านมีกำหนดการผ่าตัดที่ต้องใช้ยาสลบฤทธิ์รุนแรงแพทย์ของท่านว่าท่านกำลังใช้ยานี้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
 - การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป
 - ปวดท้องอย่างรุนแรง ปวดท้องร้าวมาที่หลัง
 - ท้องผูกอย่างรุนแรงร่วมกับมีอาการปวดท้อง ท้องอืด อาเจียน

“ให้ไปพบแพทย์ทันที”

- 5.2 อาการถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์
- ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
 - ท้องเสียหรือท้องผูก ปวดท้อง
 - อาหารไม่ย่อย แน่นท้อง ท้องอืด เรอ
 - สับสนหรือกลางอก กรดไหลย้อน
 - การรับรสเปลี่ยนไป
 - การรู้สึกที่ผิวหนังเปลี่ยนไป
 - มึนงง
 - ผมรั้ง
 - บวม แดง ระคายเคืองบริเวณที่ฉีดยา
 - อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ใจสั่น เหงื่อออก หิวมาก กระสับกระส่าย วิงเวียน เป็นลม
 - อาการความดันต่ำ เช่น วิงเวียนเมื่อยืนหรือนั่ง
 - หัวใจเต้นเร็ว

“ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส
- ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ยาที่เปิดใช้แล้วสามารถเก็บในตู้เย็นหรือเก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ได้นาน 6 สัปดาห์ หลังจากเปิดใช้ครั้งแรก
- สวมปลอกปากกาไว้กับด้ามเสมอ เพื่อป้องกันยาจากแสง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา** เป็นสารละลายใส ไม่มีสี บรรจุในหลอดขนาด 1.5 หรือ 3 มิลลิตร ในปากกาฉีดยา
- ตัวยาสาคัญ** คือ เซมากลูไทด์
- ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ ไดโซเดียมฟอสเฟตไดไฮเดรต, โพรพิลีนไกลคอล, ฟีนอล, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำสำหรับฉีด

ผู้ผลิต
1. Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Denmark
2. Novo Nordisk A/S, Hillerød, Denmark
ผู้นำเข้า บริษัท โนวา นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2568
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ [อย.](https://ndi.fda.moph.go.th)



เซมากลูไทด์ ความแรง 0.68, 1.34, 2.27, 3.2 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิตร ชนิดสารละลายสำหรับฉีด บรรจุในปากกาฉีดยา ชื่อการค้า Wegovy® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 mg FlexTouch® (วิโกวี® 0.25, 0.5, 1, 1.7, 2.4 มิลลิกรัมเฟลิกซ์ทัช®)
--



คำแนะนำการใช้วีโกรี

ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้ปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช แบบสัปดาห์ละครั้งของท่าน กรุณาอ่านคำแนะนำนี้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และปรึกษารั้ววิธีฉีดวีโกรีที่ถูกต้องกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของท่าน

ปากกาวีโกรีเป็นปากกาที่สามารถหมุนตั้งขนาดยาได้ ซึ่งบรรจุยาวีโกรีตามขนาดที่แพทย์สั่งให้แก่ท่าน สำหรับการฉีดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งได้รวมทั้งหมดสี่ครั้ง

โปรดใช้ตารางด้านในฝากล่องเพื่อติดตามนับจำนวนครั้งที่ท่านได้ใช้ไปแล้วและจำนวนครั้งที่ยังเหลือฉีดได้ในปากกาของท่าน

วีโกรีอยู่ในรูปแบบปากกาฉีดยาที่มีห้าขนาดความแรงที่แตกต่างกัน ในปากกาแต่ละด้ามจะบรรจุยาเซมากุลไทด์หนึ่งขนาดความแรงดังต่อไปนี้

0.25 mg

0.5 mg

1 mg

1.7 mg

2.4 mg

เริ่มจากการตรวจสอบฉลากบนปากกาของท่านเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปากกาที่มีวีโกรีตามขนาดความแรงที่แพทย์สั่งจ่ายท่าน

ปากกาของท่านได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเข็ม 30G, 31G และ 32G ชนิดใช้ครั้งเดียว ที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 8 มิลลิเมตร

ภายในกล่องประกอบด้วย:

- ปากกาวีโกรี
- เข็มฉีดยาโนโวฟายน์ พลัส 4 อัน
- เอกสารกำกับยา





ปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช (ตัวอย่าง)

หมายเหตุ: ปากกาของท่านอาจมีขนาดและสีของฉลากแตกต่างไปจากที่แสดงในภาพ คำแนะนำนี้ใช้สำหรับปากกาวีโกรี เฟล็กซ์ทัช® ทุกขนาดความแรง



เข็มโนโวฟายน์ พลัส (ตัวอย่าง)



1 เตรียมปากกาของท่านพร้อมกับเข็มฉีดยาอันใหม่ ตรวจสอบข้อยาและขนาดความแรงของปากกาของท่านให้แน่ใจว่าเป็นวีโกวีในขนาดความแรงตามที่แพทย์สั่งจ่ายให้ท่าน ดึงปลอกปากกาออก (ดูรูปภาพ A)	A 
ตรวจสอบสารละลายในปากกาของท่าน ซึ่งต้องเป็นสารละลายใสและไม่มีสี โดยดูที่ช่องมองสารละลายยาที่ด้านปากกา ห้ามใช้ปากกาฉีดยานี้ ถ้าวีโกวีมีลักษณะขุ่นหรือมีสี (ดูรูปภาพ B)	B 
ให้ใช้เข็มฉีดยาอันใหม่เสมอสำหรับการฉีดแต่ละครั้ง นำเข็มฉีดยาขึ้นมา เมื่อท่านพร้อมที่จะฉีดยา ตรวจสอบกระดาศปิดโคนเข็มและปลอกเข็มชั้นนอกกว่ามีความเสียหายใดหรือไม่ ซึ่งสามารถส่งผลต่อความปราศเชื้อ หากพบความเสียหาย ให้ใช้เข็มใหม่แทน ดึงแผ่นกระดาศปิดโคนเข็มออก (ดูรูปภาพ C)	C 
สวมเข็มเข้ากับปลายปากกาในทิศทางตรง หมุนให้แน่น (ดูรูปภาพ D)	D 


เข็มมีปลอกคลุมสองชั้น ท่านต้องถอดปลอกเข็มออกทั้งสองชั้น
หากท่านลืมถอดปลอกเข็มออกทั้งสองชั้นท่านจะไม่สามารถ
ฉีดรีโกวีได้

ดึงปลอกเข็มชั้นนอกออกและเก็บไว้ใช้ภายหลัง ท่านจะต้อง
นำปลอกเข็มชั้นนอกกลับมาใช้เพื่อให้ถอดเข็มออกจากปากกา
ได้อย่างปลอดภัย หลังจากฉีดยาเสร็จแล้ว

ดึงปลอกเข็มชั้นในออกและทิ้งไป อาจเห็นหยดของรีโกวีที่
ปลายเข็ม ท่านจะต้องตรวจสอบการไหลของรีโกวี ถ้าเป็นการใช้
ปากกาตามใหม่ครั้งแรก ดูหัวข้อ 'ตรวจสอบการไหลของยา
เมื่อจะใช้ปากกาตามใหม่แต่ละด้าม'

ห้ามใช้เข็มฉีดยาที่งอหรือชำรุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
การดูแลจัดการเข็มฉีดยา ให้ดูหัวข้อ 'เกี่ยวกับเข็มฉีดยาของท่าน'
ในส่วนที่ต่อจากคำแนะนำนี้

(ดูรูปภาพ E)



การตรวจสอบการไหลของยาเมื่อจะใช้ปากกาตามใหม่แต่ละด้าม
หากปากการีโกวีของท่านได้มีการใช้อยู่แล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่
'2 การตั้งขนาดยา'

ตรวจสอบการไหลของรีโกวีก่อนการใช้ปากกาตามใหม่ฉีด
ในครั้งแรกเท่านั้น

หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนช่องแสดงขนาดยาตรงกับสัญลักษณ์
ที่ตรวจสอบการไหลของยา (■ ■ ■)

(ดูรูปภาพ F)



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ที่ตรวจสอบการไหลของยาอยู่ตรงกับขีดบอกขนาดยา (ดูรูปภาพ G)	G 
การตรวจสอบการไหลของยา ถือปากกาให้อยู่ในแนวตั้ง ปลายเข็มชี้ขึ้น กดปุ่มฉีดยาข้างไว้จนช่องแสดงขนาดยากลับมาที่ 0 ขีดบอกขนาดยาต้องอยู่ตรงกับเลข 0 ควรมองเห็นหยดยาวิโครีที่ปลายเข็ม การมองเห็นหยดยานี้แสดงว่าปากกาของท่านพร้อมใช้แล้ว หากไม่มีหยดยาออกมาที่ปลายเข็ม ให้ตรวจสอบการไหลของยาอีกครั้ง การตรวจสอบนี้ควรทำเพียงสองครั้งเท่านั้น หากยังไม่เห็นหยดยาออกมา ให้เปลี่ยนเข็มและตรวจสอบการไหลอีกครั้งหนึ่ง ห้ามใช้ปากกานี้ หากไม่มีหยดยาวิโครีออกมาที่ปลายเข็ม (ดูรูปภาพ H)	H 

2 การตั้งขนาดยา

หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนกระทั่งช่องแสดงขนาดยาหยุดเคลื่อน และแสดงขนาดยาตามแพทย์สั่ง

(ดูรูปภาพ I)




เส้นประ (|) ในช่องแสดงขนาดยาจะนำท่านไปยังขนาดยาของท่าน

เมื่อหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจะมีเสียงคลิก ซึ่งเสียงคลิกนี้จะแตกต่างกันไปเมื่อหมุนไปข้างหน้า ถอยหลัง หรือหมุนผ่านขนาดยาของท่าน ท่านจะได้ยินเสียง 'คลิก' ทุกครั้งที่ท่านหมุนวงแหวนตั้งขนาดยา

ห้ามตั้งขนาดยาโดยการนับเสียงคลิกที่ท่านได้ยิน

(ดูรูปภาพ J)








เมื่อตัวเลขขนาดยาตามแพทย์สั่งเคลื่อนมาตรงกับขีดบอกขนาดยา หมายถึงท่านเลือกขนาดยานั้น ในภาพแสดงขนาด **0.25 mg** เป็นตัวอย่าง

หากช่องแสดงขนาดยาหยุดเคลื่อนก่อนถึงขนาดยาตามแพทย์สั่ง ให้ไปดูหัวข้อ 'ท่านมีวิโกรีอยู่เพียงพอหรือไม่?' ในส่วนที่ต่อจากคำแนะนำนี้

(ดูรูปภาพ K)



เลือกตำแหน่งที่ฉีดยา เลือกบริเวณต้นแขน ต้นขา หรือ หน้าท้อง (เว้นระยะห่างจากสะดือประมาณ 5 เซนติเมตร) ท่านอาจฉีดบริเวณเดิมได้ในแต่ละสัปดาห์ แต่ไม่ควรฉีดตรงจุดเดียวกับที่ฉีดครั้งที่แล้ว	 ต้นแขน หน้าท้อง ต้นขา
3 การฉีดยา แทงเข็มฉีดยาลงบนผิวหนังของท่าน ต้องแน่ใจว่าท่านสามารถมองเห็นช่องแสดงขนาดยา ระวังอย่าให้นิ้วมือของท่านบดบังช่องแสดงขนาดยา เพราะอาจขัดขวางการฉีดยาได้ (ดูรูปภาพ L)	


กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนช่องแสดงขนาดยาแสดงเลข 0 (รูปภาพ M) กดปุ่มฉีดยาค้างไว้ให้เข็มคาใต้ผิวหนังและนับ 1 ถึง 6 ซ้ำๆ ช่องแสดงขนาดยาจะต้องแสดงตัวเลข 0 ตรงกับขีดบอกขนาดยา ท่านอาจรู้สึกหรือได้ยินเสียงคลิกเมื่อช่องแสดงขนาดยากลับมา แสดงเลข 0 (รูปภาพ N)	M  N 
ดึงเข็มฉีดยาออกจากผิวหนังของท่าน หากท่านดึงเข็มออกก่อน อาจมีวีโก้ไหลออกจากปลายเข็มเป็นสาย และท่านจะได้รับยา ไม่ครบตามขนาด ถ้ามีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยา ให้กดปิดไว้เบาๆเพื่อห้ามเลือด ท่านอาจเห็นหยดวีโก้ที่ปลายเข็มหลังจากการฉีดได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่มีผลต่อขนาดยาที่ท่านได้รับ (รูปภาพ O)	O 

4 หลังการฉีดยา

สอดปลายเข็มเข้าไปในปลอกเข็มชั้นนอกที่วางบนพื้นราบ โดยท่านต้องไม่สัมผัสกับเข็มหรือปลอกเข็มชั้นนอก

เมื่อเข็มถูกครอบด้วยปลอกเข็มชั้นนอกแล้ว ให้กดปลอกเข็มชั้นนอกอย่างระมัดระวังจนปิดสนิท

(ดูรูปภาพ P)




คลายเกลียวเพื่อถอดเข็มออกและนำไปทิ้งด้วยความระมัดระวังตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของท่าน

ห้ามพยายามสวมปลอกเข็มชั้นในเข้ากับเข็ม เพราะท่านอาจถูกเข็มทิ่มตำได้

ควรถอดเข็มทิ้งทันทีภายหลังการฉีดแต่ละครั้งเพื่อป้องกันเข็มอุดตัน การปนเปื้อน การติดเชื้อ และการได้รับยาในขนาดที่ไม่ถูกต้อง ห้ามเก็บปากกาโดยที่ยังมีเข็มติดอยู่

(ดูรูปภาพ Q)




สวมปลอกปากกาหลังการฉีดแต่ละครั้งให้เพื่อป้องกันวีโครีจากแสง (ดูรูปภาพ R)	
เมื่อยาในปากกาหมดแล้ว ให้ทิ้งปากกาไปโดยต้องไม่มีเข็มติดอยู่ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เกสัชกร หรือหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของท่าน ปลอกปากกาและกล่องเปล่าสามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนของท่านได้	
เกี่ยวกับเข็มฉีดยาของท่าน	
วิธีตรวจสอบเข็มที่อุดตันหรือชำรุด - หากช่องแสดงขนาดยาไม่แสดงเลข -0- หลังจากที่ถูกปั๊มฉีดยาค้างไว้ แสดงว่าท่านอาจใช้เข็มที่อุดตันหรือชำรุด - ซึ่งแสดงว่า ท่านยังไม่ได้รับวีโครี แม้ว่าช่องแสดงขนาดยาจะเคลื่อนจากขนาดยาเดิมที่ท่านตั้งไว้ก็ตาม วิธีจัดการกับเข็มที่อุดตัน - ให้เปลี่ยนเข็มตามที่แนะนำในหัวข้อที่ '1 เตรียมปากกาของท่านพร้อมกับเข็มฉีดยาอันใหม่' และไปหัวข้อที่ '2 การตั้งขนาดยา'	
การดูแลปากกาของท่าน	
ให้ดูแลรักษาปากกาของท่านด้วยความระมัดระวัง การใช้อย่างไม่ระมัดระวังหรือใช้ผิดวิธีอาจทำให้ได้รับยาในขนาดที่ไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนั้น ท่านอาจไม่ได้รับผลการรักษาที่ต้องการจากวีโครี - ดูด้านหลังของเอกสารนี้เพื่ออ่านคำแนะนำสถานะการเก็บรักษาปากกาของท่าน ไม่ฉีดวีโครีที่ผ่านการสัมผัสแสงแดดโดยตรง ไม่เก็บวีโครีในช่องแช่แข็งและห้ามฉีดวีโครีที่ผ่านการแช่แข็ง ให้ทิ้งปากกานั้นไป ห้ามทำปากกาดกหรือเคาะกับของแข็ง ห้ามพยายามบรรจุยาเข้าไปในปากกาของท่าน เมื่อยาในปากกาหมด จะต้องทิ้งปากกานั้น	

- ห้ามพยายามซ่อมปากกาของท่านหรือดึงชิ้นส่วนปากกาออกจากกัน
- เก็บปากกาฉีดยาของท่านให้พ้นจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก หรือของเหลว
- ห้ามล้าง แช่ หรือ ใช้สารหล่อลื่นกับปากกาฉีดยาของท่าน หากจำเป็น ให้เช็ดทำความสะอาดปากกาด้วยผ้าหมาดที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน

ท่านมีรีโกรีอยู่เพียงพอหรือไม่?

หากช่องแสดงขนาดยาหยุดก่อนถึงขนาดยาของท่านตามที่แพทย์สั่ง แสดงว่ารีโกรีที่เหลืออยู่นั้นมีปริมาณไม่ครบตามขนาดที่ต้องการ ให้ทิ้งปากกานั้นและใช้ปากการีโกรีตัวใหม่



ข้อมูลสำคัญ

- รีโกรีใช้ฉีดเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้น หากท่านไม่ใช้รีโกรีตามที่แพทย์สั่ง ท่านอาจไม่ได้รับผลการรักษาที่ต้องการจากยานี้
- หากท่านต้องใช้ยาฉีดมากกว่าหนึ่งชนิด เป็นสิ่งสำคัญมากที่ท่านจะต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดความแรงบนฉลากปากกาก่อนใช้
- ท่านไม่ควรใช้ปากกาฉีดโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ หากท่านมีสายตาไม่ดีและไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ได้ ท่านควรขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีสายตาดีที่ได้รับการอบรมวิธีใช้ปากการีโกรีแล้ว
- ควรเก็บปากกาและเข็มฉีดยาให้พ้นจากสายตาและพันมือผู้อื่นเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเด็ก
- ห้ามใช้ปากกาและเข็มฉีดยาของท่านร่วมกับผู้อื่น
- เข็มฉีดยาเป็นเข็มสำหรับการใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามนำเข็มของท่านกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากเข็มอาจอุดตัน มีการปนเปื้อน การติดเชื้อ และฉีดยาได้ในขนาดที่ไม่ถูกต้อง
- ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยจะต้องใช้เข็มด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการถูกเข็มทิ่มตำและการติดเชื้อ

Signature Page for VV-LAB-111841 v1.0

Approval	KXKA (Kankanit Kallayasiri) Regulatory 14-Mar-2024 10:51:38 GMT+0000
----------	--

Signature Page for VV-LAB-111841 v1.0