

ทูโรคโทค็อกแอลฟาฟีกอล

ความแรง 500, 1000 หน่วยสากล

ชนิดผงและตัวทำละลายสำหรับฉีด

ชื่อการค้า Esperoct® (เอสเพอริอค®)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าทูโรคโทค็อกแอลฟาฟีกอล (turoctocog alfa pegol) เป็นยาในกลุ่มแฟคเตอร์ 8 ชนิดออกฤทธิ์นาน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้สำหรับรักษาและป้องกันภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเอชนิดขาดแฟคเตอร์ 8 โดยกำเนิด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X เคยแพ้โปรตีนจากหนูแฮมสเตอร์

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - กำลังใส่สายสวนหลอดเลือด
 - หากต้องจำกัดปริมาณเกลือโซเดียม
 - เคยใช้ยากลุ่มแฟคเตอร์ 8 มาก่อน
 - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง กำลังให้นมลูก

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ
- กรณีที่ท่านต้องฉีดยาเองหรือให้ญาติฉีดให้ แพทย์หรือพยาบาลจะสอนวิธีฉีดยาให้กับท่าน
- ไม่ใช้ยานี้ หากผงยาเปลี่ยนสี
- ไม่ใช้ยานี้ หากยาที่ผสมแล้วขุ่นหรือมีสี

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านลืมฉีดยา ให้ไปฉีดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าเพื่อชดเชยการลืม จากนั้นให้ฉีดยาครั้งต่อไปตามแผนการฉีดเดิม

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
- ห้ามเพิ่มหรือปรับขนาดยาเอง
- ให้ปรึกษาแพทย์ หากใช้ยาขนาดเดิมแล้วควบคุมภาวะเลือดออกไม่ได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก และมือ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผื่นหรือเลือดออกผื่นปกติ
- ผื่นหนังซีดและเย็น หัวใจเต้นเร็ว

“หากมีอาการเหล่านี้

ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- แดงและคันบริเวณที่ฉีดยา
- ผื่นหนังแดง คัน หรือมีผื่น

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บขวดยาไว้ในกล่องเดิมเพื่อป้องกันแสง
- ผงยาก่อนผสม
 - กรณีเก็บในตู้เย็น ให้เก็บในช่องธรรมดา ห้ามแช่แข็ง
 - กรณีเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บได้ไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นอายุยา
 - กรณีเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 30 ถึง 40 องศาเซลเซียส เก็บได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นอายุยา
 - ให้บันทึกวันที่เริ่มเก็บยาและอุณหภูมิที่เก็บยาไว้บนกล่องผลิตภัณฑ์
 - เมื่อนำยาออกจากตู้เย็นแล้ว ห้ามเอากลับไปแช่เย็นอีก
- หลังจากผสมผงยาแล้วให้ใช้ยาทันที
- หลังจากผสมผงยาแล้วไม่ใช้ทันที อย่าเพิ่งดูดยาออกจากขวด โดย
 - กรณีเก็บในตู้เย็น ให้ใช้ภายใน 2 ชั่วโมง
 - กรณีเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ให้ใช้ภายใน 4 ชั่วโมง
 - กรณีเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 30 ถึง 40 องศาเซลเซียส ให้ใช้ภายใน 2 ชั่วโมง
- เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและพ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยานี้มี 2 ความแรงคือ 500 และ 1000 หน่วยสากล ยาแต่ละกล่องประกอบด้วย ขวดยาที่มีผงยาเป็นผงสีขาวถึงสีขาวนวล ส่วนตัวทำละลายใสไม่มีสีบรรจุในกระบอกฉีดยา มีก้านสูบและอุปกรณ์สำหรับสวมปากขวดยา
- ตัวยาสำคัญ คือ ทูโรคโทค็อกแอลฟาฟีกอล
- ส่วนประกอบอื่น ๆ
 - ผงยาประกอบด้วย แอล-ฮีสทีดีน, ซูโครส, พอลิซอร์เบต 80, โซเดียมคลอไรด์, แอล-เมไธโอนีน, แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต, โซเดียมไฮดรอกไซด์, กรดไฮโดรคลอริก
 - ตัวทำละลายประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์และน้ำสำหรับฉีด

ผู้ผลิต

- Novo Nordisk A/S, Gentofte, Denmark
 - Novo Nordisk A/S, Kalundborg, Denmark
- ผู้นำเข้า บริษัท โนวา นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร