

**ทูร็อกโทค็อกแอลฟาพีกอล**  
**ความแรง**  
**500 หรือ 1000 หน่วยสากล**  
**ชนิดผงและตัวทำละลายสำหรับฉีด**  
**ชื่อการค้า Esperoct® (เอสเพอริค®)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า ทู-ร็อก-โท-ค็อก-แอล-ฟา-พี-กอล (turoctocog alfa pegol)
- เป็นยาในกลุ่มแฟคเตอร์ 8 ชนิดออกฤทธิ์นาน

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ใช้รักษาและป้องกันภาวะเลือดออก ในผู้ป่วยโรคเลือดออกผิดปกติ (โรคฮีโมฟีเลีย)

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้โปรตีนจากหนูแฮมสเตอร์

**2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออกแพทย์**  
**หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- กำลังใส่สายสวนหลอดเลือด
- มีโรคหัวใจ
- หากต้องจำกัดปริมาณเกลือโซเดียม
- เคยใช้ยาในกลุ่มแฟคเตอร์ 8 มาก่อน
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร**  
**ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเท่านั้น
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน
- กรณีที่ท่านต้องฉีดยานี้เองหรือให้ญาติฉีดให้ แพทย์หรือพยาบาลจะสอนวิธีฉีดยานี้ให้กับท่าน
- ห้ามใช้ยานี้ หากผงยาเปลี่ยนสี
- ห้ามใช้ยานี้ หากยาที่ผสมแล้วขุ่นหรือมีสี

**3.2 ถ้าลืมฉีดยาควรทำอย่างไร**

- ฉีดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับการฉีดยาครั้งถัดไป ให้รอไปฉีดยาครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร**

- ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจจะเกิดจากยา
- ห้ามหยุดหรือปรับขนาดยาเอง ใช้ยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
  - ผิวหนังช้ำและเย็น หัวใจเต้นเร็ว
  - ยังคงมีเลือดออก ถึงแม้จะได้รับยานี้ไปแล้ว
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- แดงและคันบริเวณที่ฉีดยา
- ผิวหนังแดง คัน หรือมีผื่น

**“เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**  
**แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง
- ผงยาก่อนผสม
  - กรณีเก็บในตู้เย็น ให้เก็บในช่องธรรมดา ห้ามแช่แข็ง
  - กรณีเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บได้ไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นอายุยา
  - กรณีเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 30-40 องศาเซลเซียส เก็บได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวันสิ้นอายุยา
- ให้บันทึกวันที่เริ่มเก็บยาและอุณหภูมิที่เก็บยาไว้บนกล่องผลิตภัณฑ์
- เมื่อนำยาออกจากตู้เย็นแล้ว ห้ามนำยากลับไปแช่เย็นอีก
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- หลังจากผสมผงยาแล้วให้ใช้ยาทันที

- หลังจากผสมผงยาแล้ว ถ้าไม่ใช้ทันทีอย่าเพิ่งดูดยาออกจากขวด โดย
  - กรณีเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ให้ใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
  - กรณีเก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ให้ใช้ภายใน 4 ชั่วโมง
  - กรณีเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 30-40 องศาเซลเซียส ให้ใช้ภายใน 2 ชั่วโมง

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** เป็นผงยาสีขาวหรือสีขาวนวลบรรจุในขวดแก้ว และสารละลายใสสำหรับละลายผงยาบรรจุในหลอดฉีดยา
- **ตัวยาสำคัญ** คือ ทูร็อกโทค็อกแอลฟาพีกอล ความแรง 500 หรือ 1000 หน่วยสากล
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** แอล-ฮีสทีดีน (L-histidine) ซูโครส (sucrose) พอลิซอร์เบต 80 (polysorbate 80) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) แอล-เมไธโอนีน (L-methionine) แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต (calcium chloride dihydrate) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) น้ำสำหรับฉีด (water for injection)

**ผู้ผลิต**

1.Novo Nordisk A/S, Gentofte, Denmark  
2.Novo Nordisk A/S, Kalundborg, Denmark  
**ผู้นำเข้า** บริษัท โนวา นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21 พฤษภาคม 2567

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>  
<http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**