

**เซมากลูไทด์
ความแรง 3, 7 และ
14 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า
**Rybelsus® 3 mg,
Rybelsus® 7 mg และ
Rybelsus® 14 mg**
(รีเบลชุส® 3 มิลลิกรัม,
รีเบลชุส® 7 มิลลิกรัม และ
รีเบลชุส® 14 มิลลิกรัม)**

1. ยานี้คือยาอะไร

- 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร
 - ยานี้ชื่อว่า เซ-มา-กลู-ไทด์ (Semaglutide)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด
- 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร
 - ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้เป็นยาเดียวหรือใช้ร่วมกับยาอื่น เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

- 2.1. ห้ามใช้ยาเมื่อไหร่
 - เคยแพ้ยา นี้ หรือ ส่วนประกอบของยา
- 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาเมื่อไหร่
 - **ไม่ควรกินอาหารที่มีไขมันสูง** ให้บวกแพทช์หากห่านม ภาวะต่อไปนี้
 - เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1
 - เคยมีภาวะเลือดเป็นกรด ที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน
 - มีอาการปวดท้องรุนแรงหรือเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ
 - เป็นโรคประจำตัวเลื่อนจากเบาหวาน
 - เป็นโรคไตawayเรื้อรังระยะสุดท้าย
 - ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่ โดยเฉพาะยารักษาเบาหวานในกลุ่ม ชัลฟินิลยูเรีย อินซูลิน ยารักษาไทรอยด์ ชื่อเลโวไทรอกซิน และยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานชื่อ วาร์ฟาริน

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร ก้าห่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าว หรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
- กินยาต้อนห้องว่างในเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งวัน
- หลังจากกินยาให้รออย่างน้อย 30 นาที ก่อนกินอาหาร เครื่องดื่ม หรือยาอื่น ๆ
- กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำเครื่องแก้ว (ไม่เกิน 120 มิลลิลิตร) ห้ามหักแบ่ง บด หรือเคี้ยวเม็ดยา
- ไม่แนะนำให้กินยาขนาด 7 มิลลิกรัม จำนวน 2 เม็ด เพื่อทดแทนยาขนาด 14 มิลลิกรัม จำนวน 1 เม็ด

3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามยาเม็ดที่ลืม ไปกินยาในวันถัดไป
- ห้ามเพิ่มน้ำยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยดยาเอง กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- พบแพทช์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและการอันตรายที่อาจเกิดจากยา
- ให้ระวังการขับรถหรือใช้เครื่องจักร หากมีอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ หรืออาการวิงเวียน
- หากมีอาการคื่นไส้ หรืออาเจียน หรือห่องเสีย ให้ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ โดยเฉพาะถ้าห่านมมีปัญหาเกี่ยวกับไต
- ต้องใช้ยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมให้รีบปรึกษาแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที
 - บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวนังหลุดลอก มีจ้ำดามคิวหนัง
 - การมองเห็นผิดปกติ ซึ่งอาจจะเป็นอาการของจองประสาตาเลื่อนจากเบาหวาน
 - ปวดห้องอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอาการของภาวะตับอ่อนอักเสบ
 - ห้องผูกอย่างรุนแรงร่วมกับมีอาการปวดห้อง ห้องอีด อาเจียน “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้า 1.0 มีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- น้ำตาลในเลือดต่ำ (เข่น เหงื่อออก ตัวเย็นชืด ปวดหัว ใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ หัวมาก การมองเห็นเปลี่ยนแปลง ง่วงนอนหรืออ่อนเพลีย วิตกกังวลหรือสับสน ไม่มีสมาธิ สั่น)
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดห้อง ห้องผูกหรือห้องเสีย
- กระเพาะอาหารอักเสบ “ไม่สบายห้อง หรืออาหารไม่ย่อย
- กรดไหลย้อน หรือแสบร้อนกลางอก
- เหนื่อย อ่อนเพลีย วิงเวียน
- ห้องอีด ห้องเพ้อ เรอ
- กระเพาะอาหารบีบตัวชาลง การรับรสเปลี่ยนไป
- น้ำหนักลด น้ำในถุงน้ำดี ซึ่งจะเด่นเร็ว “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาเมื่อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทิ้งไว้ในครัวเรือนที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะของยา เป็นเม็ดรี สีขาวถึงสีเหลืองอ่อน
- **รีเบลชุส® 3 มิลลิกรัม** ภายใต้ชื่อ เซมากลูไทด์ ขนาด 3 มิลลิกรัม เม็ดยา ด้านหนึ่งมีเลข 3 และอีกด้านหนึ่งมีคำว่า novo
- **รีเบลชุส® 7 มิลลิกรัม** ภายใต้ชื่อ เซมากลูไทด์ ขนาด 7 มิลลิกรัม เม็ดยา ด้านหนึ่งมีเลข 7 และอีกด้านหนึ่งมีคำว่า novo
- **รีเบลชุส® 14 มิลลิกรัม** ภายใต้ชื่อ เซมากลูไทด์ ขนาด 14 มิลลิกรัม เม็ดยา ด้านหนึ่งมีเลข 14 และอีกด้านหนึ่งมีคำว่า novo
- บรรจุในแพลงก์ลูมีเนียม และบรรจุในกล่อง กล่องละ 10 หรือ 30 เม็ด

- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ ชาลคาโปรดีไซด์ (salcaprozate sodium) โพวิดอนเค-90 (povidone K90) เชลูลอลไมโครคริสตัลลีน (cellulose microcrystalline) แมกนีเซียมสเตียเรต (magnesium stearate)

ผู้ผลิต Novo Nordisk A/S, Måløv,

Denmark

ผู้นำเข้า บริษัท โนโน นอร์ดิสค์ ฟาร์มา

(ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

กันยายน 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์

ของ อย.

• <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/>

Pages/Main.aspx

• <http://ndi.fda.moph.go.th>

**เซมากลูไทด์
ความแรง 3, 7 และ
14 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า
**Rybelsus® 3 mg,
Rybelsus® 7 mg และ
Rybelsus® 14 mg**
(รีเบลชุส® 3 มิลลิกรัม,
รีเบลชุส® 7 มิลลิกรัม และ
รีเบลชุส® 14 มิลลิกรัม)**



Signature Page for VV-LAB-120083 v1.0

| | |
|----------|--|
| Approval | PMKG (Premchanok Khamchang) Regulatory 07-Oct-2024 01:46:08 GMT+0000 |
|----------|--|

Signature Page for VV-LAB-120083 v1.0