

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน (เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)
พลาสเตอร์บรรเทาปวด
COUNTERPAIN MEDICATED PLASTER WARM

1. ชื่อยา

COUNTERPAIN MEDICATED PLASTER WARM

2. ลักษณะยา

แผ่นพลาสเตอร์ผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำตาลอ่อน ด้านหนึ่งเคลือบด้วยเพสต์สีขาวถึงสีเหลืองอ่อน กลิ่นเมนทอล และมีแผ่นฟิล์มพลาสติกใสปิดทับ

3. ส่วนประกอบของยา

ตัวยาลำคัญ glycol salicylate 2.0% (w/w), l-menthol 1.0%(w/w) ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ 4-hydroxy-3-methoxybenzyl nonylic acid amide (nonivamide), tocopherol acetate, styrene-iso-prene-styrene block copolymer, polyisobutylene, liquid paraffin, macrogol 400, ester gum, titanium oxide, silicon dioxide, 2-mercaptobenzimidazole, dibutylhydroxytoluene

4. ความแรงของยา

ใน 100 กรัมของเพสต์(paste): glycol salicylate 2.0% (w/w), l-menthol 1.0%(w/w)

5. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

6. คุณควรใช้ยาปริมาณเท่าไร และบ่อยเพียงใด

ใช้เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อ ควรเปลี่ยนพลาสเตอร์วันละ 1-2 ครั้ง

7. เมื่อไรคุณไม่ควรใช้ยานี้

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้

8. อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่น ผื่นแดง คัน ผิวหนังพุพอง

9. ขณะใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือรับประทาน

อาหารประเภทใด

- ห้ามปิดพลาสเตอร์บริเวณที่มีอาการปวด หากได้รับการประคบร้อนด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อน เช่น เครื่องอุ่นเท้า และผ้าห่มไฟฟ้า

- หากท่านเริ่มยาตัวใหม่ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนว่ากำลังใช้ยา Counterpain Medicated Plaster Warm อยู่

10. คุณควรทำอย่างไรถ้าคุณลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด สามารถปิดพลาสเตอร์ทันทีที่นึกได้และไม่ควรปิดพลาสเตอร์เพิ่มเอง

11. คุณควรเก็บรักษายาอย่างไร

เก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้

ถูกแสงแดด เก็บยาให้พ้นมือเด็ก หลังเปิดซองแล้ว ให้พับปากซองสองทบสำหรับการเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป

12. ลักษณะและอาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด

ไม่พบรายงานการใช้ยาเกินขนาด

13. คุณควรทำอย่างไรถ้าใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำ ลอกพลาสเตอร์ออก หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้พบแพทย์หรือเภสัชกรทันที

14. ชื่อ/สัญลักษณ์ของผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์/ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรนำเข้าโดย

บริษัท ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ผลิตโดย

Tokuhon Corporation Miyashiro Factory, Minamisaitama-gun, Saitama, JAPAN ภายใต้อิทธิพลของ

Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., JAPAN

15. ข้อควรปฏิบัติในระหว่างใช้ยา

- ห้ามใช้พลาสเตอร์นี้ในบริเวณเย็บอุ้งน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด

- หากผิวหนังง่าย ไม่ควรปิดพลาสเตอร์บริเวณเดิมติดต่อกัน

- สามารถตัดพลาสเตอร์เป็นชิ้นเล็กๆ และปิดบริเวณด้านในของแขนเพื่อทดสอบก่อนว่าจะไม่เกิด ผื่นแดง คัน ผิวหนังพุพอง

- ลอกพลาสเตอร์ออกก่อนอาบน้ำประมาณ 1 ชั่วโมง การอาบน้ำทันทีอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้

16. เมื่อไรคุณควรปรึกษาแพทย์

- หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่น ผื่นแดง คัน ผิวหนังพุพอง ให้หยุดยาและไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

- หากปิดพลาสเตอร์นี้ต่อเนื่องกัน 5-6 วันแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ หากเป็นผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยานี้

17. วันที่แก้ไขปรับปรุงเอกสาร

12 ตุลาคม 2564