



กระต่ายบิน โททรอล (FLYING RABBIT TOTAL)

BISMUTH SUBSALICYLATE ORAL SUSPENSION

ลักษณะยา : เป็นน้ำแขวนตะกอนสีชมพู

ความแรงของตัวยาสำคัญ : Each 15 ml contains : Bismuth subsalicylate 262 mg

เภสัชพลศาสตร์ : การรักษาอาการท้องเสียโดยออกฤทธิ์ Antisecretory และออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Antimicrobial) ฤทธิ์ลดกรด (Antacid) ช่วยบรรเทาอาการ ท้องอืด ท้องเฟ้อ และใช้ร่วมกับยาอื่น ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่มีการติดเชื้อ *H. pylori*

เภสัชจลนศาสตร์ : เมื่อรับประทานยา ยาจะแตกตัวเป็น บิสมัท และ ซาลิไซเลตโดยที่ซาลิไซเลตจะถูกดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหาร ซึ่งยาจะถูกทำลายที่ตับและขับออกทางไตในรูปของปัสสาวะ ส่วนบิสมัทไม่ถูกดูดซึมหรือดูดซึมน้อยมาก (<1%) ซึ่งยาจะถูกขับออกทางอุจจาระ (อาจทำให้อุจจาระมีสีเทา) และปัสสาวะ

ข้อบ่งใช้ :

- รักษาอาการท้องเสียที่ไม่รุนแรง
- ควบคุมอาการท้องเสียจากการเดินทาง
- บรรเทาอาการคลื่นไส้ เนื่องจากอาหารไม่ย่อย
- บรรเทาอาการแสบร้อนกลางอก
- บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากรับประทานอาหารมากเกินไป
- บรรเทาอาการไม่สบายท้องในผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี

ขนาดและวิธีการใช้ยา :

แบบขวด : เขย่าขวดก่อนใช้ยา

ผู้ใหญ่	รับประทานครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ (30 มล.)
เด็ก 9-12 ปี	รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ (15 มล.)
เด็ก 6-9 ปี	รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มล.)
เด็ก 3-6 ปี	รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา (5 มล.)

สามารถรับประทานซ้ำทุก 1/2 – 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ครั้งต่อวัน

แบบซอง : เขย่าซองก่อนใช้ยา

ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี : 1 ซอง

สามารถรับประทานซ้ำทุก 1/2 – 1 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ครั้งต่อวัน



ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้แอสไพริน หรือ ซาลิไซเลต, บิสมัท

คำเตือนและข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรค Reye's syndrome

ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 0.48% v/v ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

อันตรกิริยากับยาอื่น :

ยาที่ใช้ร่วม	ผลที่เกิดขึ้น
Aspirin	เพิ่มอาการพิษของ Aspirin
Tetracyclines	ลดการดูดซึมยา Tetracyclines ทำให้ประสิทธิภาพของยา Tetracyclines ลดลง

สตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร : ยานี้อยู่ในกลุ่ม Category C ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

อาการไม่พึงประสงค์ : ในผู้ป่วยบางราย ยานี้อาจทำให้อุจจาระหรือลึนมีสีเทาซึ่งไม่เป็นอันตราย และสามารถหายเองได้หลังหยุดใช้ยา ในทารกและผู้ป่วยหนักอาจมีอาการสับสน ปวดหัว การได้ยินลดลง ซึมเศร้า กล้ามเนื้อเกร็ง พูดไม่ชัด มีเสียงในหู อ่อนแรงได้

การได้รับยาเกินขนาดและวิธีรักษา : อาการที่พบถ้าใช้ยาเกินขนาด เช่น หายใจเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน สับสน ชัก การรักษาให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

ข้อควรระวัง :

1. เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
2. ไม่ควรใช้ยาเกินกว่าที่ระบุไว้บนฉลาก
3. ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้

การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่จัดจำหน่าย : ยาน้ำแขวนตะกอนสีชมพู บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 240 มล. และแบบซอง 30 มล.

วันที่ปรับปรุงเอกสาร : พฤษภาคม 2567