

## แดกทีโนไมซิน ความแรง 5 มิลลิกรัมต่อขวด

### ชนิดผงแห้งสำหรับฉีด ชื่อการค้า Dacticin for Injection 0.5 mg

#### 1. ยานี้คือยาอะไร

##### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า แดกทีโนไมซิน (dactinomycin) เป็นยาในกลุ่มเคมีบำบัด

##### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาในโรคมะเร็งบางชนิด ได้แก่ โรคมะเร็งในไต (Wilms' Tumor) โรคมะเร็งกล้ามเนื้อลายชนิด Rhabdomyosarcoma โรคมะเร็งเนื้อรก และโรคมะเร็งกระดูกชนิด Ewing's sarcoma

#### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

##### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- X ห้ามใช้ขณะที่เป็นอัสกีอัสหรือรังสัด

##### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - มีประวัติโรคหลอดเลือดอุดตัน
  - กำลังตั้งท้อง หรือวางแผนที่จะตั้งท้อง
  - หญิงให้นมลูก
  - มีการใช้ยาอื่นร่วมด้วย
  - หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน
  - หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้สูงอายุ
  - แจ้งแพทย์หากเคยได้รับรังสีบำบัด

#### 3. วิธีใช้ยา

##### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับคุณ โดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

##### 3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านลืมนัด ให้ติดต่อแพทย์โดยด่วน

##### 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปากอักเสบ แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ความผิดปกติทางผิวหนัง รวมทั้งโรคไข่ออกผื่น ผิวหนังลอกเป็นสะเก็ดและผิวหนังหลุดลอก ให้แจ้งแพทย์ หรือนำส่งโรงพยาบาลทันที

#### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการขับรถ การทำงานกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงจากการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้า

#### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

##### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีฝ้าตามผิวหนัง
- หนาวสั่น เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ท้องเสีย
- ปวดบวม แดง ร้อน บริเวณที่แทงเข็ม
- เยื่อบุเมือกอักเสบ ปากอักเสบ
- แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
- ความผิดปกติทางผิวหนัง โรคไข่ออกผื่น ผิวหนังลอกเป็นสะเก็ด และผิวหนังหลุดลอก

"หากมีอาการเหล่านี้  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที"

##### 5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่

- ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความไม่สบายร่างกาย เหนื่อย เผลื่อยชา
- มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ

"ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง  
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร"

#### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยากลับบ้าน

#### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นยาผงแห้งปราศจากเชื้อบรรจุในขวดแก้วใสสีชาขนาด 2 มิลลิลิตร
- ตัวยาคัญ แดกทีโนไมซิน 0.5 มิลลิกรัมต่อขวด
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แมนนิทอล (Mannitol) ผู้ผลิต Korea United Pharm. Inc., ประเทศเกาหลีใต้ ผู้นำเข้า บริษัท ชุมิตร 1967 จำกัด ประเทศไทย ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ชุมิตร 1967 จำกัด ประเทศไทย เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**