

## ราวลูซิซูแมบ

ความแรง 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด  
ชื่อการค้า **ULTOMIRIS (อาลโทเมอร์ริส)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ราวลูซิซูแมบ (ravulizumab) มีตัวยา 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษา

- ภาวะโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตกในกระแสโลหิตในเวลากลางคืน ทำให้มีฮีโมโกลบินในบัสสาวะ (PNH)
- กลุ่มอาการเม็ดเลือดแดงแตกและพบยูเรียในกระแสโลหิตชนิดไม่ทราบสาเหตุ (aHUS)
- โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั่วร่างกายไมแอสทีเนียกรารวิส (gMG)
- โรคปลอกประสาทอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง ชนิดนิวโรมัยอีลิติสออพติกา (NMOSD)

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขกาฬหลังแอ่น
- ⊗ เป็นโรคไขกาฬหลังแอ่น

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- **ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนเริ่มใช้ยานี้**
- หญิงตั้งครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- หญิงให้นมลูกควรระมัดระวังการใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

#### 3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- รับประทานแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมมาฉีดยา

3.3 ถ้ามีอาการผิดปกติที่รุนแรงระหว่างการได้รับยา เช่น อาการเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก อาการบวมที่ใบหน้า ลิ้น หรือลำคอ รู้สึกเป็นลมหรือเป็นลม ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเองและให้ฉีดยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ไข้สูง ปวดหัว คอแข็ง คลื่นไส้ อาเจียน ชีพ สับสน ตาไวต่อแสง มีผื่นขึ้นลักษณะเป็นจำเลือดเหมือนพุงดำ ซึ่งอาจเป็นอาการแสดงของการติดเชื้อโรคไขกาฬหลังแอ่น

**“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล เช่น

- ปวดหัว ท้องเสีย คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ไข้หวัด เยื่อบุจมูกอักเสบ
- มึนงง ปวดท้อง อาเจียน อาหารไม่ย่อย ผื่น คัน ปวดข้อ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกร็ง เป็นไขหนาวสั่น รู้สึกเหนื่อยล้า

**“หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”**

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ห้ามแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายใส ไม่มีสีถึงสีเหลือง
- **ตัวยาสําคัญ** ราวลูซิซูแมบ (Ravulizumab)
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ Sodium phosphate monobasic monohydrate (โซเดียมฟอสเฟต โมโนเบสิก โมโนไฮเดรต), Sodium phosphate dibasic heptahydrate (โซเดียมฟอสเฟต ไดเบสิก เฮปตะไฮเดรต), L-arginine (แอล-อาร์จินีน), Sucrose (ซูโครส), Polysorbate (โพลีซอร์เบต), Water for injection (น้ำสำหรับยาฉีด)

**ผู้ผลิต:** Alexion Pharma International Operations Limited.

Monksland Industrial Estate,  
Monksland, Athlone, N37 DH79, Ireland

**ผู้นำเข้า:** บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

**เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ** พฤษภาคม 2567

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**