

ทรีมีลิมุแมบ
ความแรง 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด
ชื่อการค้า IMJUDO (อิมจูโด)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ทรีมีลิมุแมบ (tremelimumab) มีตัวยา 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งตับที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน เช่น เป็นโรค Crohn's disease เป็นโรคลำไส้ใหญ่บวมอักเสบ หรือเป็นโรค lupus
 - เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 - เคยได้รับหรือมีแผนที่จะรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่ใช้สเต็มเซลล์ของผู้บริจาค
 - เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณทรวงอก
 - มีปัญหาที่ส่งผลต่อระบบประสาท
 - กำลังตั้งท้องหรือมีแผนที่จะตั้งท้อง
 - กำลังให้นมลูกหรือมีแผนที่จะให้นมลูก
 - ปอดหรือการหายใจมีปัญหา
 - ตับมีปัญหา
 - กำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ

“หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวให้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเริ่มใช้ยา”

3. วิธีใช้ยา

ท่านต้องมารับการฉีดยาที่โรงพยาบาล

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลึ้มมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้รีบติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรโดยเร็วที่สุดเพื่อทำนัดมาฉีดยาใหม่

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีพร้อมนำยาและเอกสารนี้ไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้ฉีดยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้หญิงที่กำลังใช้ยานี้ไม่แนะนำให้ให้นมลูก
- ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการตั้งท้องในระหว่างใช้ยานี้
- ระวังการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจุดตามผื่นหรือเลือดออกผิดปกติ
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจสั้น ข้อเท้าบวม
- สับสน ง่วงนอน มีปัญหาด้านความจำ อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง คอเคล็ด มีปัญหาด้านการทรงตัว รู้สึกเจ็บหรือขาที่แขนหรือขา
- มองเห็นภาพซ้อนหรือเบลอ ตาไวต่อแสง ปวดตา ค่าสายตาเปลี่ยนไป
- ปวดกล้ามเนื้ออย่างตื้อเนื่องหรือรุนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อเป็นตะคริว
- เกิดจ้ำเลือด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เกิดผื่น มีอาการคันที่ผิวหนัง ท้องเสีย
- ปวดท้อง ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน
- รู้สึกเหนื่อย อ่อนแรง มีไข้ ไอ ไม่อยากอาหาร ผมร่วง ขาบวม

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ในที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง เก็บยาในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
- หลังจากผสมยาแล้ว หากไม่ใช้ทันที ยาสามารถเก็บในตู้เย็นได้ไม่เกิน 28 วัน และเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามเขย่าขวดยา
- ห้ามใช้ยาหากพบว่ายาขุ่น สีเปลี่ยนไป หรือมีฝุ่นผง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** สารละลายใสถึงขุ่นเล็กน้อย ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน ปราศจากอนุภาคที่มองเห็นได้
- **ตัวยาสําคัญ** ทรีมีลิมุแมบ 100 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ L-histidine (แอลฮิสทีดิน) L-histidine hydrochloride monohydrate (แอลฮิสทีดินไฮโดรคลอไรด์โมโนไฮเดรต) α,α-trehalose dihydrate (อัลฟา,อัลฟาทรีฮาโลสไดไฮเดรต) Disodium edetate dihydrate (ไดโซเดียมเอดิเตตไดไฮเดรต) Polysorbate 80 (โพลีซอร์เบท 80) Water for injection (น้ำสำหรับยาฉีด)

ผู้ผลิต: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Mooswiesen 2, 88214 Ravensburg, Germany

ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย)

จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ ออย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือน:
ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น