

โอลาพาริบ
ความแรง 100, 150 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า LYNPARZA (ลินพาร์ซา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โอลาพาริบ (olaparib) มีตัวยา 100 และ 150 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคมะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เมื่อมีอาการ
 - มีอาการหายใจไม่อิ่ม หายใจลำบาก ไอ หรือหายใจมีเสียงหวีด ซึ่งอาจเป็นอาการของปอดอักเสบ
 - มีภาวะเลือดจาง ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือเม็ดเลือดขาวต่ำ มีไข้หรือติดเชื้อ มีจำเลือด หรือเลือดออก
 - เกิดอาการปวด บวมที่ปลายแขนปลายขา หายใจถี่ เจ็บหน้าอก หายใจเร็วกว่าปกติ หรือหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ หรืออาการเหล่านี้แยลง
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยาโอลาพาริบ มีทั้งในรูปแบบเม็ดและแคปซูล ขนาดยาในการรักษาของยาเม็ดกับยาแคปซูลไม่เหมือนกัน

3.2 หากลืมนินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยามื้อถัดไปตามปกติ ห้ามกินยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทราบหากท่านมีกำหนดการฉีดวัคซีน หรือใช้ยาที่กดภูมิคุ้มกัน
- ผู้หญิงให้คุมกำเนิดในระหว่างที่กินยานี้ และ 6 เดือนหลังกินยามื้อสุดท้าย
- ผู้ชายให้คุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยในระหว่างที่กินยานี้และ 3 เดือนหลังจากกินยามื้อสุดท้าย
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด
 - ไข้สูง หายใจสั้น หายใจลำบาก รู้สึกเหนื่อยล้า ผิวน้ำหรือหัวใจเต้นเร็ว
 - จำเลือด หรือเลือดออกเป็นระยะเวลาานกว่าปกติ
 - เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำซึ่งมักจะเกิดที่ขา ทำให้เกิดอาการปวด บวมที่ขา หรือเกิดลิ่มเลือดในปอด ทำให้เกิดอาการหายใจถี่ เจ็บหน้าอก หายใจเร็วกว่าปกติ หรือหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดกล้ามเนื้อ ไม่อยากอาหาร อาหารไม่ย่อย
 - คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา

- เก็บยาในที่แห้ง อยาให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่ อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยานี้ เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปยาวรี นูนทั้งสองด้าน
- ยาเม็ดความแรง 100 มิลลิกรัม มีสีเหลืองถึงสีเหลืองเข้ม ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "OP 100" อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - ยาเม็ดความแรง 150 มิลลิกรัม มีสีเขียวถึงสีเขียวเทา ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "OP 150" อีกด้านหนึ่งเรียบ
 - มีตัวยาสำคัญ คือ โอลาพาริบ (olaparib) 100 และ 150 มิลลิกรัม
 - ส่วนประกอบอื่นของเม็ดยา ได้แก่ โคโพรโอดิน ซิลิกาคอลลอยด์แลนไฮดรัส แมนนิทอล โซเดียมสเตียริลฟูมาเรต
 - ส่วนประกอบอื่นของสารเคลือบเม็ดยา ได้แก่ ไฮโพรเมลโลส แมคโครกอล 400 ทีเทเนียมไดออกไซด์ ไอรอนออกไซด์เยลโลว ไอรอนออกไซด์แบล็ค (มีในยาเม็ดความแรง 150 มิลลิกรัมเท่านั้น)

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:

- ผู้ผลิต: AbbVie Ltd., Barceloneta, Puerto Rico
- ผู้บรรจุและตรวจผ่าน: AstraZeneca UK Limited, Macclesfield, United Kingdom
- ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร
- ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 4 มีนาคม 2566

คำเตือน:
ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ของ อย. <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th/>