

ออสซิเมอ์ทินิบ

ความแรง 40 และ 80 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า TAGRISO (ทากริชโซ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ออสซิเมอ์ทินิบ (osimertinib) เป็นยาในกลุ่มยารักษามะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งปอดที่แพทย์ตรวจแล้วว่าคุณมีความจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เมื่อกำลังกินสมุนไพรเซนต์จอห์นเวิร์ท

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- มีความผิดปกติของปอด หรือการหายใจ เช่น หายใจไม่อึด หายใจลำบาก ไอ
 - มีความผิดปกติของหัวใจ เช่น มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 - เคยมีความผิดปกติของตา เช่น ปวดตา ตาแดง น้ำตาไหล มากผิดปกติ การมองเห็นผิดปกติ
 - มีไข้ติดต่อกันหลายวัน ฟกช้ำหรือเลือดออกง่ายขึ้น เหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากขึ้น
 - กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์
 - กำลังให้นมลูก
- ไม่ควรกินยานี้ร่วมกับ** ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยา รักษาริวโรค ยาแก้อักเสบ ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาลดไขมัน ยาดีจ็อกซิน เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ ชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ท้องเสีย ผื่นแดงที่ผิวหนัง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ผู้ชายที่ได้รับยานี้ ต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการรักษาและต้องไปต่อไปอีก 4 เดือนหลังจากหยุดยา
- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ต้องคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาการรักษาและ 6 สัปดาห์หลังจากหยุดยา
- งดให้นมลูกระหว่างใช้ยานี้ และ 2 สัปดาห์หลังจากหยุดยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือ เลือดออกผิดปกติ
- เวียนศีรษะ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ร่วมกับมีข้อเท้าและ เท้าบวม
- หายใจลำบากจับปล้น ร่วมกับอาการไอ หรือมีไข้
- ปวดตา ตาแดง น้ำตาไหล ตาแพ้แสง การมองเห็นผิดปกติ
- มีไข้ติดต่อกันหลายวัน ฟกช้ำหรือเลือดออกง่ายขึ้น เหนื่อยล้ามากขึ้นและติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- เวียนหัว มึนหัว รู้สึกหิว
- ท้องเสีย
- เจ็บปาก ช่องปากอักเสบ

- คัน ผื่นหนังแห้ง เป็นผื่น แดงบริเวณรอบเล็บ

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ให้อุณหภูมิคงที่ ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ยาเม็ดกลม สีเหลืองอ่อน: มีตัวยาขนาด 40 มิลลิกรัม ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "AZ" และตัวเลข "40" อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ยาเม็ดรูปยาวรี สีเหลืองอ่อน: มีตัวยาขนาด 80 มิลลิกรัม ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "AZ" และตัวเลข "80" อีกด้านหนึ่งเรียบ

ส่วนประกอบอื่นในตำรับ ได้แก่ แมนนิทอล, ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, โลว์-ซัพสทิทิวท์ ไฮดรอกซีโพรพิล เซลลูโลส, โซเดียม สเตียริล ฟูมาเรท, โพลีไวนิล แอลกอฮอล์, ไทเทเนียม ไดออกไซด์ (อี 171), มาโครกอล 3350, แทลคัม, ไอออน ออกไซด์ สีเหลือง (อี 172), ไอออน ออกไซด์ สีแดง (อี 172), ไอออน ออกไซด์ สีดำ (อี 172)

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย:

ผู้ผลิต: AstraZeneca AB, Södertälje, Sweden

ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 เมษายน 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือน:

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น