

พรีกาบาลิน
ความแรง 25, 75, 150 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า
PYGABA 25 (ไพกาบา 25)
PYGABA 75 (ไพกาบา 75)
PYGABA 150 (ไพกาบา 150)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พรีกาบาลิน (pregabalin) เป็นยาในกลุ่มที่มีโครงสร้างคล้ายสารสื่อประสาทในสมอง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท โรคลมชัก โรควิดกังวลทั่วไป กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- หญิงมีครรภ์ไม่ควรใช้ยานี้เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ได้หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- หญิงให้นมบุตร
- เด็กและวัยรุ่น อายุต่ำกว่า 18 ปี
- เป็นโรคตับ โรคไต
- เป็นโรคหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ
- ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดได้
- ยานี้อาจเสริมฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ และยาคลายกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกัน
- ไม่ควรกินยานี้ร่วมกับยาออกซีโคโดนเพราะอาจทำให้เกิดความบกพร่องทางการรับรู้และการเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ
- ไม่ควรกินยานี้หากมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่ทนต่อน้ำตาลบางชนิด ชาตเอนไซม์ย่อยน้ำตาลแลคโตส หรือการดูดซึมน้ำตาลแลคโตสได้ไม่ดี
- หากท่านเคยมีประวัติใช้ยาในทางที่ผิด หรือเคยติดยาเสพติด ให้แจ้งแพทย์ก่อนกินยานี้ เพราะท่านอาจมีความเสี่ยงในการติดยาพรีกาบาลินได้

“หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์อาจให้กินยานี้วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง และควรกินยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน
- กินยานี้ก่อนอาหารหรือกินหลังอาหารก็ได้

3.2 ถ้าลืมกินยา ควรทำอะไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอะไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม มึนงง กระสับกระส่าย และกระวนกระวาย เป็นต้น ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีและนำกล่องยาดัดตัวไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- อย่าหยุดยาเอง เพราะการเลิกกินยากะทันหันอาจทำให้มีอาการชักได้ ควรค่อยๆลดขนาดยาโดยใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- ผู้ป่วยบางรายที่เป็นเบาหวาน อาจมีน้ำตาลขึ้นระหว่างใช้ยานี้ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อปรับขนาดยาเบาหวาน
- ระมัดระวังการขับชียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้มีมึนงงหรือเวียนนอนได้
- ผู้สูงอายุต้องระวังอุบัติเหตุ เพราะยานี้อาจทำให้มีมึนงงหรือเวียนนอนได้
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้
- หญิงที่สามารถมีลูกได้ต้องใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- สายตามัวชั่วคราว เห็นภาพซ้อน
- มีความคิดฆ่าตัวตาย
- เจ็บคอ มีไข้ มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- เลือดออกง่าย มีจ้ำเลือด เลือดไหลแล้วหยุดยาก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว มึนงง ง่วงนอนผิดปกติ
- เดินเซ พูดไม่ชัด หลง ๆ ลืม ๆ
- ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องผูก
- บวมตามแขนขา
- อยากอาหาร และน้ำหนักเพิ่ม

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. เก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อนเพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา**
 - **25 มิลลิกรัม:** แคปซูลเบอร์ 4 สีขาว มีตัวอักษร “MCP” และ “25” สีดำ ภายในบรรจุผงยาสีขาว บรรจุในแผงพีวีซี-อะลูมิเนียม
 - **75 มิลลิกรัม:** แคปซูลเบอร์ 4 สีแดง-ขาว มีตัวอักษร “MCP” และ “75” สีดำ ภายในบรรจุผงยาสีขาว บรรจุในแผงพีวีซี-อะลูมิเนียม
 - **150 มิลลิกรัม:** แคปซูลเบอร์ 2 สีขาว ภายในบรรจุผงยาสีขาว บรรจุในแผงพีวีซี-อะลูมิเนียม
- **ตัวยาสำคัญ** คือ พรีกาบาลิน (pregabalin)
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** แป้งข้าวโพด, แล็กโตสโมโนไฮเดรต, ทัลลัส, ซิลิกา คอลลอยด์ดอล แอนไฮดรัส, เจลาติน, ทีเทเนียมไดออกไซด์

ผู้ผลิต บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2568

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- PYGABA 25:
<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1A1052620003111C>
- PYGABA 75:
<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1A1052620003011C>
- PYGABA 150:
<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1A1052620002911C>



PYGABA 25



PYGABA 75



PYGABA 150