

**เอนาลาพริล 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
Lapril 20s (ลาพริล 20 เอส)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เอนาลาพริลมาลีเอต (enalapril maleate) เป็นยาในกลุ่มยาลดความดันโลหิตสูง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ควบคุมความดันเลือด
- รักษาโรคหัวใจล้มเหลว

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่ม ACE inhibitors
- หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 (ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
- ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องขั้นรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากมีภาวะต่อไปนี้ ได้แก่ โรคไต หรือโรคไตที่ต้องฟอกเลือด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับและโรคหลอดเลือดสมอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
- หากมีอาการอาเจียน ท้องเสียรุนแรง หรืออยู่ระหว่างการควบคุมเกลือในอาหารอย่างเคร่งครัด ควรใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงได้
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาขับปัสสาวะบางชนิด ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ ลิเทียม ยากดภูมิคุ้มกัน ยาฉีดอินซูลิน ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรด เป็นต้น
- หญิงให้นมบุตร หรือวางแผนจะให้มนบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาในเด็กตามน้ำหนักตัว หรือตามแพทย์สั่ง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าลืมเกิน 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไปและห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไอแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา:** เม็ดรูปรียาวปลายตัดนูนสีส้ม ด้านหนึ่งมีอักษร CENTRAL อีกด้านหนึ่งมีขีดกลางแบ่งครึ่ง
- ตัวยาสําคัญ:** เอนาลาพริลมาลีเอต 20 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ กรดมาลีอิก คอโรนสตาร์ช แลคโตสโมโนไฮเดรต เพรีเจลาตินไนซ์สตาร์ช เพอร์ริกออกไซด์เรด เพอร์ริกออกไซด์เยลโลแมกนีเซียมสเตียเรต

ผู้ผลิต: บริษัท ฟาร์มาสันด์ แล็บบอราตอรีส์ จำกัด ประเทศไทย

ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทคดิง จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <https://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- ห้ามใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการไอได้
- ถ้าหากมีอาการซึมลง หรือคลื่นไส้ อาเจียน ให้ปรึกษาแพทย์
- หากใช้ยานี้แล้วเกิดอาการบวมของใบหน้า ลิ้น กลองเสียง หรือหายใจลำบาก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที
- ยานี้อาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
- ยานี้อาจทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับโพแทสเซียมหรือยาขับปัสสาวะชนิดรักษาระดับโพแทสเซียม (Potassium sparing diuretics)