

มีเบนดาโซล
500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า FUGACAR® (ฟูกาการ์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาถ่ายพยาธิ มีชื่อสามัญว่า มีเบนดาโซล (mebendazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม เช่น พยาธิไส้เดือน, พยาธิเส้นด้าย, พยาธิแส้ม้า, พยาธิปากขอ และ พยาธิเข็มหมุด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้ออก แพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- หญิงตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก หรือ หญิงให้นมทารก
- เป็นโรคตับ หรือตับทำงานผิดปกติ
- เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
- อย่าใช้ยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกร แนะนำ และอย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะยากดไขกระดูกทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำและติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย และยังสามารถทำให้เกิดความผิดปกติของไตและตับได้

- อย่าใช้ร่วมกับยาด้านเชื้อแบคทีเรียชื่อ เมโทรนิดาโซล (metronidazole) เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- กินยานี้ได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร
- อาจกินยาโดยการเคี้ยว หรือกลืนทั้งเม็ด
- บดเม็ดยาก่อนให้เด็กเล็กกิน คอยดูแลในขณะที่เด็กกินยานี้ทุกครั้ง
- ไม่ใช้ยานี้เกินกว่าขนาดที่แพทย์สั่ง
- อย่ากินยานี้ในขนาดที่สูง หรือกินอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ : กินครั้งละ 1 เม็ด เพียงครั้งเดียว

3.2 หากลืมหากินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมหันทีที่นึกขึ้นได้

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด โดยอาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง หากมีอาการที่รุนแรง ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่มีข้อมูล

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก คัน ผื่นแดง ผื่นหนังหลุดลอก ผม่วง ตุ่มพองที่ผิวหนังร่วมกับเจ็บในปากและตา
- อาการไขกระดูกถูกกด เช่น ไข้ หนาว สั่น เจ็บคอ ชัก เหนื่อย หรืออ่อนเพลียผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องเสีย ปวดท้อง
- เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- เม็ดกลมแบนสีครีม มุมขอบเอียงลาด ด้านหนึ่งมีอักษร "JANSSEN" อีกด้านหนึ่งมีอักษร " Me " 500
- ตัวยาสาคัญ คือ มีเบนดาโซล
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แลคโทสโมโนไฮเดรท (lactose monohydrate) เมทิลเซลลูโลส

(methylcellulose) โขเดียมสตาร์ชไกลโคเลท (sodium starch glycolate) ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส (microcrystalline cellulose) แป้ง ข้าวโพด (maize starch) แมกนีเซียมสเตียเรท (magnesium stearate) และซิลิกาขนาด คอลลอยด์ที่ปราศจากน้ำ (colloidal anhydrous silica)

ผู้ผลิต Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

เมือง Barcarena ประเทศโปรตุเกส

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ

ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทาง อีเมล aepqjacth@its.jnj.com หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 11 มิถุนายน 2567
(CCDS version 07-Jan-2024)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
2. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผู้เป็นโรคตับ