

**ซินนาริซีน**  
**ขนาด 25 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด**  
**ชื่อการค้า STUGERON® (สติวเจอร์อน)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า สติวเจอร์อน (STUGERON) มีตัวยา ซินนาริซีน (cinnarizine) 25 มิลลิกรัม อยู่ในกลุ่มยาขยายหลอดเลือดส่วนปลาย

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาความผิดปกติด้านการทรงตัวที่เกี่ยวข้องกับหูชั้นใน รวมถึง เวียนหัว บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน ตากระตุก มีเสียงแว่วในหู

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาที่มีโครงสร้างคล้ายกัน เช่น ฟลุนาริซีน (flunarizine)

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

#### ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคตับ
- เป็นโรคพาร์กินสัน
- เด็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา

- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม อ่อนเพลีย เวียนหัว ใต้ ควรหลีกเลี่ยงการขับซิ่งรถหรือทำงานกับเครื่องจักรหากมีอาการดังกล่าว

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม

- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หมดสติ อาเจียนรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้อื่น
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบ ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ มีไข้

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงซึม รู้สึกเหนื่อย
- กล้ามเนื้อกระตุก สั่นเกร็ง
- น้ำหนักเพิ่ม
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง ปวดท้อง อาเจียน อาหารไม่ย่อย

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยาเม็ดสีขาว ลักษณะกลม โค้งนูนเล็กน้อยทั้งสองข้าง มีรอยแบ่งครึ่ง ด้านหนึ่งมีอักษร JANSSEN อีกด้านหนึ่งมีอักษร S<sub>25</sub>
- ตัวยาสำคัญ** ซินนาริซีน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Cottonseed oil hydrogenated (น้ำมันเมล็ดฝ้ายชนิดไฮโดรจีเนต), Lactose monohydrate (แลคโทสโมโนไฮเดรต), Maize starch (แป้งข้าวโพด), Polyvidone K90 (โพลีวิดอน เค90), Sucrose (ซูโครส), Talc (ทัลค)

**ผู้ผลิต** Lusomedicamenta Sociedade Técnica  
Farmacêutica, S.A. ประเทศโปรตุเกส

**ผู้นำเข้า** บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ  
ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิด  
จากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล  
aepqcjacth@its.jnj.com  
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล  
medinfosea@its.jnj.com

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ**  
CCDS version 31 May 2019 hybrid UK SmPC v. 22  
May 2020 and Editorial change

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <https://ndi.fda.moph.go.th>