

# ไอทราโคนาโซล 100 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล ชื่อการค้า Sporal® (สปอรัล)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไอทราโคนาโซล (itraconazole) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อรา

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาเชื้อราบริเวณช่องคลอด ผิวหนัง เยื่อในช่องปาก กระจุกตา เล็บ หรืออวัยวะภายใน ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเห็นสมควร

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้ หรือยากลุ่มอะโซล (azole) อื่น เช่น คีโดโคนาโซล
- ห้ามใช้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ซิมวาสแตทิน โลวาสแตทิน คริโนติน เออร์โกทามีน ซิซาไพรด์ มิตาโซแลม ไตรอะโซแลม อัลปราโซแลม แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

#### ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- โรคตับ โรคไต โรคหัวใจล้มเหลว โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด
- หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ไรแฟมพิซิน ไอโซไนอะซิด เฟนิโทอิน คาร์บามาเซพิน ฟิโนบาร์บิทอล วอร์ฟาริน ยาลดกรด คลาร์ิโทรไมซิน อีริโทรไมซิน ดิจ็อกซิน เวอราพามิล อะทอร์วาสแตทิน ยาที่ใช้สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิโมโฟไซต์แบบเรื้อรัง/มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิโมโฟไซต์ขนาดเล็ก หรือเมื่อมีการรักษามะเร็งเม็ด

เลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

“หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าว  
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเริ่มใช้ยา”

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาหลังอาหารทันที

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ผิวหนังหรือตาเหลือง อุจจาระสีซีด หรือปัสสาวะสีเข้มมาก มีอาการไวเกินต่อแสง มีอาการผิดปกติของการได้ยิน

## 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ชาบริเวณแขนหรือขา
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- ความอยากอาหารลดลง

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะเป็นเม็ดกลมในแคปซูลใสสีชมพู ฝาแคปซูลทึบแสงสีฟ้าขุ่น
- ตัวยาสาคัญ คือ ไอทราโคนาโซล
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไฮโปรมेलโลส (hypromellose), แมคโครกอล (macrogol), น้ำตาล (sugar spheres)

ผู้ผลิต Janssen Cilag SpA., Latina, ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ  
บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด  
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยากฎาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล [aepqjacth@its.jnj.com](mailto:aepqjacth@its.jnj.com)

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล [medinfosea@its.jnj.com](mailto:medinfosea@its.jnj.com)

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 06 ตุลาคม 2566  
(CPPI version 16-Feb-2023)

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <https://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**