

ข้อมูลยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

สปอรัล® (ไอทราโคนาโซล (INN: Itraconazole)) แคปซูล

สปอรัล®

แคปซูล



สปอรัลแคปซูลใช้รักษาโรคอะไร?

สปอรัลเป็นยารักษาโรคเชื้อราในบริเวณช่องคลอด ผิวหนัง ช่องปาก ดวงตา เล็บ หรืออวัยวะภายใน



กรณีใดบ้างที่ไม่ควรใช้ยาสปอรัล

ไม่ควรใช้ยาสปอรัลในกรณีต่อไปนี้

- หากคุณรู้ว่ามีความไวเกิน (แพ้) ต่อยาสปอรัลหรือส่วนประกอบในเม็ดยา
- หากคุณกำลังตั้งครรภ์ (ยกเว้นให้ใช้ได้กรณีที่แพทย์ทราบว่ากำลังตั้งครรภ์และมีดุลพินิจตัดสินใจว่าคุณมีความจำเป็นในการใช้ยาสปอรัล)
- หากคุณอยู่ในวัยที่สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณควรมีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างการ
ใช้ยาเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระหว่างได้รับยา เนื่องจากยาสปอรัลยังคงอยู่ใน
ร่างกายคุณช่วงเวลาหนึ่งแม้จะหยุดรับประทานยาแล้ว คุณจึงควรคุมกำเนิดต่อไปอีกระยะ
หนึ่งหลังจากหยุดรับประทานยาสปอรัลแคปซูล จนกว่าจะมีประจำเดือนรอบใหม่
- 如果你有อาการของโรคหัวใจล้มเหลว (ที่เรียกกันว่า Congestive heart failure หรือ
CHF) การใช้ยาสปอรัลอาจทำให้อาการดังกล่าวแย่ลง ถ้าแพทย์มีการพิจารณาแล้วว่าคุณ
มีความจำเป็นที่ต้องได้รับยาสปอรัล แม้ว่าคุณจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลว ให้มั่นใจว่าคุณ
สามารถได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันเวลาที่ถ้าคุณมีอาการหายใจหอบถี่
น้ำหนักตัวเพิ่มโดยไม่ทราบสาเหตุ ขาบวม อ่อนเพลียผิดปกติ หรือตื่นนอนกลางดึก

ห้ามใช้ยาเหล่านี้ขณะที่รับประทานยาสปอรัลชนิดแคปซูล มียาหลายชนิดที่เกิดปฏิกิริยากับยาสปอรัล
ชนิดแคปซูล ดูหัวข้อ "ข้อควรระวังพิเศษที่ควรทราบมีอะไรบ้าง?" หัวข้อย่อย "การใช้ยานี้ร่วมกับตัวยา
อื่น"

ข้อควรระวังพิเศษที่ควรทราบมีอะไรบ้าง?

- แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่าคุณกำลังรับประทานยาอะไรอยู่บ้าง เพราะการรับประทาน
ยาบางตัวร่วมกันอาจเกิดอันตรายได้
- แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีปัญหาเรื่องตับ เพราะอาจจำเป็นต้องปรับขนาดของยาสปอรัลชนิด
แคปซูลให้เหมาะสม
- ระหว่างการรักษาด้วยยาสปอรัลถ้าคุณมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดท้อง
ผิวหนังหรือตาเหลือง อุจจาระสีซีด หรือปัสสาวะสีเข้มมาก คุณควรหยุดใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล
และปรึกษาแพทย์ทันที กรณีนี้ถ้าคุณต้องรับประทานยาสปอรัลชนิดแคปซูลแพทย์อาจให้คุณตรวจ
เลือดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามการทำงานของตับ เหตุผลของการตรวจติดตามคือเพื่อให้สามารถ
วินิจฉัยแยกโรคภาวะตับผิดปกติได้อย่างทันเวลาที่ เนื่องจากภาวะตับผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้แต่ก็
พบน้อยมาก
- แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีปัญหาเรื่องหัวใจ ถ้ามีอาการหายใจลำบาก น้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ขาบวม อ่อนแรงผิดปกติ หรือตื่นกลางดึก คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที เพราะภาวะ
เหล่านี้อาจเป็นอาการหัวใจล้มเหลว

- แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต เพราะอาจจำเป็นต้องมีการปรับขนาดของยาสปอรัลชนิดแคปซูลให้เหมาะสม
- แจ้งให้แพทย์ทราบหรือรับความช่วยเหลือทันทีถ้าคุณเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง (ดูได้จากการเกิดผื่นที่ผิวหนัง คัน ลมพิษ หายใจลำบาก และ/หรือใบหน้าบวม) ขณะที่รับประทานยาสปอรัลชนิดแคปซูล
- ถ้าคุณมีอาการไวเกินต่อแสง หยุดการใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล และแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
- ถ้าคุณมีความผิดปกติที่ผิวหนังอย่างรุนแรง เช่น เกิดผื่นกระจายในบริเวณกว้างที่ผิวหนังพร้อมกับผิวลอกและมีแผลพุพองที่บริเวณปาก ตา และอวัยวะเพศ หรือเกิดผื่นเป็นตุ่มขนาดเล็กหรือแผลพุพองควรหยุดการใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล และแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
- ถ้าคุณเกิดมีอาการเจ็บเสียว ความรู้สึกสัมผัสลดลง แขนและขาอ่อนแรง หรือเกิดปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบประสาทที่แขนหรือขา หยุดการใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล และแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
- ถ้าคุณเคยมีปัญหาแพ้ยาสปอรัลหรือยาต้านเชื้อราตัวอื่นมาก่อน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
- ถ้าคุณเป็นโรค cystic fibrosis ก่อนเริ่มใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
- แจ้งให้แพทย์ทราบถ้าคุณมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับขนาดของยาสปอรัลชนิดแคปซูลให้เหมาะสม
- กรณีคุณมีอาการผิดปกติของการได้ยินควรหยุดยาสปอรัลชนิดแคปซูลและแจ้งให้แพทย์ทราบทันที เคยมีรายงานพบการสูญเสียการได้ยินชั่วคราวหรือถาวรในผู้ป่วยที่ได้รับยาสปอรัลซึ่งพบได้น้อยมาก
- ถ้าคุณมีอาการมองเห็นไม่ชัดเจน หรือเห็นภาพซ้อน ได้ยินเสียงในหู สูญเสียความสามารถในการกลืนบัสสวาระหรือมีบัสสวาระมากกว่าปกติ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
- คุณไม่ควรใช้ยานี้ถ้าคุณมีปัญหาทางพันธุกรรมในการย่อย ฟรุคโตส การดูดซึม กลูโคส กาแลคโตส หรือการขาดเอนไซม์ ซูเครส-ไอโซมอลเตส



สตรีมีครรภ์

ห้ามใช้สปอรัลหากคุณกำลังตั้งครรภ์

ถ้าคุณอยู่ในวัยที่สามารถตั้งครรภ์ได้คุณควรมีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างการใช้อย่า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ตั้งครรภ์ระหว่างได้รับยา และเนื่องจากยาสปอรัลยังคงอยู่ในร่างกายคุณช่วงเวลาหนึ่งแม้จะหยุดรับประทานยาแล้ว หลังจากหยุดรับประทานยาสปอรัล คุณจึงควรคุมกำเนิดต่อไปอีกระยะจนกว่าจะมีประจำเดือนรอบใหม่



หญิงที่ให้นมบุตร

หากคุณอยู่ในช่วงที่เลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมตนเองควรให้แพทย์ทราบก่อนที่จะใช้ยาสปอรัล เนื่องจากยาสปอรัลถูกขับออกทางน้ำนมได้ในปริมาณเล็กน้อย



ยาตัวอื่น ๆ

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบว่าคุณกำลังใช้ยาตัวอื่นอะไรอยู่บ้าง เพราะยาบางชนิดไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ในกรณีที่ต้องใช้ร่วมกันอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น การปรับขนาดยา)

ยาที่ห้ามใช้ร่วมกันในขณะที่คุณกำลังมีการใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล:

- ยา terfenadine, astemizole และ mizolastine; สำหรับแก้แพ้;

- ยา bepridil, felodipine, nisoldipine, lercanidipine, ivabradine, ranolazine และ eplerenone; ใช้รักษาอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือ ความดันโลหิตสูง;
- ยา tigagrelor; ช่วยให้การแข็งตัวของเลือดช้าลง;
- ยา cisapride; ใช้สำหรับแก้ปัญหาในระบบการย่อยอาหาร;
- ยา simvastatin, lomitipide, lovastatin; ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล;
- ยา midazolam (ชนิดรับประทาน) และ triazolam; ยานอนหลับ;
- ยา lurasidone, pimozide, sertindole; ใช้สำหรับรักษาโรคจิต;
- ยา levacetylmethadol (levomethadyl), methadone; สำหรับรักษาอาการปวดรุนแรง หรือนำบำบัดอาการติดยา;
- ยา halofantrine; ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย;
- ยา irinotecan, mobocertinib; ยาต้านมะเร็ง;
- ยา dihydroergotamine หรือ ergotamine (เรียกว่า ergot alkaloids); ใช้ในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน;
- ยา ergometrine (ergonovine) หรือ methylergometrine (methylergonovine) (เรียกว่า ergot alkaloids); ใช้ในการห้ามเลือดและทำให้มดลูกหดตัวต่อเนื่องหลังการคลอดบุตร;
- ยา disopyramide, dronedarone, quinidine และ dofetilide; ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ;
- ยา domperidone ใช้ในการรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียน;
- ยา isavuconazole; ใช้ในการรักษาการติดเชื้อรา;
- ยา naloxegol; ใช้รักษาอาการท้องผูก เนื่องจาก การได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม opioid;
- ยา avanafil; ใช้ในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย;
- ยา dapoxetine; ใช้รักษาภาวะหลังเร็วในเพศชาย;
- ยา finerenone; ใช้รักษาโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2
- ยา voclosporin; ใช้รักษาโรคไตลูบัส

ยาที่ห้ามใช้ร่วมกันในขณะที่คุณกำลังมีการใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล ถ้าคุณมีภาวะบกพร่องในการทำงานของไตหรือตับ

- ยา colchicine; ในการรักษาโรคเกาต์;
- ยา fesoteridine หรือ solifenacin; เมื่อใช้ในรักษากระเพาะปัสสาวะทำงานไวเกิน;
- ยา telithromycin; ยาปฏิชีวนะ

ยาที่ห้ามใช้ร่วมกันในขณะที่คุณกำลังมีการใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล หากท่านทราบว่าร่างกายท่านไม่สามารถทำลายยาด้วยการทำงานของเอนไซม์ CYP2D6:

- ยา eliglustat

ยาที่ห้ามใช้ร่วมกันในขณะที่คุณกำลังมีการใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล หากท่านเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟซิติคแบบเรื้อรัง/มะเร็งต่อมน้ำเหลืองขนาดเล็ก และคุณต้องการเริ่มใช้ยานี้ หรือ กำลังปรับขนาดยา:

- ยา venetoclax

ควรหยุดใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูลเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้ยาเหล่านี้

ยาที่ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกัน เพราะสามารถลดการทำงานของยาสปอรัลชนิดแคปซูล:

- ยา carbamazepine, phenytoin, phenobarbital; ใช้สำหรับรักษาโรคลมชัก;
- ยา rifampicin, rifabutin, isoniazid; ใช้ในการรักษาวัณโรค;
- ยา efavirenz, nevirapine; ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์

คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบเสมอหากคุณรับประทานยาตามที่กล่าวมานี้อยู่เพื่อที่แพทย์จะสามารถกำหนดปริมาณการใช้ยาที่เหมาะสม

ควรหยุดใช้ยาเหล่านี้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล

ยาที่ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมด้วยนอกจากแพทย์ของท่านเห็นว่าจำเป็น:

- ยา axitinib, bosutinib, carbazitaxel, cabozantinib, ceritinib, cobimetinib, crizotinib, dabrafenib, dasatinib, docetaxel, entrectinib, glasdegib, ibrutinib, lapatanib, nilotinib, olaparib, pazopanib, regorafenib, sunitinib, talazoparib, trabectedin, trastuzumab emtansine, vinca alkaloids; ใช้สำหรับรักษาโรคมะเร็ง;
- ยา riociguat, sildenafil, tadalafil; เมื่อใช้ในการรักษาอาการความดันโลหิตในปอดสูง (เส้นเลือดในปอดมีความดันโลหิตสูง);
- ยา everolimus, rapamycin (ที่ทราบกันว่า sirolimus); ได้รับหลังจากการปลูกถ่ายอวัยวะ;
- ยา bedaquiline, rifabutin; ใช้สำหรับรักษาวัณโรค;
- ยา conivaptan, tolvaptan; ใช้ในการรักษาอาการระดับโซเดียมในเลือดต่ำ;
- ยา apixaban, edoxaban, rivaroxaban; ช่วยให้การแข็งตัวของเลือดช้าลง;
- ยา alfuzosin, sildosin; ใช้ในการรักษาต่อมลูกหมากโต;
- ยา aliskiren; ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง;
- ยา sildenafil; เมื่อใช้ในการรักษาอาการความดันโลหิตในปอดสูง (เส้นเลือดในปอดมีความดันโลหิตสูง);
- ยา carbamazepine; ใช้รักษาโรคลมชัก;
- ยา colchicines; ใช้ในการรักษาโรคเกาต์;
- ยา darifenacin; ใช้ในการรักษาอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่;
- ยา fentanyl; ยาชนิดแรงที่ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด;
- ยา vorapaxar; ใช้สำหรับรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือ ภาวะสมองขาดเลือด;
- ยา salmeterol; ใช้สำหรับช่วยในการหายใจ;
- ยา tamsulosin; ใช้ในการรักษาอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้ชาย;
- ยา vardenafil; ใช้ในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย
- เชื้อ *Saccharomyces boulardii*; ใช้ในการรักษาอาการท้องเสีย
- ยา lumacaftor/ ivacaftor; ใช้ในการรักษา Cystic Fibrosis

ควรหยุดใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูลเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้ยาเหล่านี้ นอกจากแพทย์ของคุณจะเห็นว่าจำเป็นต้องใช้

ยาที่ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมด้วยในขณะที่คุณกำลังมีการใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูล เมื่อคุณกำลังใช้ยานี้ในขนาดที่คงที่ สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์แบบเรื้อรัง/มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ขนาดเล็กหรือเมื่อมีการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์:

- ยา venetoclax

ควรหยุดใช้ยาสปอรัลชนิดแคปซูลเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มใช้ยาอื่น นอกจากแพทย์ของคุณจะเห็นว่าจำเป็นต้องใช้

ยาที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดยา (ปรับขนาดของยาสปอรัลชนิดแคปซูลหรือขนาดของยาตัวอื่น):

- ยา ciprofloxacin, clarithromycin, erythromycin, telithromycin; ยาปฏิชีวนะ;
- ยา delamanid, ใช้ในการรักษาวัณโรค
- ยา trimetrexate; ใช้ในการรักษาโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกัน
- ยา bosentan, digoxin, nadolol และยากลุ่ม calcium-channel blocker รวมถึง verapamil; ซึ่งออกฤทธิ์ต่อหัวใจหรือหลอดเลือด;
- ยา guanfacine; ใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้น
- ยา diltiazem; ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
- ยากลุ่ม coumarins (เช่น warfarin), cilostazol, dabigatran; ซึ่งทำให้เลือดแข็งตัวช้าลง;
- ยา methylprednisolone, budesonide, ciclesonide, fluticasone หรือ dexamethasone (ทั้งชนิดรับประทาน ฉีด หรือ สูดดมขึ้นกับสภาวะ เช่น การอักเสบ โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้);
- ยา cyclosporine, tacrolimus, temsirolimus; ซึ่งเป็นยาที่ให้หลังจากมีการปลูกถ่ายอวัยวะ;
- ยา cobicistat, boosted elvitegravir, tenofovir disoproxil fumarate (TDF) ยา maraviroc และกลุ่ม HIV protease inhibitors: ได้แก่ indinavir, ritonavir, boosted darunavir, ritonavir-boosted fosamprenavir, saquinavir; ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์;
- ยา dienogest, ulipristal; ใช้ในการคุมกำเนิด
- ยา boosted asunaprevir, boceprevir, daclatasvir, vaniprevir; ใช้ในการรักษาโรคตับอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดซี;
- ยา bortezomib, brentuximab vedotin, busulphan, erlotinib, gefitinib, idelalisib, imatinib, ixabepilone, nintedanib, panobinostat, pemigatinib, ponatinib, ruxolitinib, sonidegib, tretinoin (ชนิดรับประทาน), vandetanib; ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง;
- ยา buspirone, perospirone, ramelteon, midazolam IV, alprazolam และ brotizolam; สำหรับรักษาอาการวิตกกังวลหรือช่วยให้นอนหลับ (ยากลุ่มประสาท);
- ยา alfentanil, buprenorphine, oxycodone, sufentanil; ยาชนิดแรงที่ใช้บรรเทาอาการปวด;
- ยา repaglinide, saxagliptin; ใช้รักษาโรคเบาหวาน;
- ยา aripiprazole, cariprazine, haloperidol, quetiapine, risperidone; ใช้รักษาโรคจิต;
- ยา suvorexant, zopiclone; ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ;
- ยา aprepitant, netupitant; ใช้ในการรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในระหว่างรักษามะเร็ง;
- ยา loperamide; ใช้รักษาอาการท้องเสีย;
- ยา fesoterodine, imidafenacin, oxybutynin, solifenacin, tolterodine; ใช้ในภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานไวเกิน;
- ยา dutasteride; ใช้ในการรักษาต่อมลูกหมากโต;
- ยา sildenafil, tadalafil, udenafil; ใช้สำหรับรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย;
- ยา praziquantel, ใช้ในการถ่ายพยาธิใบไม้และพยาธิตัวตืด;
- ยา bilastine, ebastine, rupatadine; ใช้สำหรับแก้แพ้;
- ยา reboxetine, venlafaxine, ใช้รักษาโรคซึมเศร้า และวิตกกังวล;

- ยา atorvastatin; ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล;
- ยา meloxicam; ใช้ในการรักษาอาการอักเสบของข้อและอาการปวด;
- ยา cinacalcet; ใช้ในการรักษาโรค parathyroid ที่แสดงออกมากเกินไป;
- ยา mozavaptan; ใช้ในการรักษาอาการโซเดียมในเลือดต่ำ;
- ยา alitretinoin (รูปแบบรับประทาน); ใช้ในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบ;
- ยา cabergoline; ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน;
- ยาในกลุ่ม cannabinoids; ใช้ในการรักษาอาการคลื่นไส้ และ อาเจียน น้ำหนักลดลง สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกัน และ กล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรค Multiple Sclerosis;
- ยา valbenazine; ใช้ในการรักษาเพื่อรักษาอาการเคลื่อนไหวผิดปกติของร่างกายบางส่วน ของปาก ลิ้น ขากรรไกร และบางครั้งแขนขา ที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Tardive dyskinesia);
- ยา eletriptan, ใช้ในการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน;
- ยา telitromycin, ใช้ในการรักษาโรคปอดบวม;
- ยา ivacaftor; ใช้ในการรักษาโรค Cystic Fibrosis
- ยา galantamine ใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์
- ยา glecaprevir/pibrentasvir; ยา elbasvir/grazoprevir; ยา ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (ที่ให้รวมหรือไม่ให้รวมกับยา dasabuvir) ใช้ในการรักษาโรคตับอักเสบซี

ถ้าคุณทราบว่าร่างกายคุณมีการทำลายยาด้วยการทำงานของเอนไซม์ CYP2D6 ที่รวดเร็วมาก คุณควรทำการตรวจสอบกับแพทย์ว่าคุณสามารถใช้นี้หรือไม่ เพราะอาจมีความจำเป็นต้องปรับขนาดยา

- ยา eliglustat

หากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ รายการยาดังกล่าวไม่ใช่ว่ารายการยาทั้งหมด ดังนั้นจึงควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่ใช้

ในกระเพาะอาหารจะต้องมีสภาพความเป็นกรดมากเพียงพอเพื่อให้การดูดซึมยาสปอรัลชนิดแคปซูลในกระเพาะอาหารเป็นไปอย่างเหมาะสม ดังนั้น หากรับประทานยาลดกรดชนิดที่สะเทินกรดในกระเพาะควรรับประทานก่อนยาสปอรัลชนิดแคปซูลอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือหลังจากยาสปอรัลชนิดแคปซูลนาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ หากคุณรับประทานยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างกรดในกระเพาะอาหารคุณควรรับประทานยาสปอรัลชนิดแคปซูลร่วมกับเครื่องดื่มน้ำอัดลม (เพื่อเพิ่มกรด)

หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ



การขับขี่และการทำงานกับเครื่องกล

ในบางครั้ง สปอรัลมีผลทำให้เกิดการมึนงง มองไม่ชัด/เห็นภาพซ้อน หรือสูญเสียการได้ยิน ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานกับเครื่องกล



ควรใช้สปอรัลอย่างไรและปริมาณเท่าไร

รับประทานยาสปอรัลชนิดแคปซูลหลังอาหารทันทีเสมอเนื่องจากยาจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่า และควรรับประทานยาโดยการกลืนยาไปทั้งแคปซูลพร้อมดื่มน้ำตาม ปริมาณยาและระยะเวลาในการใช้ยาสปอรัลขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อราและตำแหน่งที่มีการติดเชื้อในร่างกาย โดยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำการใช้ยาให้คุณทราบ

ขนาดของยาที่ใช้บ่อยในโรคต่าง ๆ มีดังนี้:

ลักษณะของโรค	จำนวนแคปซูลต่อวัน	ระยะเวลาการรักษา
* การติดเชื้อราที่ช่องคลอด	2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หรือ 2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง	1 วัน หรือ 3 วัน
* การติดเชื้อราที่ผิวหนัง: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณที่สะดวกจะรับประทานยาแบบใด แพทย์จะเลือกขนาดยา และระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา ดังนี้		
	1 หรือ 2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง หรือ วันละ 2 ครั้ง	5 ถึง 15 วัน
	ถ้ามีการติดเชื้อราที่อุ้งมือหรือฝ่าเท้า คุณอาจจำเป็นต้องรับประทานยาสปอรัลนาน 30 วัน	
* การติดเชื้อราในช่องปาก	1 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง	15 วัน
* การติดเชื้อราที่ดวงตา	2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง	21 วัน
* การติดเชื้อราที่อวัยวะภายใน	1 ถึง 4 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง	ระยะเวลาที่ใช้จะนานกว่าปกติ

*การรักษาการติดเชื้อราที่เล็บ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณที่สะดวกจะรับประทานยาแบบใด แพทย์สามารถที่จะรักษาได้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการรักษาแบบรับประทานยาต่อเนื่องหรือการรักษาแบบให้ยาเป็นช่วง ๆ ดังนี้										
- การรักษาแบบรับประทานยาต่อเนื่อง		2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง		3 เดือน						
- การรักษาแบบรับประทานยาเป็นช่วง ๆ		2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง		1 สัปดาห์						
หลังจากนั้นหยุดการใช้สปอรัลเป็นเวลานาน 3 สัปดาห์ แล้วเริ่มการรักษารอบใหม่อีกครั้งโดยตารางแรกสำหรับการรักษาการติดเชื้อที่เล็บมือและตารางถัดไปสำหรับการรักษาการติดเชื้อที่เล็บเท้า (ที่มีการติดเชื้อที่เล็บมือด้วยหรือไม่ก็ตาม) (ดูที่ตารางข้างล่าง)										
บริเวณที่ติดเชื้อรา	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	สัปดาห์ที่ 5	สัปดาห์ที่ 6	สัปดาห์ที่ 7	สัปดาห์ที่ 8	สัปดาห์ที่ 9	สัปดาห์ที่ 10
กรณีติดเชื้อราที่เล็บมือ	รับประทานยา ครั้งละ 2 แคปซูล	งดการให้ยาสปอรัล			รับประทานยา ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง	หยุดยา				

	วันละ 2 ครั้ง						
กรณี เป็น เชื้อรา ที่เล็บ เท้าซึ่ง อาจมี การติดเชื้อรา ที่เล็บ มีหรือไม่มี ก็ตาม	รับประทาน ยา ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง	งดการให้ยา สปอรัล	รับประทาน ยา ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง	งดการให้ยา สปอรัล	รับประทาน ยา ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง	หยุดยา	

การติดเชื้อราที่ผิวหนัง สำหรับการติดเชื้อราที่ผิวหนังร่องรอยของโรคจะหายอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 2-3 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการรักษาด้วยยาสปอรัลชนิดแคปซูล ซึ่งร่องรอยดังกล่าวนี้เป็นสิ่งปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นโดยตัวยาได้ฆ่าเชื้อราไปหมดแล้ว แต่ร่องรอยนี้จะหายไปพร้อมกับการสร้างเซลล์ผิวหนังใหม่ที่มีปกติขึ้นมาแทนที่

การติดเชื้อราที่เล็บ ส่วนที่เล็บร่องรอยจะหายไปใช้เวลา 6 ถึง 9 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษาด้วยยาสปอรัลชนิดแคปซูลเนื่องจากตัวยาฆ่าเฉพาะเชื้อราเท่านั้น การที่เล็บจะกลับสู่สภาพเดิมหลังจากเชื้อราที่เล็บที่ติดเชื้อถูกฆ่าแล้วนั้นต้องใช้เวลาในการงอกทดแทนของเดิมซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน ดังนั้นอย่ากังวลหากพบวาระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยยาอยู่นั้นเล็บยังคงดูไม่ดีขึ้นโดยตัวยานั้นจะยังคงอยู่ในเล็บไปอีกหลายเดือนโดยยังออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา ดังนั้นคุณควรใช้และหยุดยาตามที่แพทย์แนะนำถึงแม้คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นก็ตาม

การติดเชื้อราของอวัยวะภายใน อาจต้องได้รับปริมาณยาสปอรัลชนิดแคปซูลที่สูงขึ้นและเวลาของการรักษาที่ยาวนานขึ้น

คุณจะต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเสมอซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบการรักษาตามความจำเป็น



อาการที่ไม่พึงประสงค์

เช่นเดียวกับยาอื่น ๆ สปอรัลอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้แม้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเกิดอาการ แจ้งแพทย์ให้ทราบหากคุณมีอาการต่อไปนี้ระหว่างที่ใช้ยาสปอรัล

- อาจเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง ท้องผูก หรือมีแก๊สในกระเพาะอาหารที่มากเกินไป และหายใจหอบถี่ ไอ มีน้ำในปอด เสียงเปลี่ยน ไซนัสอักเสบ จมูกอักเสบ เกิดการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน ปวดศีรษะ รอบประจำเดือนผิดปกติ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย; มึนงง สับสน สัน ง่วงนอน อ่อนล้า หนาวสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวด ปวดบริเวณข้อต่อ ปวด เจ็บหน้าอก บวม บวมทั่วไป ดับอ่อนอักเสบ ลิ้นขม มีไข้ หรืออาจเกิดผม ร่วงได้ นอกจากนี้ อาจทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น ความดันโลหิตลดลง หรือหัวใจล้มเหลวได้ การทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าอาจเกิดการลดลงของแกรนูโลไซต์ การลดลงของเม็ดเลือดขาว การลดลงของเกล็ดเลือด การลดลงของแมกนีเซียมในเลือด การลดลงของโพแทสเซียมในเลือด การเพิ่มขึ้นของโพแทสเซียมในเลือด การเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือด การเพิ่มขึ้นของครีเอตินินฟอสโฟโคเนสในเลือด การเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ตับ การเพิ่มขึ้นของบิลิรูบิน ในเลือด การเพิ่มขึ้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือด หรือการเพิ่มขึ้นของยูเรียในเลือด

- การเกิดภาวะภูมิไวเกินต่อยาสปอรัลชนิดแคปซูลอย่างรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ อาการผิดปกติเริ่มแรกที่เป็นสิ่งบ่งชี้ เช่น ผื่นบนผิวหนัง อาการคัน ผื่นลมพิษ หายใจหอบถี่ หายใจไม่สะดวก และ/หรือ ใบหน้าบวม นอกจากนี้ความรู้สึกของแขนและขาลดลง รู้สึกเจ็บเสียวบริเวณแขนและขา หรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับระบบประสาทบริเวณแขนและขาสามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนอาการที่มีรายงานการเกิดน้อยมาก ได้แก่ การแพ้แสงแดด หรือความผิดปกติทางผิวหนังอย่างรุนแรง (มีผื่นผิวหนังกระจายไปทั่วรวมทั้งมีผิวหนังลอกและมีตุ่มพองในช่องปาก ตา หรืออวัยวะเพศ หรือมีผื่นผิวหนังร่วมกับตุ่มหนองเล็ก ๆ หรือตุ่มพอง)
- คุณอาจเกิดอาการเหล่านี้หนึ่งอาการหรือมากกว่าซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลว ได้แก่ อาการหายใจหอบถี่ น้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ ขาทั้งสองข้างบวม หน้าท้องบวมอ่อนเพลียผิดปกติ และตื่นนอนกลางดึก
- อาจเกิดอาการเหล่านี้หนึ่งอาการหรือมากกว่าซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทำงานของตับผิดปกติ ได้แก่ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยง่าย ปวดท้อง ดีซ่าน (ตัวเหลือง) ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด
- การมองเห็นของท่านอาจไม่ชัดเจนหรือเห็นเป็นภาพซ้อน หรืออาจได้ยินเสียงดังในหู หรือกลิ่นปัสสาวะไม่อยู่ หรืออาจปัสสาวะมากผิดปกติ หรืออาจมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินชั่วคราวหรือถาวร

หากอาการที่ไม่พึงประสงค์มีความรุนแรงมากขึ้นหรือหากคุณเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับยานี้ โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ



การใช้ยาเกินขนาด

แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีที่คุณรับประทานยาเกินขนาด แพทย์จะมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม



ควรเก็บสปอรัลอย่างไร

เก็บยาสปอรัลในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิห้องปกติ)

การใช้ยาจะต้องใช้ยาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้บนแผงหรือกล่องยาเท่านั้น ไม่ควรใช้ยาสปอรัลภายหลังวันที่ที่พิมพ์ต่อจากคำว่า "EXP" แม้ว่าจะมีการเก็บรักษาเอาไว้อย่างดี

คืนยาที่หมดอายุให้แก่เภสัชกร



มีอะไรเป็นส่วนประกอบของยาสปอรัลชนิดแคปซูล?

ยาสปอรัลชนิดแคปซูลคือยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อรา

ตัวยาสำคัญของยาสปอรัลชนิดแคปซูล คือ ไอทราโคนาโซล

สปอรัลชนิดแคปซูลเป็นแคปซูลสีชมพู-ฟ้า

- 1 กล่องบรรจุ 1 แผงยา แต่ละแผงยารบรรจุ 4 แคปซูล
- 1 แคปซูลประกอบด้วย ตัวยาไอทราโคนาโซล 100 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ประกอบด้วย hypromellose, macrogol และ sugar spheres

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด: **06 ตุลาคม 2566 (CPPI version 16-Feb-2023)**

สิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับยาทั่วไป...

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเสมอถ้าท่านกำลังใช้ยาอื่นอยู่ เพราะยาบางชนิดไม่ควรรับประทานพร้อมกัน การใช้ยาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ท่านควร:

- ควรอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยอย่างตั้งใจเสมอ;
- ใช้ยาตรงตามวัตถุประสงค์ที่แพทย์สั่งเท่านั้น;
- ใช้ในปริมาณที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้น;
- ใช้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

เก็บยาทุกชนิดให้พ้นจากมือเด็ก

ไม่ให้ผู้อื่นมาใช้ยาที่แพทย์จ่ายให้คุณ ในท่านเองเดียวกันคุณก็ไม่ใช้ยาที่จ่ายให้ผู้อื่น

เก็บยาทุกชนิดในกล่องบรรจุโดยเฉพาะของยานั้น ๆ และเก็บยาไว้ในสถานที่ที่แห้ง (เช่น ไม่ควรเก็บในห้องน้ำ!)

คืนยาที่ไม่ได้ใช้หรือยาเก่าให้กับเภสัชกร

หากมีผู้ได้รับยาเกินขนาด ให้รีบติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาโดยทันที

เลขทะเบียนตำรับยาและวันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

ผลิตโดย	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
Janssen Cilag SpA., Latina, ประเทศอิตาลี	1C 15010/64	18 มีนาคม 2564

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยากฎาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล aepqjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล medinfosea@its.jnj.com

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ <https://ndi.fda.moph.go.th>