

ดาร์นาเวียร์ 800 มิลลิกรัม
และ โคบิซิสแทต 150 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า PREZCOBIX®
(เพรีซโคบิกซ์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ดา-รุ-นา-เวียร์ (Darunavir) และ โค-บิ-ซิส-แทต (Cobicistat)
- เป็นยาในกลุ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ร่วมกับยารักษาไมเกรน ในกลุ่มเออร์กอต

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- การทำงานของตับผิดปกติ
- การทำงานของไตผิดปกติ
- โรคเบาหวาน
- โรคเลือดไหลไม่หยุด
- แพ้ยาในกลุ่มซัลฟา
- ตั้งครรภ์ วางแผนตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
- กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาให้ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่แนะนำให้เพิ่มขนาดเป็น 2 เท่า ในมือถัดไป

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง
- กินยานี้ให้ตรงเวลา และต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อป้องกันการดื้อยา
- บอกชื่อยานี้ให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล คลินิก หรือร้านยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- มีอาการติดเชื้อ ใต้แก้ม มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานหรือออกกำลังกาย

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน
- ท้องเสีย ปวดท้อง
- ปวดหัว
- บัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเข้ม
- พบก้อนไขมันสะสมตามร่างกาย

“เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบแจ้งแพทย์
ยกเว้นถ้ามีอาการรุนแรง”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง หรือในที่ชื้น ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะเป็นเม็ดรี สีชมพู ด้านหนึ่งสลักตัวเลข “800” อีกด้านสลักตัวอักษร “TG”
- ตัวยาสาคัญ คือ ดาร์นาเวียร์ 800 มิลลิกรัม และ โคบิซิสแทต 150 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ได้แก่ คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์ (Colloidal silicon dioxide) ครอสโปวิดอน (Crosppovidone) ไฮโพรเมลโลส (Hypromellose) แมกนีเซียมสเตียเรท (Magnesium stearate) และ ซิลิซิไฟด์ไมโครคริสทอลล์เซลลูโลส (Silicified microcrystalline cellulose)

นำเข้าโดย บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28 เมษายน 2566
(USPI version Apr-2022)

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<https://ndi.fda.moph.go.th>