

เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยฉบับภาษาไทย

อินเทลเลนซ์® ยาเม็ดขนาด 200 มิลลิกรัม

ตัวยาสาคัญ: etravirine

โปรดอ่านเอกสารกำกับยานี้ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ยานี้

- เก็บเอกสารกำกับยาฉบับนี้ไว้ คุณอาจจำเป็นต้องอ่านอีกครั้ง
- ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
- ยาตัวนี้ได้ถูกส่งจ่ายสำหรับคุณเท่านั้น ห้ามนำไปให้ผู้อื่นใช้ ยาอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้แม้เขาจะมีอาการเหมือนกับคุณ
- ถ้ามีอาการข้างเคียงร้ายแรงหรือคุณสังเกตพบอาการข้างเคียงที่ไม่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้ โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบ

ภายในเอกสารกำกับยานี้ มีข้อมูลดังนี้:

1. อินเทลเลนซ์คืออะไร และใช้เพื่ออะไร
2. ก่อนที่คุณจะใช้อินเทลเลนซ์
3. รับประทานอินเทลเลนซ์อย่างไร
4. อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. เก็บรักษาอินเทลเลนซ์อย่างไร
6. ข้อมูลเพิ่มเติม

1. อินเทลเลนซ์คืออะไรและใช้เพื่ออะไร

อินเทลเลนซ์คืออะไร?

อินเทลเลนซ์ คือยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus; HIV) ยาอยู่ในกลุ่มของยาด้านไวรัสเอชไอวี (anti-HIV medicines) ที่มีชื่อว่า non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) อินเทลเลนซ์ทำงานโดยการลดจำนวนของไวรัสเอชไอวีในร่างกายของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี

อินเทลเลนซ์ใช้เพื่ออะไร?

อินเทลเลนซ์ใช้รักษาผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเป็นผู้ที่เคยใช้ยาด้านไวรัสเอชไอวีชนิดอื่นมาก่อน อินเทลเลนซ์สามารถใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดต่อยากลุ่ม NNRTIs ชนิดอื่น

อินเทลเลนซ์ต้องใช้ร่วมกับยาด้านไวรัสเอชไอวีชนิดอื่น แพทย์จะพิจารณาว่าสูตรยาใดดีที่สุดสำหรับคุณ

2. ก่อนคุณจะใช้อินเทลเลนซ์

อินเทลเลนซ์ต้องใช้ร่วมกับยาด้านไวรัสเอชไอวีชนิดอื่น ดังนั้นการอ่านเอกสารกำกับยาที่เตรียมมากับยาเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาที่ได้ถูกส่งจ่าย โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ห้ามใช้อินเทลเลนซ์ ถ้าคุณแพ้ (ภาวะภูมิไวเกิน) etravirine หรือ ส่วนประกอบอื่นๆของอินเทลเลนซ์ ส่วนประกอบอื่นๆเหล่านี้ได้ถูกระบุไว้ที่ส่วนที่ 6

ข้อควรดูแลเป็นพิเศษขณะใช้ยาอินเทลเลนซ์

Name: INTELENCE® (etravirine, tablets) 200 mg

อินเทลเลนซ์ ไม่ใช่ยาที่สามารถรักษาการติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาด ยานี้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโดยการลดจำนวนของไวรัสในเลือด ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันล่วงหน้าอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะลดโอกาสในการแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่ผู้อื่น

ผู้ที่รับประทานอินเทลเลนซ์อาจจะมีอาการติดเชื้อหรือมีโรคอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อเอชไอวี คุณต้องติดต่อกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

ไม่ใช่อินเทลเลนซ์ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะว่ายังไม่มีการศึกษาที่เพียงพอในผู้ป่วยกลุ่มนี้

อินเทลเลนซ์ ได้มีการใช้อย่างจำกัดในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป หากคุณอยู่ในกลุ่มอายุนี้ โปรดปรึกษาการใช้ยาอินเทลเลนซ์กับแพทย์

แจ้งแพทย์ถึงสถานการณ์ของคุณ

ควรมั่นใจว่าคุณได้ตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้ และแจ้งให้แพทย์ทราบถ้าคุณมีประเด็นเหล่านี้

- แจ้งให้แพทย์ทราบถ้าคุณเกิดผื่นผิวหนัง ถ้าเกิดผื่นผิวหนังขึ้นผื่นมักจะปรากฏหลังจากเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่นานและบ่อยครั้งมักจะหายไปภายในเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์ แม้ว่าจะยังคงมีการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งผื่นผิวหนังสามารถมีอาการรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ รีบติดต่อแพทย์โดยทันทีถ้าคุณเกิดผื่นผิวหนังขึ้น แพทย์จะให้คำแนะนำวิธีการจัดการกับอาการของคุณหรืออาจจำเป็นต้องหยุดอินเทลเลนซ์
- แจ้งให้แพทย์ทราบถ้าคุณมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับตับ รวมทั้งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ/หรือ ซี แพทย์อาจประเมินว่าโรคตับมีความรุนแรงเพียงใดก่อนตัดสินใจว่าคุณสามารถใช้อินเทลเลนซ์ได้หรือไม่
- แจ้งให้แพทย์ทราบถ้าคุณสังเกตเห็นรูปร่างหรือไขมันเปลี่ยนแปลง การเพิ่มขึ้น การสูญเสีย หรือการจัดกระจายตัวใหม่ของไขมันในร่างกายอาจเกิดขึ้นถ้าคุณได้รับยาต้านเอชไอวีหลายชนิดร่วมกัน
- แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีถ้าคุณสังเกตเห็นอาการของการติดเชื้อหรือการอักเสบ ในผู้ป่วยบางรายที่ติดเชื้อเอชไอวีชนิด advance อาการและอาการแสดงของการติดเชื้อหรือการอักเสบ อาจเกิดขึ้นหลังเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี เป็นที่เชื่อกันว่าอาการเหล่านี้เกิดเนื่องจากการตอบสนองที่ดีขึ้นของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

การใช้ยาดูอื่น

อินเทลเลนซ์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาดูอื่น โปรดแจ้งแพทย์ถ้าคุณกำลังใช้หรือเพิ่งใช้ยาดูอื่น รวมถึงยาที่สามารถซื้อได้เองโดยไม่มีใบสั่งแพทย์

ในกรณีส่วนใหญ่ อินเทลเลนซ์สามารถใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่อยู่ในกลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม การใช้ยาร่วมกันในบางกรณีไม่เป็นที่แนะนำ ในกรณีอื่น การเพิ่มการติดตามและ/หรือเปลี่ยนขนาดยาอาจมีความจำเป็น ดังนั้นให้แจ้งแพทย์เสมอว่ากำลังใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีตัวใดอยู่ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ว่ายาใดที่สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเคร่งครัด

ไม่แนะนำให้ใช้อินเทลเลนซ์ร่วมกับยาต่อไปนี้:

- *carbamazepine, phenobarbital, phenytoin* (ยาป้องกันอาการชัก)
- *rifampicin* และ *rifapentine* (ยารักษาการติดเชื้อบางประเภท ได้แก่ วัณโรค)
- ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย St John's wort (*Hypericum perforatum*) (ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า)
- *elbasvir/grazoprevir, simeprevir* (ยารักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี)

ถ้าคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้ โปรดสอบถามแพทย์สำหรับคำแนะนำ

INTELENCE 200 MG

CPPI based on CCDS Version 23 21-Nov-2022 Created on 19-Oct-2023

ผลของอินเทลเลนซ์หรือยาอื่นอาจได้รับผลกระทบ ถ้าคุณใช้อินเทลเลนซ์ร่วมกับยาอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ โปรดแจ้งแพทย์ถ้าคุณใช้:

- *amiodarone, bepridil, digoxin, disopyramide, flecainide, lidocaine, mexiletine, propafenone* หรือ *quinidine* (ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจบางชนิด เช่น จังหวะหัวใจเต้นผิดปกติ)
- *warfarin* (ยาที่ใช้ลดการแข็งตัวของเลือด) แพทย์จะต้องตรวจสอบเลือดของคุณ
- *itraconazole, ketoconazole* หรือ *posaconazole* (ยารักษาการติดเชื้อรา)
- *clarithromycin* (ยาปฏิชีวนะ)
- *artemether/lumefantrine* (ยารักษามาลาเรีย)
- *rifabutin* (ยารักษาการติดเชื้อบางประเภท ได้แก่ วัณโรค)
- *diazepam* (ยารักษาปัญหาการนอนหลับ และ/หรือ วิดกกังวล)
- *dexamethasone* (ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ใช้ในหลายสภาวะ ได้แก่ การอักเสบ และ ปฏิกริยาแพ้)
- *daclatasvir* (ยารักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบชนิดซี)
- *atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, rosuvastatin* หรือ *simvastatin* (ยาลดระดับคอเลสเตอรอล)
- *cyclosporine, sirolimus* หรือ *tacrolimus* (ยากดภูมิคุ้มกัน)
- *sildenafil, vardenafil* หรือ *tadalafil* (ยารักษาภาวะการแข็งตัวขององคชาติที่ผิดปกติ และ/หรือ ความดันโลหิตสูงในปอดสูง)
- *clopidogrel* (ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด)

การรับประทานอินเทลเลนซ์ร่วมกับอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรรับประทานอินเทลเลนซ์หลังอาหารทันที ถ้าคุณรับประทานอินเทลเลนซ์เมื่อท้องว่าง ปริมาณของอินเทลเลนซ์แคปซูลเดี่ยวเท่านั้นที่จะถูกดูดซึม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เรื่องประเภทของอาหารที่คุณควรรับประทานร่วมกับอินเทลเลนซ์ ให้กลืนเม็ดอินเทลเลนซ์ทั้งเม็ดพร้อมน้ำหนึ่งแก้ว ถ้าคุณไม่สามารถกลืนเม็ดอินเทลเลนซ์ได้ทั้งเม็ด คุณอาจใส่เม็ดยาในน้ำ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนที่ 3 'รับประทานอินเทลเลนซ์อย่างไร'

สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากคุณกำลังตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอินเทลเลนซ์นอกจากแพทย์จะอนุญาตเป็นกรณีเฉพาะ

แม้ที่ติดเชื้อเอชไอวีต้องไม่ให้นมบุตร เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บุตรจะติดเชื้อเอชไอวีผ่านทางน้ำนม

การขับขี่และการใช้เครื่องจักร

ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับผลของอินเทลเลนซ์ต่อความสามารถในการขับขี่หรือการใช้เครื่องจักร อย่างไรก็ตาม คุณควรคำนึงถึงอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากอินเทลเลนซ์ก่อนพิจารณาขับขี่หรือใช้งานเครื่องจักร

3. รับประทานอินเทลเลนซ์อย่างไร

ให้รับประทานอินเทลเลนซ์ตามที่แพทย์สั่งเสมอ คุณควรตรวจสอบกับแพทย์ถ้าคุณไม่แน่ใจ

คำแนะนำสำหรับการใช้ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาปกติของอินเทลเลนซ์ คือ 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ถ้าคุณกำลังรับประทานอินเทลเลนซ์ขนาด 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด:

- ในตอนเช้า รับประทานอินเทลเลนซ์ขนาด 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด จำนวน 1 เม็ด หลังอาหาร
- ในตอนเย็น รับประทานอินเทลเลนซ์ขนาด 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด จำนวน 1 เม็ด หลังอาหาร

คำแนะนำสำหรับการรับประทานอินเทลเลนซ์สำหรับผู้ป่วยทั้งหมด

Name: INTELENCE® (etravirine, tablets) 200 mg

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรรับประทานอินเทลเลนซ์หลังอาหาร ถ้าคุณรับประทานอินเทลเลนซ์เมื่อท้องว่าง ปริมาณของอินเทลเลนซ์แคปซูลเดียวเท่านั้นที่จะถูกดูดซึม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เรื่องประเภทของอาหารที่คุณควรรับประทานร่วมกับอินเทลเลนซ์

ให้กลืนเม็ดยาอินเทลเลนซ์ทั้งเม็ดพร้อมน้ำหนึ่งแก้ว ห้ามเคี้ยวเม็ดยา

- ถ้าคุณไม่สามารถกลืนเม็ดยาอินเทลเลนซ์ได้ทั้งเม็ด คุณอาจปฏิบัติดังนี้:
 - ใส่เม็ดยาในน้ำ 5 มิลลิลิตร (1 ช้อนชา) หรืออย่างน้อยมีของเหลวเพียงพอที่จะคลุมยา
 - คนให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำมีลักษณะคล้ายน้ำมัน
 - เพิ่มปริมาณน้ำ หรือน้ำส้มหรือนมที่เป็นทางเลือกอื่น ได้ตามความต้องการ (ผู้ป่วยไม่ควรใส่มะนาวหรือน้ำส้มหรือนมโดยปราศจากการเติมน้ำในครั้งแรก)
 - ดื่มโดยทันที
 - ให้กลั้วแก้วด้วยน้ำ น้ำส้ม หรือนม จำนวนหลายครั้ง และกลืนจนหมดในแต่ละครั้งที่กลั้ว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับประทานยาทั้งหมด
- ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มร้อน (อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส) หรือมีส่วนผสมของคาร์บอนเนต ในขณะที่กำลังรับประทานยาเม็ดอินเทลเลนซ์

การเปิดฝาขวดยาชนิดป้องกันเด็กเปิด (child resistant cap)



ขวดพลาสติกมาพร้อมกับฝาป้องกันเด็กเปิด (child resistant cap) และควรเปิดดังนี้:

- กดฝาเกลียวพลาสติกลงพร้อมกับหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- เปิดฝาที่คลายเกลียวออก

ถ้าคุณรับประทานอินเทลเลนซ์มากกว่าที่ควรได้รับ

รีบติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรทันที

ถ้าคุณลืมรับประทานอินเทลเลนซ์

ถ้าคุณนึกได้ภายใน **6 ชั่วโมง** ของเวลาที่ควรรับประทานปกติ คุณต้องรับประทานยาเม็ดทันที ให้รับประทานยาเม็ดหลังอาหารเสมอ ถ้าคุณนึกได้หลังจาก **6 ชั่วโมง** ให้ข้ามมื้อนั้นไปและรับประทานมื้อถัดไปตามปกติ ห้ามรับประทานยาในขนาด 2 เท่าเพื่อชดเชยส่วนที่ลืม

ห้ามหยุดรับประทานอินเทลเลนซ์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อน

การรักษาเอชไอวีอาจทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น แม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้น ห้ามหยุดรับประทานอินเทลเลนซ์หรือยาต้านเอชไอวีตัวอื่น การหยุดยาสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการดื้อยาของเชื้อไวรัสได้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

4. อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาอื่นๆ อินเทลเลนซ์สามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้แม้จะไม่เกิดกับทุกคน

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยมาก (very common) (เกิดขึ้นในผู้ที่ใช้ยามากกว่า 1 คน ใน 10 คน)

Name: INTELENCE® (etravirine, tablets) 200 mg

- ผื่นผิวหนัง ผื่นผิวหนังที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง ในบางกรณีที่พบได้น้อย ผื่นผิวหนังสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรีบติดต่อแพทย์ทันทีถ้าคุณเกิดผื่นผิวหนังขึ้น แพทย์จะให้คำแนะนำวิธีการจัดการกับอาการของคุณหรืออาจต้องหยุดอินเทลเลนซ์

อาการข้างเคียงที่พบบ่อย (common) (เกิดขึ้นในผู้ที่ใช้ยา 1 ถึง 10 คน ใน 100 คน)

- ท้องเสีย, คลื่นไส้, ปวดท้อง, อาเจียน, แสบร้อนกลางอก, มีแก๊ส, ภาวะอะกัสเอบ
- อ่อนล้า, เป็นเหน็บ หรือ ปวดในมือหรือเท้า, ชา, ปวดศีรษะ, นอนไม่หลับ, วิดกกังวล
- ภาวะไตล้มเหลว, ความดันโลหิตสูง, หัวใจล้มเหลว, โรคเบาหวาน
- รูปร่าง หรือ ไขมันเปลี่ยนแปลง
- เหงื่อออกเวลากลางคืน
- ค่าของเม็ดเลือดหรือทางเคมีบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้สามารถพบได้ในผลจากการตรวจสอบเลือด (blood tests) แพทย์จะเป็นคนอธิบายสิ่งเหล่านี้กับคุณ ตัวอย่าง: จำนวนเม็ดเลือดแดงลดลง, จำนวนเกล็ดเลือดลดลง, ระดับไขมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ, ระดับคอเลสเตอรอลสูง, ระดับน้ำตาลสูง

อาการข้างเคียงที่พบบ่อย (uncommon) (เกิดขึ้นในผู้ที่ใช้ยา 1 ถึง 10 คน ใน 1,000 คน)

- เจ็บปวดทรวงอก/มีแรงดันภายในทรวงอก, จังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ
- สูญเสียความรู้สึกของผิวหนัง, ซึม, ชัก, สูญเสียความจำ, เป็นลม, ไม่มีความจดจำ, ง่วงนอน, สั่น
- มองเห็นภาพไม่ชัด, เวียนศีรษะ
- หายใจลำบาก
- ปวดแน่นท้อง, ตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis), ท้องผูก, ปากแห้ง, อาเจียนเป็นเลือด, ชัยอน, ปากอักเสบ
- คัน, เหงื่อออกมากผิดปกติ, ผื่นผื่นแห้ง, บวมบริเวณปากและ/หรือลำคอ
- ความอยากอาหารลดลง
- เหนื่อยชา
- ปฏิกริยาแพ้ (ภาวะภูมิไวเกิน), อาการของการติดเชื้อ (ตัวอย่าง ต่อม้ำเหลืองโตและมีไข้)
- ตับมีปัญหา ได้แก่ ตับอักเสบ (hepatitis)
- เต้านมโตในเพศชาย
- การนอนหลับผิดปกติ, ผื่นผิดปกติ, สับสน, มีความงุนงงสับสน (disorientation), มีอาการทางประสาท (nervousness)
- รูปร่างเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระจายตัวใหม่ของไขมัน (fat redistribution)

ไม่ทราบความถี่ (ไม่สามารถประเมินได้จากข้อมูลที่มี)

- ปฏิกริยาภูมิไวเกินที่รุนแรง มีลักษณะ ผื่นผิวหนัง พร้อมด้วย มีไข้และการอักเสบของอวัยวะ ได้แก่ ตับอักเสบ
- ปวดกล้ามเนื้อ, กดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อเหล่านี้สามารถมีอาการรุนแรงได้

อาการข้างเคียงบางอย่างเป็นอาการข้างเคียงทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาการอักเสบจากภาวะฟื้นตัวของระบบภูมิคุ้มกัน (immune reconstitution inflammatory syndrome) ในผู้ป่วยบางรายที่มีการติดเชื้อเอชไอวีชนิด advance (โรคเอดส์) และมีประวัติติดเชื้อฉวยโอกาส มีอาการและอาการแสดงของการอักเสบจากการติดเชื้อที่ผ่านมามีเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี รวมทั้งอินเทลเลนซ์ นอกเหนือจากการติดเชื้อฉวยโอกาสแล้ว โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (สภาวะ

INTELENCE 200 MG

CPPI based on CCDS Version 23 21-Nov-2022 Created on 19-Oct-2023

Name: INTELENCE® (etravirine, tablets) 200 mg

ที่เกิดเมื่อระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อปกติของร่างกาย) อาจเกิดหลังเริ่มต้นใช้ยาสำหรับการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีเช่นกัน ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอาจเกิดหลังจากเริ่มการรักษาหลายเดือน

ถ้ามีอาการข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่งร้ายแรง หรือหากคุณสังเกตเห็นอาการข้างเคียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีระบุในเอกสารนี้ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

5. เก็บรักษาอินเทลเลนซ์อย่างไร

เก็บให้พ้นจากมือและสายตาของเด็ก

ห้ามใช้อินเทลเลนซ์ภายหลังจากวันหมดอายุที่ระบุไว้บนกล่องและบนขวดหลังจากคำว่า EXP วันหมดอายุ หมายถึงวันสุดท้ายของเดือนที่มีการระบุ

ควรเก็บอินเทลเลนซ์ชนิดเม็ดในขวดเดิม ปิดขวดให้แน่นเพื่อป้องกันจากความชื้น ขวดยาขนาด 200 มิลลิกรัม บรรจุถุงดูดความชื้น (desiccants) จำนวน 3 ถุง เพื่อให้เม็ดยาแห้ง ควรเก็บถุงดูดความชื้นไว้ในขวดตลอดเวลาและห้ามรับประทาน

ไม่ควรกำจัดยาผ่านระบบน้ำเสียหรือขยะในครัวเรือน ให้สอบถามเภสัชกรถึงวิธีในการกำจัดยาที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป วิธีการเหล่านี้จะช่วยป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

อินเทลเลนซ์ขนาด 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ดประกอบด้วยอะไร

- ตัวยาสำคัญคือ etravirine อินเทลเลนซ์ขนาด 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด แต่ละเม็ดประกอบด้วย etravirine 200 มิลลิกรัม
- สารประกอบอื่นๆ ได้แก่ hypromellose, silicified microcrystalline cellulose, microcrystalline cellulose, colloidal anhydrous silica, croscarmellose sodium และ magnesium stearate

อินเทลเลนซ์ขนาด 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด มีหน้าตาและส่วนประกอบของภาชนะบรรจุอย่างไร

ยาเม็ดรูปรียาว นูนทั้งสองด้าน สีขาวถึงสีขาวนวล ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "T200"

ในขวดพลาสติก บรรจุยาเม็ดจำนวน 60 เม็ด และถุงดูดความชื้นจำนวน 3 ถุงเพื่อให้เม็ดยาแห้ง

ผลิตโดย

Janssen Cilag S.P.A., Latina ประเทศอิตาลี

เลขทะเบียนตำรับยา

1C 75/58 (NC) - อินเทลเลนซ์® ขนาด 200 มิลลิกรัม

วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

24 กรกฎาคม 2558 - อินเทลเลนซ์® ขนาด 200 มิลลิกรัม

เอกสารกำกับยาแก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุด: 14 พฤศจิกายน 2566

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

INTELENCE 200 MG

CPPI based on CCDS Version 23 21-Nov-2022 Created on 19-Oct-2023

Name: INTELENCE® (etravirine, tablets) 200 mg

หากต้องการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา โปรดติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล
aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่ medinfosea@its.jnj.com

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ยานี้อาจเป็นพิษร้ายแรงต่อตับ

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>