

คีโทโคนาโซล
ความแรง 20 มิลลิกรัม ต่อ 1 กรัม
ชนิดครีมทาภายนอก
ชื่อการค้า Nizoral® (ไนโซรัล®)

ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คี-โท-โค-นา-โซล (ketoconazole)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาฆ่าเชื้อรา

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาการติดเชื้อรา(กลาก, เกื้อื้อน) ตามลำตัว ขาหนีบ มือ เท้า ใบหน้าและหน้าอก
- ใช้รักษาต่อมไขมันอักเสบ จากการติดเชื้อรา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- เด็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมทารก
- อายุต่ำกว่า 18 ปี
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่ โดยเฉพาะยาทาผิวหนังที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีการติดเชื้อรา และเช็ดให้แห้งก่อนทายา
- ทายาให้ทั่วบริเวณที่มีการติดเชื้อรา วันละ 1-2 ครั้ง
- ทายาต่อเนื่องอีก 2-3 วันหลังจากที่รอยการติดเชื้อราหายไปแล้ว หรือทาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
- ห้ามทายานี้บริเวณดวงตา

3.2. หากลืมทายาควรทำอย่างไร

- ให้ทายาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป
- ห้ามเพิ่มขนาดยาเพื่อชดเชยยาที่ลืม

3.3. ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น รู้สึกแสบร้อน บวมหรือแดง บริเวณที่ทายา ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- ล้างมือให้สะอาด ก่อนและหลังทายา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้ ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหลังจากใช้ยาไปแล้ว 4 สัปดาห์ ให้ไปพบแพทย์
- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรือมีอาการกลับมาเป็นซ้ำ ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

- รักษาสุขอนามัยบริเวณที่มีการติดเชื้อราให้แห้งอยู่เสมอ เพื่อผลการรักษาที่ดี

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คัน รู้สึกแสบร้อน หรือรู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่ม มีเลือดออก
- ผิวหนังแห้ง
- ผิวหนังเหนียว

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ครีมสีขาว บรรจุในหลอด
- **ตัวยาสสำคัญ** คือ คีโทโคนาโซล
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ น้ำ, โพรพิลีนไกลคอล, ซีทิลแอลกอฮอล์, สเตียริลแอลกอฮอล์, ซอร์บิแทนสเตียเรต, โพลีซอร์เบต, โซเดียมซัลไฟต์(E221), ไอโซโพรพิลไมริสเทต

ผู้ผลิต Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, ประเทศเบลเยียม

ผู้นำเข้า บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล
aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2566 (CCDS V.4 Oct 2017 hybrid with UK SmPC V.10 April 2019)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้