

เซเล็กซิแพ็ก

200, 400, 600, 800, 1000,
1200, 1400 และ 1600 ไมโครกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
UPTRAVI® (อัปทราวี®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เซ-เล็ก-ซิ-แพ็ก (Selexipag)
- เป็นยาขยายหลอดเลือดแดง ช่วยลดความดันของหลอดเลือดแดงในปอด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคความดันสูงในหลอดเลือดแดงที่ปอด

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจล้มเหลว ลิ้นหัวใจผิดปกติ
- เป็นโรคสมองขาดเลือด ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
- กำลังใช้ยาลดไขมันชื่อ เจมไฟโบรซิล

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงมีครรภ์ ให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- กำลังใช้ยาลดความดันโลหิต หรือมีอาการเวียนหัวจากภาวะความดันโลหิตต่ำ
- ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
- มีภาวะตับวายหรือไตวาย
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาโคลพิโดเกรล

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ยานี้ควรกินวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเข้า เย็น
- ห้ามแบ่งเม็ดยา บดยา หรือเคี้ยวเม็ดยานี้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเหลือเวลาน้อยกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนถึงมือต่อไป ให้รอกินยาของมือต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากลืมกินยานี้ติดต่อกันนานเกิน 3 วัน ให้ไปพบแพทย์ทันทีเพื่อปรับขนาดยาใหม่ เพราะท่านอาจได้รับอันตรายจากการกินยาต่อด้วยตนเอง

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **ห้ามหยุดยาเอง** และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์และให้นมบุตร ระหว่างใช้ยานี้
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- หายใจลำบาก หายใจมีเสียง "หวีด" ไอ
- รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลียไม่มีแรงอย่างมาก

เป็นอาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี

อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อ่อนเพลีย
- ปวดหัว
- ปวดขากรรไกร ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
- ท้องเสีย รู้สึกไม่สบายท้อง
- ใบหน้าแดง

เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดกลม มีสีและด้านหนึ่งของเม็ดยาจะมีตัวเลขพิมพ์ แตกต่างกันตามขนาดของยาดังนี้
 - อัมพราริ ขนาด 200 ไมโครกรัม เม็ดยาสีเหลืองอ่อน พิมพ์เลข "2"
 - อัมพราริ ขนาด 400 ไมโครกรัม เม็ดยาสีแดง พิมพ์เลข "4"
 - อัมพราริ ขนาด 600 ไมโครกรัม เม็ดยาสีม่วงอ่อน พิมพ์เลข "6"
 - อัมพราริ ขนาด 800 ไมโครกรัม เม็ดยาสีเขียว พิมพ์เลข "8"
 - อัมพราริ ขนาด 1000 ไมโครกรัม เม็ดยาสีส้ม พิมพ์เลข "10"
 - อัมพราริ ขนาด 1200 ไมโครกรัม เม็ดยาสีม่วงเข้ม พิมพ์เลข "12"
 - อัมพราริ ขนาด 1400 ไมโครกรัม เม็ดยาสีเหลืองเข้ม พิมพ์เลข "14"
 - อัมพราริ ขนาด 1600 ไมโครกรัม เม็ดยาสีน้ำตาล พิมพ์เลข "16"
- **ตัวยาสําคัญ**
 - เซเล็กซีแพ็ก
- **ส่วนประกอบของยา**
 1. แมนนิทอล
 2. แป้งข้าวโพด
 3. ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส
 4. แมกนีเซียมสเตียเรท
 5. ไฮโปเมลโลส
 6. โพรพิลีนไกลคอล
 7. ไซคาร์บอนา
 8. ไททาเนียมไดออกไซด์
 9. ไอร์รอนออกไซด์ สีแดง สีดำ หรือสีเหลือง

ผู้ผลิต Excella GMBH & Co. KG เมือง Feucht ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มิถุนายน 2567 (EU SmPC version MAR-2021)

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th>