

เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วยภาษาไทย

STUGERON® TABLETS

ซินนารีซีน (INN:Cinnarizine)



สติวเจอร์อนใช้ในข้อบ่งใช้ใด

สติวเจอร์อนใช้ในการรักษาอาการดังต่อไปนี้:

- ความผิดปกติด้านการทรงตัว – สติวเจอร์อนระงับอาการเวียนศีรษะและความรู้สึกหมุน ('บ้านหมุน (vertigo)') ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาของหูชั้นใน นอกจากนี้ยังสามารถบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้อง เช่น มีเสียงกริ่งในหูอย่างต่อเนื่อง ('เสียงในหู (tinnitus)') ลูกตากระตุก (Nystagmus) คลื่นไส้ และ อาเจียน

สติวเจอร์อนยังใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือได้ด้วย



เมื่อใดไม่ควรรับประทานยาสติวเจอร์อน

ห้ามใช้สติวเจอร์อนหากท่านเคยแพ้ยาดังนี้

มีข้อควรระวังเป็นพิเศษอะไรบ้าง

โรคพาร์กินสัน

หากท่านเป็นโรคพาร์กินสัน กรุณาบอกแพทย์เพื่อแพทย์จะได้ตัดสินใจว่าท่านจะรับประทานยาสติวเจอร์อนได้หรือไม่



สตรีมีครรภ์

หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือมีแผนว่าจะมีบุตร กรุณาบอกแพทย์ของท่านเพื่อแพทย์จะได้ตัดสินใจว่าท่านจะรับประทานยาสติวเจอร์อนได้หรือไม่



สตรีในระยะให้นมบุตร

ถ้าท่านกำลังรับประทานยาสติวเจอร์อนไม่ควรเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเอง เพราะปริมาณยาจำนวนน้อยมาก อาจจะออกมาในน้ำนมได้



การขับรถและความคุมเครื่องจักร

เมื่อรับประทานยาสติวเจอร์อน ท่านอาจมีอาการง่วงนอนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นการรักษา ซึ่งสามารถทำให้ท่านมีความตื่นตัวลดลงและลดความสามารถในการขับรถของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรระมัดระวังเมื่อขับรถหรือควบคุมเครื่องจักร



ยานัดอื่นและแอลกอฮอล์

ยาด้านการซึมเศร้าและยาซึ่งลดการตอบสนองของร่างกาย (ยานอนหลับ ยากล้ามเนื้อประสาท และยาระงับปวดอย่างแรง) เมื่อรับประทานร่วมกับสตีวเจอร์อนจะสามารถเสริมฤทธิ์ทำให้ง่วงซึมได้มากขึ้น

แจ้งแพทย์ของท่านหากท่านกำลังรับประทานยาอื่นอยู่

แอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์กับยาสตีวเจอร์อนทำให้ง่วงซึมได้มากขึ้น ดังนั้น ท่านควรจำกัดปริมาณในการดื่มแอลกอฮอล์ ขณะรับประทานยาสตีวเจอร์อน



ควรใช้ยาสตีวเจอร์อนอย่างไรและขนาดยาเท่าใด

สตีวเจอร์อนมีลักษณะเป็นเม็ด ท่านควรรับประทานยาหลังอาหารพร้อมน้ำจำนวนเล็กน้อย

แพทย์จะเป็นผู้บอกว่าท่านควรรับประทานยาสตีวเจอร์อนขนาดเท่าใด

- สำหรับการผิดปกติด้านการทรงตัว ขนาดยาที่แนะนำ คือ:

ยาเม็ด 25 มิลลิกรัม: 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในระยะยาวและควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

- สำหรับอาการเมาเรือ เมารถเมาเรือ ขนาดยาที่แนะนำคือ:

ผู้ใหญ่และวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป:

ยาเม็ด 25 มิลลิกรัม: 1 เม็ด

เด็ก อายุ 6 ถึง 12 ปี:

ยาเม็ด 25 มิลลิกรัม: 1/2 เม็ด

ท่านควรรับประทานยาก่อนการเดินทางอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง และสามารถรับประทานยาซ้ำได้ทุก ๆ 6 ชั่วโมงหลังจากนั้นสำหรับการเดินทางที่ใช้เวลานาน



อาการไม่พึงประสงค์

เช่นเดียวกับยาทุกตัว ยานี้สามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนก็ตาม

- รู้สึกง่วงนอน
- คลื่นไส้
- น้ำหนักเพิ่มขึ้น
- ง่วงนอนเวลากลางวัน
- อาเจียน
- ปวดท้อง
- อาหารไม่ย่อย
- เหงื่อออกมาก
- รู้สึกเหนื่อยมาก
- เคลื่อนไหวช้า กระตุก หรือ การบิด ที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ปัญหาด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือแขนขา

- เคลื่อนไหวช้า พร้อมกับมีอาการสั่น แข็งเกร็งและ เดินลากเท้า
- กล้ามเนื้อสั่น
- มีปัญหาที่ดัดที่ทำให้ผิวหนังหรือตามีสีเหลือง (ภาวะดีซ่าน)
- มีสีแดงหรือเทาเกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง
- ผื่นผิวหนังที่มีอาการคัน
- ผื่นแดงหรือผื่นผิวหนังที่เป็นสะเก็ดที่แย่งลงจากการโดนแสงแดด
- กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง



การรับประทานยาเกินขนาด

ถ้าท่านรับประทานยาสติเวเจอร์อนมากเกินไป สามารถพบอาการและอาการแสดงเหล่านี้ ได้แก่ มีความรู้สึกนึกคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีอาการง่วงซึมจนกระทั่งหมดสติ อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือทำงานไม่ประสานกัน และชัก นอกจากนี้ มีรายงานการเสียชีวิตจากการใช้ยาซิงนารีซินเกินขนาด ดังนั้น หากสงสัยว่าใช้ยาสติเวเจอร์อนเกินขนาด ท่านควรไปพบแพทย์



วิธีการเก็บรักษายาสติเวเจอร์อน

เก็บยาสติเวเจอร์อนไว้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ยานี้สามารถเก็บไว้ได้ถึงเวลาที่กำหนดเท่านั้น อย่ารับประทานยาสติเวเจอร์อนภายหลังจากวันเดือนปีที่พิมพ์ตามหลังอักษรว่า "ยาสิ้นอายุ" ถึงแม้ว่าจะได้มีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีก็ตาม

แนะนำให้คืนยาแก่กลับไปยังเภสัชกร

เก็บยาให้พ้นสายตาและมือเด็ก



มีตัวยาสำคัญอะไรในยาสติเวเจอร์อน

ตัวยาสำคัญในยาสติเวเจอร์อน คือ ซิงนารีซิน

ยาเม็ดสติเวเจอร์อนบรรจุในกล่อง 2 x 10 เม็ด และ 3 x 10 เม็ด

ยาเม็ดสติเวเจอร์อนเป็นยาเม็ดกลมสีขาวมีรอยแบ่งครึ่ง และมีอักษร JANSSEN พิมพ์ที่ด้านหนึ่ง และมีอักษร S₂₅ พิมพ์ที่อีกด้านหนึ่ง

ยาสติเวเจอร์อน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาซิงนารีซิน 25 มิลลิกรัม

นอกจากนั้น ในยาสติเวเจอร์อน 1 เม็ดยังประกอบด้วย น้ำมันเมล็ดนุ่น (cotton seed oil hydrogenated), แลคโตสโมโนไฮเดรต (lactose monohydrate), แป้งข้าวโพด (maize starch), โพลีวิดอน (polyvidone), ซูโครส (sucrose) และ ทอลค์ (talc)

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2566 (CPPI ฉบับ 31 พฤษภาคม 2562)

ผลิตโดย

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Barcarena ประเทศโปรตุเกส

เลขทะเบียนตำรับยา

1C 15105/63

วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

30 ธันวาคม 2563

ท่านควรระวังอะไรบ้างเกี่ยวกับยา

- บอกรแพทย์หรือเภสัชกรเสมอหากท่านกำลังใช้ยาอื่นอยู่ เพราะยาบางชนิดไม่ควรรับประทานพร้อมกัน
- ยาได้รับการทดสอบเป็นอย่างดีก่อนที่จะจ่ายให้กับคนไข้ได้ ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดความผิดปกติควรจะมีน้อยมากหากท่านใช้ยาอย่างถูกต้อง กล่าวคือ หากท่านใช้ยาในกรณีต่อไปนี้
 - เพื่อรักษาโรคตามจุดมุ่งหมายเท่านั้น
 - ใช้ยาในขนาดแนะนำเท่านั้น
 - ใช้ยาในระยะเวลาที่แนะนำเท่านั้น
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นจากมือเด็ก
- อย่าอนุญาตให้ผู้อื่นมาใช้ยาที่ท่านได้รับคำแนะนำให้ใช้ เช่นเดียวกับท่านอย่าใช้ยาที่จ่ายสำหรับผู้อื่น
- เก็บยาทุกชนิดในกล่องบรรจุเดิมและในสถานที่ที่แห้ง (ตัวอย่างเช่น ไม่ควรเก็บในห้องน้ำ)
- สร้างนิสัยการคืนยาที่ไม่ได้ใช้หรือยาเก่าให้กับเภสัชกร
- หากมีผู้ใดได้รับยาเกินขนาดให้รีบแจ้งแพทย์หรือหน่วยงานที่จัดการเกี่ยวกับความเป็นพิษทันที

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล
aepqjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล
medinfosea@its.jnj.com

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์

- <https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>- <https://ndi.fda.moph.go.th/>