

**ไอทราโคนาโซล
100 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า Sporal® (สปอรัล)**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไอทราโคนาโซล (itraconazole) มีตัวยา 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาเชื้อราบริเวณช่องคลอด ผิวหนัง เยื่อในช่องปาก กระงอกตา เล็บ หรืออวัยวะภายใน ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเห็นสมควร

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้ หรือยากลุ่มอะโซล (azole) อื่น เช่น คีโดโคนาโซล
- ห้ามใช้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ซิมวาสแตติน โลวาสแตติน ครินิดิน เออร์โกทามีน ซิซาไพรด์ มิดาโซแลม ไตรอะโซแลม อัลปราโซแลม แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- โรคตับ โรคไต โรคหัวใจล้มเหลว โรคเมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด
- หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการใช้ยานี้
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ไรแฟมพิซิน ไอโซไนอะซิด เฟนิโทอิน คาร์บามาเซพีน ฟิโนบาร์บิทอล วอร์ฟาริน ยาลดกรด คลาโรไทรโมซิน อีริโทรไมซิน ดิจ็อกซิน เวรอาพามิล อะทอร์วาสแตติน ยาที่ใช้สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิโมโฟไซด์แบบเรื้อรัง/มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิโมโฟไซด์ขนาดเล็ก หรือเมื่อมีการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ แต่หากท่านไม่แน่ใจว่าใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

**“หากไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าว
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเริ่มใช้ยา”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาหลังอาหารทันที

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร

- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ผิวหนังหรือตาเหลือง อุจจาระสีซีด หรือปัสสาวะสีเข้มมาก มีอาการไวเกินต่อแสง มีอาการผิดปกติของการได้ยิน
- หัวใจเต้นช้า

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ชาบริเวณแขนหรือขา
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- ความอยากอาหารลดลง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ยามีลักษณะเป็นแคปซูลใสสีชมพู ฝาแคปซูลสีฟ้า ขุน ภายในบรรจุเม็ดกลมสีขาว
- ตัวยาสัญญา คือ ไอทราโคนาโซล

- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไฮโปรมेलโลส (hypromellose), แมคโครกอล (macrogol), น้ำตาล (sugar spheres)

ผู้ผลิต Janssen Cilag SpA., Latina, ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัย
เกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: CCDS version 27
มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**