

ซินนาริซีน
ขนาด 25 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า STUGERON® (สตีวเจอร์อน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า สตีวเจอร์อน (STUGERON) มีตัวยา ซิน-นา-ริ-ซีน (cinnarizine) 25 มิลลิกรัม อยู่ในกลุ่ม ยาขยายหลอดเลือดส่วนปลาย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาความผิดปกติด้านการทรงตัวที่เกี่ยวกับหูชั้นใน รวมถึง เวียนหัว บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน ตากระตุก มีเสียงแว่วในหู
- ป้องกันอาการเมารถเมาเรือ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาที่มี โครงสร้างคล้ายกัน เช่น ฟลุนาริซีน (flunarizine)

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ตับ หรือ ไต ทำงานผิดปกติ
- เป็นโรคพาร์กินสัน
- เด็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือ หญิงให้นมทารก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับ ยานอนหลับหรือยากล่อมประสาท และไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรกินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้หลังอาหาร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หหมดสติ อาเจียนรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรค เช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาของผู้อื่น
- ไม่หยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้เกิดอาการของโรคกำเริบ ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้นบวม
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ มีไข้

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงซึม รู้สึกเหนื่อย
- กล้ามเนื้อกระตุก สั่นเกร็ง
- น้ำหนักเพิ่ม
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง ปวดท้อง อาเจียน อาหารไม่ย่อย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา** ยาเม็ดสีขาว ลักษณะกลม โค้งนูน เล็กน้อยทั้งสองข้าง มีรอยแบ่งครึ่ง ด้านหนึ่งมีอักษร JANSSEN อีกด้านหนึ่งมีอักษร S₂₅
- ตัวยาสำคัญ** ซินนาริซีน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Cottonseed oil hydrogenated (น้ำมันเมล็ดฝ้ายชนิดไฮโดรจีเนต), Lactose monohydrate (แลคโทสโมโนไฮเดรต), Maize starch (แป้งข้าวโพด), Polyvidone K90 (โพลีไวนิล คีโรน 90), Sucrose (ซูโครส), Talc (ทัลค)

ผู้ผลิต Lusomedicamenta Sociedade Técnica
Farmacêutica, S.A. ประเทศโปรตุเกส

ผู้นำเข้า บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิด
จากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
CCDS version 31 May 2019 hybrid UK SmPC v. 22
May 2020_Correction

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1022631510511C>