

กาลันตามีน
ความแรง 8 และ 16 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูลออกฤทธิ์นาน
ชื่อการค้า REMINYL® (เรมินิล®)

1. ยานี้เป็นอะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า กา-ลัน-ทา-มิน-ไฮโดร-โบร-ไมด์ (galantamine hydrobromide)
- เป็นยาในกลุ่ม ยารักษาโรคอัลไซเมอร์

1.2. ยาใช้เพื่ออะไร

- รักษาภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ในผู้ใหญ่ที่มีอาการเล็กน้อยจนถึงรุนแรงปานกลาง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- มีโรคตับหรือไตขั้นรุนแรง

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต
- มีโรคหัวใจ หรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
- มีผลในกระเพาะอาหาร
- ภาวะอาหารหรือลำไส้อุดตัน
- มีโรคเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ลมชัก หรือควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้
- มีโรคทางเดินหายใจหรือติดเชื้อ เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ปอดอักเสบ
- มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
- ให้แจ้งแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษา ที่ต้องให้ยาตามสลับว่ากำลังรับประทานยานี้
- กำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะมีลูก หรืออยู่ระหว่างเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้วันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหารเช้าและดื่มน้ำตามมากๆ
- ห้ามกินยานี้เกินวันละ 1 แคปซูล
- กลืนยาทั้งแคปซูลโดยห้ามเคี้ยวหรือบดแคปซูลยา

3.2. หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้ข้ามยาเม็ดที่ลืมไปกินยาในครั้งถัดไป
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชยยาที่ลืม
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 1 ครั้งให้ติดต่อแพทย์

3.3. ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้และอาเจียนรุนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นช้า หายใจลำบาก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังกินยา เพราะยานี้อาจจะทำให้เวียนหัว ง่วงซึมได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีน้ำตามผิวหนัง
- ผื่นแดงและตุ่มหนองขึ้นทั่วร่างกาย ร่วมกับมีไข้
- ใจสั่น ชัก

“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2. อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ความดันโลหิตสูง
- ปวดท้อง ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย
- ความอยากอาหารลดลง น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ง่วงนอน
- เห็นภาพหลอน หรือได้ยินเสียงผิดปกติ

- ชีพจรช้า มึนงง เป็นลม
 - ตัวสั่น กล้ามเนื้อหดเกร็ง มีปัญหาควบคุมการเคลื่อนไหว
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาแคปซูลบรรจุยาเม็ดเล็กๆ สีขาวจนถึงสีขาวหม่น ความแรง 8 มิลลิกรัม แคปซูลสีขาวทึบ พิมพ์ตัวอักษร “G8” ความแรง 16 มิลลิกรัม แคปซูลสีชมพูทึบ พิมพ์ตัวอักษร “G16”
- **ตัวยาสําคัญ** คือ กาลันตามีนไฮโดรโบรไมด์
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ เม็ดน้ำตาลทรงกลม ไดเอทิลทาเลต เอทิลเซลลูโลส ไฮโปรมेलโลส มาโครกอล เจลาติน ไทเทเนียมไดออกไซด์ ไอร์รอนออกไซด์สีแดง (เฉพาะความแรง 16 มิลลิกรัม)

ผู้ผลิต: Janssen-Cilag S.p.A. ลาตินา ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้า: บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล

aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
CCDS version 23 October 2020

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

8 มิลลิกรัม:

<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1062480011411C>

16 มิลลิกรัม:

<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1062480011511C>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**