

## เซเล็กซิแพ็ก

ความแรง 200, 400, 600, 800,  
1000, 1200, 1400 และ 1600

## ไมโครกรัม

## ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

ชื่อการค้า **UPTRAVI® (อัพทราวิ®)**

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เซ-เล็ก-ซิ-แพ็ก (Selexipag)
- เป็นยาขยายหลอดเลือดแดง ช่วยลดความดันของหลอดเลือดแดงในปอด

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาโรคความดันสูงในหลอดเลือดแดงที่ปอด

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจล้มเหลว ลิ้นหัวใจผิดปกติ
- เป็นโรคสมองขาดเลือด ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
- เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

- กำลังใช้ยาลดไขมันชื่อ เจมไฟโบรซิล

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

**เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**  
**หากท่านมีภาวะต่อไปนี้**

- หญิงมีครรภ์ ให้นมบุตร เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้ป่วยสูงอายุ มากกว่า 75 ปี เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
- กำลังใช้ยาลดความดันโลหิต หรือมีอาการเวียนหัวจากภาวะความดันโลหิตต่ำ
- ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

- มีภาวะตับวายหรือไตวาย
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาโคลพิโดเกรล ยาวาร์ฟาริน

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ควรกินวันละ 2 ครั้งหลังอาหารเข้า เย็น
- **ห้าม**แบ่งเม็ด หรือบดยานี้

#### 3.2 ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเหลือเวลาน้อยกว่า **6 ชั่วโมง** ก่อนถึงมือต่อไป ให้รอกินยาของมือต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- หากลืมกินยานี้ติดต่อกันนานเกิน **3 วัน** ให้ไปพบแพทย์ทันทีเพื่อปรับขนาดยาใหม่ เพราะท่านอาจได้รับอันตรายจากการกินยาต่อด้วยตนเอง

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **ห้ามหยุดยาเอง** และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์และให้นมบุตร ระหว่างใช้ยานี้

- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- หายใจลำบาก หายใจมีเสียง “หวีด” ไอ
- รู้สึกเหนื่อย อ่อนเพลียไม่มีแรงอย่างมาก

**“เป็นอาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที”**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- อ่อนเพลีย
- ปวดหัว
- ปวดขากรรไกร ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
- ท้องเสีย รู้สึกไม่สบายท้อง
- ใบหน้าแดง
- ชีตจากภาวะโลหิตจาง

**“เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที  
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที”**

### 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาเม็ดกลม มีสีและด้านหนึ่งของเม็ดยาจะมีตัวเลขพิมพ์ แตกต่างกันตามขนาดของยาดังนี้

- อัมพราริ ขนาด 200 ไมโครกรัม เม็ดยาสีเหลืองอ่อน พิมพ์เลข "2"
- อัมพราริ ขนาด 400 ไมโครกรัม เม็ดยาสีแดง พิมพ์เลข "4"
- อัมพราริ ขนาด 600 ไมโครกรัม เม็ดยาสีม่วงอ่อน พิมพ์เลข "6"
- อัมพราริ ขนาด 800 ไมโครกรัม เม็ดยาสีเขียว พิมพ์เลข "8"
- อัมพราริ ขนาด 1000 ไมโครกรัม เม็ดยาสีส้ม พิมพ์เลข "10"
- อัมพราริ ขนาด 1200 ไมโครกรัม เม็ดยาสีม่วงเข้ม พิมพ์เลข "12"
- อัมพราริ ขนาด 1400 ไมโครกรัม เม็ดยาสีเหลืองเข้ม พิมพ์เลข "14"
- อัมพราริ ขนาด 1600 ไมโครกรัม เม็ดยาสีน้ำตาล พิมพ์เลข "16"

• **ตัวยาสำคัญ** เซเล็กซีแพ็ก

• **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่

1. แมนนิทอล
2. แป้งข้าวโพด
3. ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส
4. แมกนีเซียมสเตียเรท
5. ไฮโปเมลโลส
6. โพรพิลีนไกลคอล
7. ไซคาร์บอนา
8. ไททานเนียมไดออกไซด์
9. ไอร์รอนออกไซด์ สีแดง สีดำ หรือสีเหลือง

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล [aepqcjacth@its.jnj.com](mailto:aepqcjacth@its.jnj.com)  
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล [medinfosea@its.jnj.com](mailto:medinfosea@its.jnj.com)

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ**

EU SmPC version Mar 2024 and Nov 2024

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

<https://ndi.fda.moph.go.th>

ผู้ผลิต Excella GMBH &Co.KG เมือง Feucht ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย