

## ริลพิไวรัสีน

ความแรง 600 และ 900 มิลลิกรัม  
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับฉีด  
ชื่อการค้า REKAMBYS® (เรคแคมบีส®)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ริล-พิ-ไว-รีน (rilpivirine) มีตัวยา 600 หรือ 900 มิลลิกรัม
- เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านไวรัส

#### 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1. ยานี้ห้ามใช้เมื่อไหร่

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังใช้ยาในกลุ่ม ยาต้านชัก, ยารักษาวัณโรค, ยาเดกซาเมทาโซน, หรือสมุนไพรเช่นจอร์จอนวีร์ด
- ระหว่างที่ใช้ยานี้ ห้ามใช้ยาที่ยับยั้งการหลั่งกรดในกลุ่มยับยั้งโปรตอนปั๊ม เช่น โอ-เม-ปรา-โซล (omeprazole) เอส-โอ-เม-ปรา-โซล (esomeprazole) แลน-โซ-ปรา-โซล (lansoprazole) แพน-โท-ปรา-โซล (pantoprazole) รา-บี-ปรา-โซล (rabeprazole)

#### 2.2. ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์เมื่อท่านมีภาวะต่อไปนี้

- การทำงานของตับบกพร่อง หรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบ
- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
- ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน
- ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเท่านั้น
- ท่านจะได้รับยานี้ ทุก 1 หรือ 2 เดือน โดยได้รับร่วมกับยาอีกชนิดที่มีชื่อว่า คาโบเทกราเวียร์

#### 3.2. ถ้าลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์ทันที หากท่านลืมไปฉีดยาตามนัดหมาย

#### 3.3. ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้รับยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตี้อยา
- หากท่านคาดว่าจะไม่สามารถมารับยาตามนัดหมายได้ ให้ติดต่อแพทย์ทันที

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1. อาการที่ต้องรีบแจ้งแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มผอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
  - หลังได้รับยาแล้วมีอาการปวดเกร็งท้อง เหงื่อออก ขาบริเวณปาก กระวนกระวาย รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
- “ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ยานี้อาจเป็นพิษร้ายแรงต่อตับ

### 5.2. อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว มีไข้ ผื่นคัน
- ปวด บวม แดง ร้อน คัน ขา มีก้อนแข็ง ข้ำ บริเวณที่ฉีดยา
- ซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ
- เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสีย
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไม่สบายตัว
- น้ำหนักเพิ่มขึ้น

“ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- โดยทั่วไปยานี้จะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน
- หากท่านต้องเก็บยานี้ด้วยตนเอง ให้เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส หลังจากนำยาออกจากตู้เย็นแล้วให้ใช้ภายใน 6 ชั่วโมง ถ้าไม่ได้ใช้ให้นำยาไปทิ้ง ห้ามนำกลับเข้าไปใส่ตู้เย็น
- ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับฉีด สีขาวถึงขาวออกเหลือง บรรจุในขวดแก้วขนาด 2 หรือ 3 มิลลิลิตร
- **ตัวยาสําคัญ** คือ ริลพิไวรัสีน 600 หรือ 900 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ โพลอกซาเมอร์ 338 (poloxamer 338) กรดซิตริก โมโนไฮเดรต (citric acid monohydrate) กลูโคส โมโนไฮเดรต (glucose monohydrate) โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต โมโนไฮเดรต (sodium dihydrogen phosphate monohydrate) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) และน้ำ

ผู้ผลิต Cilag AG, Schaffhausen, Switzerland  
ผู้นำเข้าบริษัท แจนเซน-ซีลลิก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล  
aepqcjacth@its.jnj.com  
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านอีเมล medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มิถุนายน 2566  
(EUSmPC V. Jun 2023)

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

<https://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<https://ndi.fda.moph.go.th>