

## **คำแนะนำในการใช้ยา**

### **อินวีกา ซัสเทนนา®**

#### **ชื่อผลิตภัณฑ์**

อินวีกา ซัสเทนนา® (พาลิเพอริโดน 25 มิลลิกรัม ในรูป พาลิเพอริโดนพาลมิเทต 39 มิลลิกรัม)

ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

อินวีกา ซัสเทนนา® (พาลิเพอริโดน 50 มิลลิกรัม ในรูป พาลิเพอริโดนพาลมิเทต 78 มิลลิกรัม)

ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

อินวีกา ซัสเทนนา® (พาลิเพอริโดน 75 มิลลิกรัม ในรูป พาลิเพอริโดนพาลมิเทต 117 มิลลิกรัม)

ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

อินวีกา ซัสเทนนา® (พาลิเพอริโดน 100 มิลลิกรัม ในรูป พาลิเพอริโดนพาลมิเทต 156 มิลลิกรัม)

ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

อินวีกา ซัสเทนนา® (พาลิเพอริโดน 150 มิลลิกรัม ในรูป พาลิเพอริโดนพาลมิเทต 234 มิลลิกรัม)

ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

#### **ชื่อสามัญทางยา (International Non-Proprietary Name)**

พาลิเพอริโดนพาลมิเทต (Paliperidone palmitate)

#### **รูปแบบของยาและความแรง**


อินวีกา ซัสเทนนาประกอบด้วย พาลิเพอริโดน 25, 50, 75, 100 หรือ 150 มิลลิกรัม (ในรูป พาลิเพอริโดนพาลมิเทต 39, 78, 117, 156 หรือ 234 มิลลิกรัม ตามลำดับ)

ชื่อทางเคมีคือ (±)-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-α]pyrimidin-9-yl hexadecanoate

ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นานสีขาวหรือสีขาวนวล บรรจุในกระบอกพร้อมฉีด

#### **คำแนะนำในการใช้ การจัดการ และการกำจัดยา**


ใน 1 ชุดประกอบด้วยหลอดฉีดยาที่บรรจุมาแล้ว 1 หลอดและเข็มฉีดยาที่ปลอดภัย 2 เข็ม (เข็มฉีดยาเบอร์ 22 ขนาด 1½ นิ้ว และเข็มฉีดยาเบอร์ 23 ขนาด 1 นิ้ว) สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ



**A-เข็มเบอร์ 22 ขนาด 1½ นิ้ว หัวเข็มสีเทา; B-เข็มเบอร์ 23 ขนาด 1 นิ้ว หัวเข็มสีน้ำเงิน; C-ไข  
รินจ์พร้อมฉีดยา; D-หัวเข็ม; E-ส่วนต่อกับเข็ม (Tip-cap)**

ยาอินวีร์กา ชัสเทนนาใช้สำหรับฉีดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


1. เขย่าหลอดฉีดยาแรงๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาที เพื่อให้มันใจว่าสารแขวนตะกอนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน




2. เลือกเข็มฉีดยาที่เหมาะสม

สำหรับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเดลดอย ถ้าผู้ป่วยน้ำหนักน้อยกว่า 200 ปอนด์ (น้อยกว่า 90 กิโลกรัม) ให้ใช้เข็มฉีดยาเบอร์ 23 ขนาด 1 นิ้ว (เข็มฉีดยาที่มีแกนสีฟ้า) ถ้าผู้ป่วยน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 200 ปอนด์ (มากกว่าหรือเท่ากับ 90 กิโลกรัม) ให้ใช้เข็มฉีดยาเบอร์ 22 ขนาด 1½ นิ้ว (เข็มฉีดยาที่มีแกนสีเทา) สำหรับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเดลดอย ให้ใช้เข็มฉีดยาเบอร์ 22 ขนาด 1½ นิ้ว (เข็มฉีดยาที่มีแกนสีเทา)


3. จับหลอดฉีดยาให้ฝ่าปิดที่ปลายชี้ขึ้น ให้ฝ่าปิดที่ปลายซึ่งเป็นยางออกโดยการบิดเบา ๆ




4. แกะช่องที่บรรจุเข็มฉีดยาออกครึ่งหนึ่ง จับเข็มฉีดยาด้วยช่องที่บรรจุเข็มฉีดยา จับหลอดฉีดยาให้ชี้ขึ้น นำเข็มฉีดยาสวมเข้ากับหลอดฉีดยาโดยใช้การบิดเบา ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฐานของหลอดฉีดยาเกิดรอยร้าวหรือความเสียหาย ตรวจสอบร่องรอยความเสียหายหรือการร้าวก่อนการบริหารยาเสมอ



5. ดึงช่องที่บรรจุเข็มฉีดยาออกจากเข็มฉีดยาโดยการดึงออกตรงๆ อย่าบิดช่องที่บรรจุเนื่องจากเข็มฉีดยาอาจหลุดออกจากหลอดฉีดยา




6. จับหลอดฉีดยาที่มีเข็มฉีดยาติดอยู่ด้วยในตำแหน่งตั้งตรงขึ้นเพื่อไล่อากาศออก ไล่อากาศออกโดยเคลื่อนก้านหลอดฉีดยาเข้าไปตามภาพอย่างระมัดระวัง




7. ฉีดยาทั้งหมดอย่างช้าและลึกเข้ากล้ามเนื้อเดลทอยด์หรือกล้ามเนื้อกลูเตียสของผู้ป่วยที่เลือกไว้ ห้ามให้ยาโดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือเข้าใต้ผิวหนัง
8. หลังจากฉีดยาเสร็จใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วอื่น (8a, 8b) หรือวางบนที่ราบ (8c) เพื่อที่จะกระตุ้นระบบป้องกันของเข็มฉีดยา ระบบป้องกันของเข็มฉีดยาจะถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่เมื่อได้ยินเสียง "คลิก" จากนั้นกำจัดหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาอย่างเหมาะสม


8a



8b



8c



## ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์

### รายการสารปรุงแต่งยา

สารที่ไม่มีฤทธิ์ในยาอินวีกา ซัสเทนนา คือ citric acid monohydrate, disodium hydrogen phosphate anhydrous, polyethylene glycol 4000, polysorbate 20, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium hydroxide, น้ำปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

## การเก็บยา

ห้ามเก็บยาในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส

เก็บยาให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก

## ผลิตโดย

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, ประเทศเบลเยียม

## เลขทะเบียนตำรับยา

1C 21/54 (N)

## วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

7 มิถุนายน 2554

## วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด

CCDS v.05 ธันวาคม 2565

## นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล  
aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล  
medinfosea@its.jnj.com

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์

<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1062540002111C>