

พาลิเพอริโดน
ความแรง 25, 50, 75, 100, 150
มิลลิกรัม
ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน
สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ชื่อการค้า INVEGA SUSTENNA®
(อินเวกา ซัสเทนนา®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า พาลิเพอริโดนพาลมิเทต (paliperidone palmitate)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาและป้องกันการเกิดอาการกลับเป็นซ้ำของโรคจิตเภท ซึ่งแพทย์พิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เคยแพ้ริสเพอริโดน เพราะริสเพอริโดนจะถูกเปลี่ยนเป็นยานี้ในร่างกาย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- อายุต่ำกว่า 18 ปี
- กำลังตั้งท้อง วางแผนที่จะตั้งท้อง หรือกำลังให้นมลูก
- ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
- มีประวัติเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือกำลังเป็นโรคหัวใจอื่น ๆ เช่น หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตาย เส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง
- ผู้ใช้ยาเองหรือคนในครอบครัวมีประวัติลิ้มเลือดอุดตัน
- มีความดันเลือดตก โดยมีอาการหน้ามืด เมื่อลุกจากการนั่งหรือนอน
- เป็นโรคพาร์กินสัน

- เป็นโรคลมชัก
- เคยมีไข้สูงร่วมกับตัวแข็งเกร็ง
- มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณแขนหรือขา
- มีปัญหาควบคุมอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้อุ่นเกินไปผิดปกติได้ โดยเฉพาะเมื่อออกกำลังกายอย่างหนักหรืออยู่ในภาวะร้อนมาก ๆ
- มีหรือเคยมีภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ำ
- มีการทำงานของไต หรือตับผิดปกติ
- มีความเสี่ยงที่จะเป็น หรือกำลังเป็นโรคเบาหวาน
- อวัยวะเพศแข็งตัวนานหรือเจ็บในผู้ชาย
- มีสอริโมนโปรแลคตินในเลือดสูงผิดปกติ หรือเป็นมะเร็งเกี่ยวกับสอริโมนโปรแลคติน
- เป็นมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง
- กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาต้านซึมเศร้า, ยารักษาโรคจิต, ยาแก้แพ้ที่ทำให้ง่วงนอน, ยานอนหลับ, ยาแก้ปวดที่เป็นอนุพันธ์ของฝิ่น, ยารักษาพาร์กินสัน, ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ยาลดความดันเลือด, ยาต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิด, ยาต้านชักคาร์บามาเซพีน รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ

“หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ยานี้เป็นยาฉีดที่ใช้ในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร โดยขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้โดยวิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน หรือ แก้มัก
- เริ่มต้นด้วยการฉีด 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์หลังจากนั้น ฉีดเดือนละ 1 ครั้ง

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทันทีที่นึกได้ เพื่อบันทึกวันนัดยาให้เร็วที่สุด

3.3 หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือ พยาบาลในทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดการรักษาเอง ให้ฉีดอย่างต่อเนื่องเพื่อผลการรักษาที่ดี
- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูงระหว่างที่ใช้ยานี้ เพราะยาอาจทำให้ความดันตัวลดลงและการมองเห็นผิดปกติได้
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ไม่ควรให้นมลูกระหว่างใช้ยานี้
- คุณกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งท้องระหว่างใช้ยานี้ หากเกิดตั้งท้องให้ปรึกษาแพทย์
- ระมัดระวังในการลุกขึ้นจากการนั่งหรือนอน เนื่องจากอาจเกิดอาการวูบได้
- แจ้งให้แพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ยาตัวนี้อยู่ หากวางแผนที่จะผ่าตัดตา
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและผลข้างเคียงจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีอาการบวม เจ็บ หรือผิวหนังแดงที่ขา

- มีภาวะสมองเสื่อมและสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงฉับพลัน หรืออ่อนแรง หรือรู้สึกชาที่ทั้งในบริเวณใบหน้า แขนหรือขา หรือพูดไม่ชัด
- มีไข้ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เหงื่อออก หรือความรู้สึกตัวลดลง
- กล้ามเนื้อตึงผิดปกติ มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของใบหน้า ดวงตา ปาก ลิ้น หรือขากรรไกร
- เดินลากเท้าแบบขำๆ มีอาการสั่นขณะพัก มีน้ำลายมากขึ้น และ/หรือ น้ำลายไหล และแสดงออกทางใบหน้าไม่ได้
- มีไข้สูงหนาวสั่น เจ็บคอ เวียนหัวรุนแรง หมดสติ
- ผู้ชายมีองคชาติแข็งตัวนาน หรือเจ็บปวดเมื่อองคชาติแข็งตัว

“ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คื่น ปวด ผิวหนังนูน หรือบวมบริเวณที่ฉีดยา
- ผู้ชาย: เต้านมโต องคชาติไม่แข็งตัว หรือมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศแบบอื่น
- ผู้หญิง: คัดเต้านม น้ำนมไหล ประจำเดือนขาด หรือ มีปัญหาอื่นเกี่ยวกับประจำเดือน
- หัวใจเต้นเร็ว
- นอนไม่หลับ หงุดหงิด กระสับกระส่าย วิตกกังวล มีอาการสั่น
- ซึมเศร้า ง่วงนอน ความตื่นตัวลดลง
- ปวดหัว ปวดหลัง ปวดกระดูกหรือกล้ามเนื้อ ปวดข้อต่อ
- รู้สึกเหมือนเป็นไข้หวัด คัดจมูก ไอ อ่อนแรง เหนื่อยล้า
- น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่บางคนอาจเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง

- ปวดท้อง อาเจียน คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ปวดฟัน

“ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. เก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ในที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- ห้ามเก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ยาน้ำแขวนตะกอน สีขาวถึงขาวนวล บรรจุในกระบอกพร้อมฉีดยา สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
- **ตัวยาสำคัญ** คือ พาลิเพอริโดนพาลมิเทด
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ กรดซิทริกโมโนไฮเดรต, ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดรัส, พอลิเอทิลีนไกลคอล 4000, พอลิซอร์เบต 20, โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต, โซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
ประเทศเบลเยียม

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ
ทางอีเมล aepqcjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

CCDS V 05 Dec 2022

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1062540002111C>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

