

## ไอ-บรู-ที-นิบ

140 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูลแข็ง

140 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Imbruvica® (อิม-บรู-วี-ก้า)

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไอ-บรู-ที-นิบ (INN: Ibrutinib)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ยารักษามะเร็งชนิดอื่นควบคู่ด้วย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์ผู้ทำการรักษา
- รักษาภาวะสเต็มเซลล์ใหม่ด้านร่างกายผู้ป่วย เรื้อรัง
- รักษาโรควอลเดนสตรอมแมโครโกลบูลินีมีย

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังใช้สมุนไพรชื่อ เซนต์จอห์นเวิร์ต รักษาโรคซึมเศร้า

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีเลือดออกผิดปกติ หรือมีประวัติเลือดออกผิดปกติ
- กำลังใช้ "ยา อาหารเสริม สมุนไพร" ตัวอื่นอยู่
- เป็นโรคหัวใจวาย หรือมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ
- ตับหรือไตทำงานผิดปกติ
- กำลังจะรักษาโดยการผ่าตัด หรือเคยผ่าตัดมาก่อน
- เป็นไวรัสตับอักเสบบี หรือเคยเป็น
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

- มีภาวะทางการแพทย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง หรือโรคเบาหวาน
- มีการติดเชื้อ

"สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร  
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- กินยารวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาเดิมของทุกวัน
- กินยาทั้งแคปซูล ห้ามเคี้ยวหรือทำให้แคปซูลแตกก่อนกิน
- กินยาทั้งเม็ด ห้ามตัด บด หรือเคี้ยว

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา แต่ยังอยู่ภายในวันที่ต้องกินยานั้น ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- หากลืมกินยาและนึกได้เมื่อข้ามวันไปแล้ว ไม่ต้องกินยาชดเชยใด ๆ เพราะยาอาจเกินขนาด แต่กรุณากินยาให้ตรงเวลาปกติต่อไป

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลทันทีหากมีอาการผิดปกติ (ดูเพิ่มเติมข้อ 5.1)

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามนำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกับท่าน
- ห้ามหยุดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดี

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา
- คุมกำเนิดหรือหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้อยานี้ และ 1 เดือนหลังกินยาครั้งสุดท้าย เพราะยาอาจส่งผลเสียต่อทารกหากตั้งครรภ์
- ห้ามให้นมบุตรระหว่างการรักษาและช่วงเวลา 1 สัปดาห์หลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย
- การขับรถ หรือ ทำงานกับเครื่องจักร เป็นสิ่งที่ท่านควรระวัง เพราะยานี้อาจทำให้หงวหรือรู้สึกเพลียได้

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเนื้อตัว ซึ่งเป็นอาการของติดเชื้อในร่างกาย
- เลือดออกผิดปกติ ได้แก่ อุจจาระมีเลือดปนหรือสีด้า ปัสสาวะเป็นสีสนิมหรือสีชมพู มีจุดข้ำจ้ำเลือดที่ผิวหนัง เลือดไหลไม่หยุด เป็นต้น
- หัวใจเต้นเร็วและผิดปกติ
- บวมที่เท้า ข้อเท้า หรือขา
- เวียนศีรษะ อ่อนแรง สับสน การพูดมีการเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะเป็นระยะเวลานานหรือปวดศีรษะรุนแรง
- อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ผิดจังหวะ
- อาการตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อึดอัดแน่นท้องมาก

## 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ครั่นเนื้อครั่นตัว รู้สึกไม่สบายตัว ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก
- ง่วงซึม มึนงง รู้สึกเพลีย เหนื่อย
- คลื่นไส้ อาเจียน
- มีจุดจ้ำเลือดขนาดเล็ก ฟกช้ำ ผิวหนังแดงกว่าปกติ ผื่นผิวหนัง
- ท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ
- มีภาวะม่านตาอักเสบ

## 6. เก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่ายาให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

### ลักษณะยา (ชนิดแคปซูล)

แคปซูลเจลาตินแข็ง สีขาว ทึบแสง พิมพ์ตัวอักษรและตัวเลขสีดำ "ibr 140mg" ภายในบรรจุผงยาสีนวลถึงสีขาว

### ลักษณะยา (ชนิดเม็ด)

**140 มิลลิกรัม:** เม็ดยากลม สีเขียวออกเหลืองถึงสีเขียว ด้านหนึ่งพิมพ์ตัวอักษร "ibr" และอีกด้านหนึ่งมีตัวเลข "140"

ตัวยาสําคัญ: ไอบรูทีนิน

ส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่ตัวยาสําคัญ:

แคปซูลอิมบรูวิก้า: croscarmellose sodium (ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม) magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต) microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส) และ sodium lauryl sulfate (โซเดียมลอริลซัลเฟต) เปลือกแคปซูล 140 มิลลิกรัม ประกอบด้วย gelatin (เจลาติน) titanium dioxide (ไทเทเนียมไดออกไซด์) และ black ink (แบล็กอิงค์) ยาเม็ดอิมบรูวิก้า: colloidal silicon dioxide (คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์) croscarmellose sodium (ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม) lactose monohydrate (แลคโทสโมโนไฮเดรต) magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตียเรต) microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส) povidone (โพลีโอดอน) และ sodium lauryl sulfate (โซเดียมลอริลซัลเฟต) สารเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วย ferrous ferric oxide (เฟอร์โรโซเฟอร์ริกออกไซด์) polyvinyl alcohol (พอลิไวนิลแอลกอฮอล์) polyethylene glycol (พอลิเอทิลีนไกลคอล) talc (ทัลค) titanium dioxide (ไทเทเนียมไดออกไซด์) และ yellow iron oxide (เยลโลว์ไอรอนออกไซด์)

ผู้ผลิต

ชนิดแคปซูลและเม็ด: Cilag AG, Schaffhausen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล aepqjacth@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: USPI version 21 OCT 2025, JP version 24 FEB 2023, CCDS version 23 OCT 2023 and EU SmPC version 25 JAN 2024

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

ชนิดแคปซูล:

<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1062600007311C>

ชนิดเม็ด:

<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1012641502711C>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**