

เดซิแทบิน
ความแรง 50 มิลลิกรัม ชนิดผง
สำหรับเตรียมเป็นสารละลายเพื่อฉีด
เพื่อการดำ DACOGEN®(ดาโคเจน®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เด-ไซ-ทา-บิน (decitabine)
- เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านมะเร็ง

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ ในผู้ใหญ่
- รักษา โรคเลือดเอมดีเอส (Myelodysplastic Syndromes) ซึ่งมีความผิดปกติของการเจริญของเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังอยู่ระหว่างให้นมลูก เพราะยังไม่ทราบว่ายานี้ผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้หรือไม่
- เด็กหรือวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่เพียงพอ

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
เมื่อท่านมีอาการต่อไปนี้

- มีเกล็ดเลือด เม็ดเลือดแดง หรือเม็ดเลือดขาวในร่างกายต่ำ
- มีการติดเชื้อ
- เป็นโรคตับ
- เป็นโรคไตขั้นรุนแรง
- เป็นโรคหัวใจ
- กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะมีลูก
- กำลังใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่ เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

ยานี้ อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้ท่าน โดยฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
- ก่อนเริ่มใช้ยาแต่ละครั้ง ท่านจะได้รับการตรวจเลือดเพื่อตรวจความพร้อมต่อการรักษา

3.2. หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ติดต่อแพทย์หรือพยาบาลทันที หากท่านลืมไปฉีดยาตามนัดหมาย

3.3 หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้เข้ารับการฉีดยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ระมัดระวังการขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหลังได้รับยา เพราะยานี้ อาจจะทำให้เหนื่อยง่ายหรืออ่อนเพลียได้
- ผู้ชาย คุณกำเริบระหว่างที่ใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้ไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ คุณกำเริบระหว่างที่ใช้ยานี้ และหลังจากหยุดยานี้ไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มิถุนายน 2568
(CCDS version 31-Mar-2021)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1062520003211C>

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อ บริษัทฯ ทางอีเมล aepqcjath@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ บริษัทฯ ทางอีเมล medinfosea@its.jnj.com

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1. อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจุดตามผิวหนัง
- มีไข้ ไอ เจ็บหน้าอก หายใจหอบ
- มีเลือดออกผิดปกติ เช่น อุจจาระเป็นสีดำคล้ำ ปัสสาวะหรืออุจจาระมีเลือดปน มีจ้ำเลือด
- การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ปวดหัวเฉียบพลันอย่างรุนแรง ชัก อาการชาหรืออ่อนแรง
- ปัสสาวะออกน้อยกว่าปกติ ร่วมกับ แขน ขา บวม น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้รีบแจ้งแพทย์ทันที”

5.2. อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์

- อ่อนเพลีย ซีด
- ปวดหัว เลือดกำเดาไหล
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- น้ำมูกไหล เจ็บในจมูกหรือไซนัส
- มีแผลในปากหรือลิ้น

“ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. เก็บยาน้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** พงยาปราศจากเชื้อสีขาวบรรจุในขวดแก้วใส
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เดโซทาบิน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ โปแทสเซียมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต (โมโนเบสิคโปแทสเซียมฟอสเฟต) และ โซเดียมไฮดรอกไซด์

ผู้ผลิต: BSP Pharmaceuticals S.p.A. ลาตินา ประเทศอิตาลี

ผู้นำเข้า: บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย