

ไอ-บ魯-ที-นิบ

140 มิลลิกรัม

ชนิดแคปซูลแข็ง

140 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า Imbruvica® (อิน-บ魯-วิ-ก้า)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไอ-บ魯-ที-นิบ (INN: Ibrutinib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
- รักษาภาวะสเด้มเซลล์ใหม่ต้านร่างกายผู้ป่วย เรื้อรัง
- รักษาโรคลูเดนสตรอมแม่โคโรกลูบูลินเมีย

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยาที่มีส่วนประกอบของยา
- กำลังใช้สมุนไพรชื่อ เชนต์จูหันเวร์ต รักษาโรคซึมเศร้า

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้นอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีเลือดออกผิดปกติ หรือมีประวัติเลือดออกผิดปกติ
- กำลังใช้ “ยา อาหารเสริม สมุนไพร” ตัวอื่นอยู่
- เป็นโรคหัวใจวาย หรือมีการเดินของหัวใจผิดปกติ
- ตับหรือไตทำงานผิดปกติ
- กำลังจะรักษาโดยการผ่าตัด หรือเคยผ่าตัดมาก่อน
- เป็นไวรัสตับอักเสบบี หรือเคยเป็น
- ตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

- มีภาวะทางการแพทย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง คอเลสเตรอลสูง หรือโรคเบาหวาน
- มีการติดเชื้อ

“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- กินยาวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาเดิมของทุกวัน
- กินยาทั้งแคปซูล ห้ามเคี้ยวหรือทำให้แคปซูลแตกก่อนกิน
- กินยาทั้งเม็ด ห้ามตัด บด หรือเคี้ยว

3.2 หากลืมกินยาควร怎么办

- หากลืมกินยา แต่ยังอยู่ภายใต้วันที่ต้องกินยานั้น ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- หากลืมกินยาและนึกได้เมื่อข้ามวันไปแล้ว ไม่ต้องกินยาชดเชยใด ๆ เพราะยาอาจเกินขนาด แต่กรุณากินยาให้ตรงเวลาปกติอีก

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควร怎么办

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลทันทีหากมีอาการผิดปกติ (ดูเพิ่มเติมข้อ 5.1)

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามน้ำยาที่ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเข่นเดียวกันท่าน
- ห้ามหยดยาหรือปรับรับขนาดยาเอง ควรกินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อผลการรักษาที่ดี

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรือผลจากการใช้ยา

- คุยกับนิตหรือลึกเลี่ยงการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้ยา แล้ว 1 เดือนหลังกินยาครั้งสุดท้าย เพราะยาอาจส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์

- ห้ามให้นมบุตรระหว่างการรักษาและช่วงเวลา 1 สัปดาห์หลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย

- การขับรถ หรือ ทำงานกับเครื่องจักร เป็นสิ่งที่ท่านควรระวัง เพราะยาที่น้ำอาจทำให้ง่วงหรือรู้สึกเพลียได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก
- ไข้สูง หนาวสั่น ปวดเนื้อตัว ซึ่งเป็นอาการของติดเชื้อในร่างกาย
- เลือดออกผิดปกติ ได้แก่ อุจจาระมีเลือดปนหรือสีดา ปัสสาวะเป็นสีสนิมหรือสีชมพู มีจุดข้าวจ้าเลือดที่ผิวหนัง เลือดไหลไม่หยุด เป็นต้น
- หัวใจเต้นเร็วและผิดปกติ
- บวมที่เท้า ข้อเท้า หรือขา
- เวียนศีรษะ อ่อนแรง สับสน การพูดมีการเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะเป็นระยะเวลานานหรือปวดศีรษะรุนแรง
- อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว ผิดจังหวะ
- อาการตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อีดอัดแน่น ห้องมาก

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ครั้นเนื้ือครั้นตัว รู้สึกไม่สบายตัว ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก

- ง่วงชึม มีนิ้ง รู้สึกเพลีย เหนื่อย
 - คลื่นไส้ อาเจียน
 - มีจุดจ้ำเลือดขนาดเล็ก ฟกช้ำ ผิวหนังแดงกว่าปกติ
ผื่นผิวหนัง
 - ห้องเสีย ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ

6. เก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา (ชนิดแคปซูล)

แคปซูลเจลาตินแข็ง สีขาว ทึบแสง พิมพ์ด้วยอักษรและตัวเลขสีดำ “ibr 140mg” ภายในบรรจุผงยาสีน้ำเงินสีขาว

ลักษณะ (ชนิดเม็ด)

140 มิลลิกรัม: เม็ดยากลม สีเขียวอโภคเหลืองถึงสีเขียว ด้านหนึ่งพิมพ์ตัวอักษร “ibr” และอีกด้านหนึ่งมีตัวเลข “140”

ตัวยาสำคัญ: ไอบรทินิบ

ส่วนประกอบอื่นที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญ :

แคปซูลอิมบอร์วิก้า: croscarmellose sodium(ครอสคาร์เมโลสโซเดียม) magnesium stearate (แมกนีเซียมสเตารีต) microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส) และ sodium lauryl sulfate (โซเดียมลอริลซัลเฟต) เปลส์อคแคปซูล 140 มิลลิกรัม ประกอบด้วย gelatin (เจลล์ติน) titanium dioxide (ไทดิเมทิลไบออกไซด์) และ black ink (แบล็คอินก์)

ยาเม็ดอิมรูริก้า: colloidal silicon dioxide
(คลอลอยด์ซิลิคั原有) croscarmellose sodium (ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม) lactose monohydrate (แลกโทโนโนนีไฮเดรต) magnesium

stearate (แมกนีเซียมสเตียรেต) microcrystalline cellulose ('ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส) povidone (โพวิdone) และ sodium lauryl sulfate (โซเดียมลอริล ชัลเฟด) สารเคลือบฟิล์ม'dแต่ละเม็ดประกอบด้วย ferrosoferric oxide (เฟอร์โรไซเฟอร์ริกออกไซด์) polyvinyl alcohol (พอลีไวนิลแอลกอฮอล์) polyethylene glycol (พอลีอีทิลีนไกลคอล) talc (ทัลก์) titanium dioxide ('ไทเทเนียมไดออกไซด์) และ yellow iron oxide (เยลโลว์ไอรอนออกไซด์)

ជំនាញ

**ชนิดแคปซูลและเม็ด: Cilag AG, Schaffhausen
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ผู้นำเข้า/ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งสัญเกิด^{จาก}การใช้ยา กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
aepqcjact@its.jnj.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทางอีเมล
medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ : USPI version
MAY-2024

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย

- <https://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การ
ควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร