

พาลิเพอริโดน
ความแรง 700 หรือ 1,000 มิลลิกรัม
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอนออกฤทธิ์นาน
บรรจุในกระบอกพร้อมฉีดยา
ชื่อการค้า INVEGA HAFYERA®
(อินวิกา ฮาฟเยรา®)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร
 - ยานี้ชื่อว่า พาลิ-เพอริ-โดน (Paliperidone)
 - เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านอาการทางจิต
- 1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร
 - ใช้ฉีดทุก 6 เดือน เพื่อรักษาอาการทางจิตในผู้ใหญ่ที่เคยได้รับ
 - พาลิเพอริโดนชนิดฉีด เดือนละครั้งมาเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน
 - พาลิเพอริโดนชนิดฉีดทุก 3 เดือนอย่างน้อย 1 รอบ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
 - เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้
 - แพ้ยา ริสเพอริโดน
 - 2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ เพื่อความปลอดภัย
 - ให้ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย
 - เคยมีกลุ่มอาการร้ายแรงจากสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท (กลุ่มอาการ NMS)
 - มีโรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคเบาหวาน โรคลมชัก
 - มีหรือเคยมีอาการเวียนศีรษะหรือเป็นลม
 - มีหรือเคยมีอาการเคลื่อนไหวที่ควบคุมไม่ได้ของลิ้น ใบหน้า ปาก หรือขากรรไกร
 - มีหรือเคยมีระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
 - มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
 - การทำงานของตับหรือไตผิดปกติ
 - เป็นโรคพาร์กินสัน หรือสมองเสื่อมจากความผิดปกติของเซลล์สมอง
 - ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
 - ใช้ยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นอยู่
- “สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้
 - ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น
 - เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการยาขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ยานี้ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเท่านั้น โดยฉีดทุก 6 เดือน
- 3.2 หากลืมฉีดยาตามนัดหมาย ควรทำอย่างไร
 - ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมไปฉีดยาที่ตามนัดหมาย
- 3.3 ถ้าฉีดยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร
 - ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลจากกรรักษาหรืออันตรายที่อาจเกิดจากยา
- หลังได้รับยานี้ ให้หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการลัดตกจากที่สูง เพราะยาอาจจะทำให้เวียนศีรษะ
- หลังได้รับยานี้ให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก การอยู่ในที่ร้อนหรืออยู่กลางแจ้ง ไม่สวมเสื้อผ้าที่หนาจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิร่างกายร้อนจนเกินไป ตื่นน้ำมาก ๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
 - ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจุดตามผิวหนัง
 - กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง มีไข้สูง มีนงงสับสน หัวใจเต้นเร็ว
 - เหงื่อออกมาก ซึ่งอาจเป็นกลุ่มอาการร้ายแรงจากสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท (กลุ่มอาการ NMS)
 - โรคหลอดเลือดสมอง เช่น อัมพาตครึ่งซีก ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด
 - เวียนศีรษะ เป็นลม หัวใจเต้นแรงหรือผิดปกติหวัะ
 - มีอาการเคลื่อนไหวที่ควบคุมไม่ได้ของลิ้น ใบหน้า ปาก หรือขากรรไกร
 - อาการชัก

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว ตัวร้อน
 - ติดเชื้อในทางเดินหายใจ
 - ตัวสั่น เคลื่อนไหวช้า เดินลากเท้า กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
 - กระวนกระวาย อยู่นิ่งไม่ได้
 - กลืนลำบาก
 - ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดยา
 - น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น
 - เวียนหัว ง่วงซึม
 - ประจำเดือนผิดปกติ น้ำนมไหล
 - ไตน้ำใหญ่ขึ้นในผู้ชาย การแข็งตัวของอวัยวะเพศผิดปกติ หรืออวัยวะแข็งตัวค้าง
- “หากมีอาการรุนแรงหรือทนไม่ได้ ให้ไปพบแพทย์”

6. ควรกินยาอย่างไร

- โดยทั่วไปยานี้จะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับยานี้กลับบ้าน
- เก็บยาในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศา ไม่เก็บยาในตู้ร้อนหรือร้อนขึ้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา เป็นยาน้ำแขวนตะกอน สีขาวถึงขาวออกเหลือง บรรจุในกระบอกฉีดยาพร้อมฉีดยา
- ตัวยาสาคัญ คือ พาลิเพอริโดน
- ส่วนประกอบอื่น โพลีซอร์เบต 20, โพลีเอทิลีนไกลคอล 4000, กรดซิตริก โมโนไฮเดรต, โซเดียมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต โมโนไฮเดรต, โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำสำหรับฉีด
- ผู้ผลิต Janssen Pharmaceutica, Belgium
- ผู้นำเข้า บริษัท แจนเซน-ซีแอล จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย หากต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยเกิดจากการใช้ยา กรุณาติดต่อ บริษัทฯ ทางอีเมล aepc@jacth@its.jnj.com
- หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ บริษัทฯ ทางอีเมล medinfosea@its.jnj.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 มีนาคม 2567,
USPI-PIL v. Aug 2021

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<https://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร